

تب خونریزی دهنده کریمه و کنگو در جهان و ایران

دکتر حمید عمامدی کوچک (استادیار)*، دکتر علی رضا یلدا (استاد)*، دکتر محبوبه حاجی عبدالباقي (استادیار)*، دکتر عبدالرضا

سودبخش (استادیار)*

* دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو که اولین بار در سال ۱۹۴۴ در کریمه و سپس در سال ۱۹۵۶ در کنگو شرح داده شد در اثر ویروسی از جنس نایرو ویروس از خانواده بونیا ویریده‌ها ایجاد می‌گردد. این ویروس غالباً به وسیله گزش کنه هیالوما به انسان منتقل می‌شود و مخزن اصلی ویروس در طبیعت کنه های هیالومانی هستند که بر روی بدن احشام زندگی می‌کنند ویروس از طریق تماس مستقیم با خون و ترشحات بدن بیمار و لاشه حیوانات آلوده سبب ایجاد همه گیریهای متعدد شده است. این بیماری در اکثر مناطق صحراei آفریقا، اروپای شرقی - خاورمیانه (خصوصاً ایران و عراق) و پاکستان و هندوستان مشاهده می‌شود. این بیماری اخیراً در ایران شایع گردیده و طی سالهای ۷۸ تا ابتدای سال ۸۱ حداقل ۲۲۲ مورد مشکوک به بیماری گزارش شده است که از این تعداد ۸۱ مورد با مثبت شدن تست IgM به روش الیزا، بیماری به اثبات رسیده است و از این ۸۱ مورد ۱۵ نفر فوت نموده اند همچنین در بررسی سرولوژیک انجام شده، تخمین زده می‌شود که حدود یک سوم دام‌های ایرانی به این ویروس آلوده شده اند. بیماری پس از طی دوره کمون کوتاه مدتی بصورت تب و لرز و میالری و علامت گوارشی ظاهر می‌شود و پس از گذشت حدود ۵ روز از شروع بیماری ناگهان وارد فاز خونریزی شده و خونریزی‌های شدید و علامت بروز DIC و شوک ایجاد می‌گردد و بیماران با همین تابلو فوت می‌نمایند و در صورت بہبودی وارد فاز نفاهت طولانی مدت حدود ۲ تا ۴ هفته می‌شوند. تشخیص بیماری بر اساس علامت بالینی و سرولوژی و یا کشت ویروس و PCR خون، جهت یافتن ویروس عامل بیماری میسر است و جهت درمان آن علاوه بر اقدامات حمایتی جهت اصلاح شوک و DIC می‌توان از داروی اختصاصی ریباورین ۱۰ روزه بهره جست. برای پیشگیری از ابتلا به بیماری، علاوه بر رعایت اقدامات حفاظتی در برابر گزش کنه و سمباشی اصطبل‌ها (جهت کاهش جمعیت کنه‌ها) ایزولاسیون بیماران بستری و ضد عفنونی نمودن وسایل شخصی بیمار و توالّت‌ها و محیط آلوده به خون و ترشحات بیمار توصیه می‌گردد.



همین اصل این بیماری بنام تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو نامگذاری شد (۴,۱).

ویروس CCHF از جنس نایرو ویروس و از خانواده بزرگ بوئنیا ویریده^۳ می‌باشد (۵,۲,۱) اکثر ویروس‌های این خانواده از طریق گزش حشرات و کنه‌ها از حیوانات به انسان منتقل می‌شوند. RNA تک رشته‌ای ویروس حاوی سه قسمت بزرگ (RNA.L)، متوسط (RNA.M) و کوچک (RNA.S) می‌باشد که روی هم رفته حاوی ۱۰۵۰۰ تا ۲۲۷۰۰ نوکلوتید می‌باشد (۶,۲,۱). ویرون گرد و کروی شکل و قطعه قطعه این ویروس ۸۵ تا ۱۰۰ نانومتر قطر داشته و دارای پوشش لبیدی می‌باشد (۸,۷) در هر پوشش ویروس ۳ نوکلتوکپسید وجود دارد که به شکل رشته‌ای و به ترتیب بدنبال هم مستقر می‌شوند و نمای مارپیچی متفاوت پیدا می‌کنند (۴,۹,۷,۵,۴,۳۱). این ویروس نسبت به اکثر موارد ضد عغونی کنده شایع و حلال‌ها و پاک کنده‌ها حساس است و در فیال آنها غیرفعال می‌شوند. این ویروس آسیب پذیر در حرارت محیط نمی‌تواند دوام آورد و حرارت خشک ۵۹ °C طی ۳۰ دقیقه آن را از بین برده و اشعه ماوراء بنفس سرعت باعث از بین رفتن ویروس می‌شود (۱۰,۹).

اکولوژی - ویروس CCHF معمولاً در طبیعت کنه‌های سخت را مبتلا می‌کند و کنه‌های آلوده به این ویروس با گزش پستانداران ویروس را به این حیوانات منتقل می‌کند و کنه‌های سالم با مکیدن خون پستاندار آلوده به این ویروس آلوده می‌شوند و چرخه انتقال ویروس بین پستانداران و کنه‌ها دائماً در طبیعت وجود دارد و انسان به صورت اتفاقی هنگامی که توسط کنه‌ها مورد گزش قرار می‌گیرد به این بیماری مبتلا می‌شود (۱۴,۲,۱).

کنه‌های ایکسوسد^۴، هیالوما^۵، آمبليوما^۶ و اريگاتوم^۷ و بوفیلوس دکلوراتوس^۸ و ریپیسفالوس^۹ مستعد آلوده شدن به این ویروس هستند ولی بطور کلی در انتقال بیماری به انسان جنس هیالوما شایعترین و مؤثرترین ناقل و مخزن این ویروس

مقدمه

تب خونریزی دهنده کریمه‌کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی حاد می‌باشد که در اثر ویروس CCHF از خانواده بوئنا ویریده^۱ ایجاد می‌شود (۱).

این بیماری که اخیراً در کشور ما شایع شده است در بعضی از مناطق دنیا وجود دارد ولی معمولاً بدليل فقدان امکانات آزمایشگاهی مناسب، بیماری تشخیص داده نمی‌شود و اغلب پزشکان آنرا با مalaria و سایر بیماریهای تب دار اشتباه می‌کنند (۲).

این بیماری که در انسان باعث تب و خونریزی می‌شود در اصل بیماری مخصوص حیوانات است و بیشتر باعث بیماری حیوانات می‌شود ولی انسان هم بطور اتفاقی بصورت تک گزش و با همه گیر ممکن است به این بیماری مبتلا شود. پس بیماری CCHF یک بیماری زوونوز (zoonose) تلقی می‌شود. بیماری غالباً بواسیله گزش که انسان را بیمار می‌کند و با توجه به انتشار کته ناقل آن در حال حاضر بیشتر در قاره آفریقا، آسیا (خاورمیانه) و حوزه مدیترانه و اروپای شرقی شایع است و می‌تواند باعث مرگ و میر انسان‌ها شود (۳). البته این بیماری از طریق تماس با خون و محصولات دام و تماس با خون و ترشحات بدن انسان بیمار نیز می‌تواند انتشار باید و به همین دلیل همه گیریهای بیمارستانی آن نیز گزارش شده است.

این بیماری که در دهه ۱۹۳۰ در اتحاد جماهیر شوروی سابق زیاد دیده می‌شد. هنگامی که در سال ۱۹۴۴ در شب جزیره کریمه ایپیدمی شد، شوماخوف و همکارانش آنرا مورد مطالعه قرار دادند و بیماری در این تاریخ برای اولین بار رسمی گزارش شد. از طرفی در سال ۱۹۵۶ در کشور زنگر ویروس عامل این بیماری از خون کودک مبتلا به تب نیز جدا شد و تحت عنوان تب کنگو گزارش شد و در سال ۱۹۷۷ مشخص شد که عامل بیماری کریمه که در سال ۱۹۴۴ گزارش شده بود با عامل بیماری کنگو یک ویروس بیشتر نبوده و روی

^۳ Booniavirideh

^۴ Nairovirus

^۵ Hyalomma

^۶ Amblyoma varigatum

^۷ Boophilus decoloratus

^۸ Rhip ciplopus

^۱ Crimean. Congo. Hemorrhagic fever

^۲ Bunyaviridae

صورت اپیدمی محدود در اوخر بهار و تابستان و زمانی که جمعیت کنه‌ها زیاد می‌شود دیده می‌شود و این در حالی است که در خاورمیانه و نواحی شرقی خزر که کنه هیالوما مارژیناتوم شایع است بیماری بصورت اسپوررادیک و غیر فصلی و بیشتر در چوپانان و در کسانی که با دام‌ها سرو کار دارند دیده می‌شود^(۱۲) به جز شترمرغ، تمامی پرنده‌گان نسبت به این بیماری مقاومند و دچار بیماری و ویرمی نمی‌شوند، در نتیجه پرنده‌گان مستقیماً در سیکل انتقال بیماری دخالت ندارند ولی گاهی اوقات پرنده‌گان مهاجر، با مهاجرت خود کنه‌ها را نیز با خود منتقل کرده و سیر انتشار بیماری را گستردۀ تر می‌نمایند^(۱۳، ۱۴) طی مطالعات مختلف انجام شده مشخص شده که پستانداران مثل گاو- گوسفند- بز- کرگدن- زرافه- بوفالو- گورخر- خرگوش خارپشت و سگ و در میان پرنده‌گان فقط شتر مرغ نسبت به ابتلاء بیماری CCHF حساس است^(۱۲) و مشخص شده که میزان آنکه بادی بر علیه ویروس CCHF به میزان قابل توجهی در تعداد زیادی از حیوانات بالاست که این حکایت از آن دارد که این حیوانات قبلًا توسط گزش کنه به این ویروس آلوده شده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که هنگامی که این حیوانات دچار عفونت CCHF می‌شوند، بیماری CCHF در آنها بسیار محدود و گذرا می‌باشد و فقط به مدت یک هفته ویرمی خفیفی پیدا نموده و علائم بیماری در آنها بسیار مختصر و کم اهمیت است و بیماری و ویرمی پس از حدود یک هفته خود بخود بیرون می‌یابد و تنها طی همین یک هفته که حیوان مبتلا به ویرمی است می‌تواند باعث انتقال بیماری شود^(۴، ۱۰، ۱۲).

از سوی دیگر طی همین مطالعات گستردۀ سرولوزیک و اپیدمیولوزیک مشخص شده است که در این مناطق آندمیک که سطح آنکه بادی بر علیه CCHF در بدن تعداد زیادی از حیوانات بالاست و سطح آنکه بادی بر علیه CCHF در انسانها پائین بوده و وجود آنکه بادی بالا بر علیه CCHF بسیار نادر است و این مؤید این نکته است که انسانها به ندرت به این بیماری مبتلا می‌شوند^(۴).

در شرایطی که ما میدانیم در مناطق آندمیک و روسیابی انسانها بارها و بارها توسط کنه‌ها گزیده می‌شوند ولی چون میزان آنکه بادی بر علیه CCHF در انسانها خیلی کم و نادر

بیماری CCHF به انسان می‌شوند ممکن است دو یا سه میزان داشته باشند. مسلماً هر چه که تعداد این میزانان مهره دار آلدۀ بیشتر باشد، احتمال بقاء و تکثیر ویروس در این مخازن و در نهایت احتمال انتقال ویروس به انسان بیشتر است. لازم به ذکر است که ویروس CCHF توانانی انتقال از طریق تخم کنه^۹ و توانایی انتقال در طی مراحل مختلف بلوغ کنه^{۱۰} را دارد و کنه می‌تواند این ویروس را به نسل‌های بعدی خود منتقل نماید^(۱۷). در میان گونه‌های کنه هیالوما، بیش از همه روی دو گونه مطالعه انجام شده است یکی کنه هیالوما مارژیناتوم مارژیناتوم^{۱۱} که در جنوب شرقی اروپا و حوزه دریای مدیترانه و خاورمیانه شایع است و دیگری کنه هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم^{۱۲} است که در جمهوری آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و هندوستان به وفور یافت می‌شود^(۱۱، ۱۰).

کنه‌های دومیزانه هیالوما مارژیناتوم در مرحله لارو و تبدیل شدن به نمف^{۱۳} انگل پستانداران کوچک مثل موش و سایر جونده‌گان و همچنین انگل پرنده‌گان هستند و بصورت انگلی روی بدن این حیوانات زندگی می‌کنند: هنگامی که کنه بالغ می‌شود، باید میزان خود را عوض کند لذا انگل پستانداران بزرگ مثل گاو و گوسفند می‌شوند و هر چه جنه حیوان بزرگتر باشد، بیشتر مورد توجه و حمله کنه بالغ قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه کنه‌های هیالوما به خوردن خون انسان نیز تمايل زیادی دارند انسان معمولاً "توسط کنه‌های بالغ هیالوما مورد گزش قرار می‌گیرد". کنه هیالوما آناتولیکوم دیگر انگل جونده‌گان نیست و به پرنده‌گان نیز علاقه ندارد و از همان مرحله لاروی تا بلوغ انگل احشام است^(۱۰، ۱۱).

این انگل که در جمهوری‌های آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و هندوستان شایع است در میان گله‌های چهارپایان تکثیر یافته و زیاد می‌شود. از دیگر خصوصیات کنه هیالوما آناتولیکوم است که ویروس را به نسل‌های بعدی خود منتقل نمی‌کند. به همین دلیل بیماری CCHF در این مناطق به

^۹ Trans ovarian

^{۱۰} Trans stadal

^{۱۱} Hyalomma marginatum marginatum

^{۱۲} Hyalomma Anatolicum anatolicum

^{۱۳} Nymph

-۳ همانطور که قبلاً گفته شد بیماری CCHF در حیوانات بسیار خفیف بوده و علائم بالینی واضحی ندارد ولی اگر در طی ویرمی حیوان، انسان با خون و سایر بافتها و ترشحات آلوده حیوان تماس داشته باشد، بیمار می‌شود این امر بیشتر هنگام ذبح حیوانات اهلی و کنند پوست آنها و تماس با خون و لاشه حیوان آلوده در کشتارگاهها اتفاق می‌افتد و یا هنگامی که دامداران اقدام به قطع شاخ، اخنه کردن حیوان، نصب پلاک در گوش و یا واکسیناسیون حیوانات می‌کنند و همچنین در کسانیکه همه روزه شیر دامها را می‌دوشند امکان ابتلا به بیماری وجود دارد (۱۵، ۱۶). ذکر این نکته ضروری است که علیرغم آنکه احتمال انتقال از طریق دست زدن به گوشت تازه حیوان آلوده وجود دارد ولی خوردن گوشت دام مبتلا به بیماری (حتی در مرحله ویرمی) باعث انتقال بیماری نمی‌شود. چون که متعاقب ذبح حیوان بعلت کاهش PH گوشت طی مرحله آویزان ماندن لاشه طی یک الی دو ساعت تمام ویروس‌ها از بین می‌روند (۱۷).

-۴ انتقال انسان به انسان از طریق تماس با خون و سایر ترشحات یا بافت‌های آلوده بیماران مبتلا به CCHF نیز دیده شده است. بطوریکه آلودگی با وسایل جراحی و سرسوزن‌های آلوده باعث ایجاد اپیدمی‌های بیمارستانی شده است و در مجموع مهمترین و شایعترین راه انتقال بیماری به عنوان یک عفونت بیمارستانی، وارد شدن سوزن آلوده به بدن انسان (Needle stick) می‌باشد چراکه در این طریق مقدار زیادی ویروس وارد خون فرد سالم می‌شود. روی همین اصل جهت افرادی که با بیمار مبتلا به CCHF همراه با تظاهرات خونریزی دهنده تماس نزدیک داشته اند (چه در منزل و چه در بیمارستان) احتیاطات خاصی لازم است که در بحث پیشگیری مفصلانه ذکر خواهد شد (۱۸، ۱۹).

ذکر این نکته ضروری است که علیرغم آنکه احتمال انتقال بیماری از طریق آنروسل وجود دارد تا بحال گزارش نشده است (۲۰).

تماس شغلی: با توجه به ذکر راههای انتقال بیماری به انسان می‌توان گفت که افراد زیر بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند.

۱- دامداران- شیر دوشان - کارگران صنایع وابسته به پرورش حیوانات اهلی به ویژه کارکنان شاغل در بخش‌های

است معلوم می‌شود که مقدار کمی از این گوش‌ها عفونی بوده و با انتقال بیماری همراه است (۱۲، ۱۴).

بهر حال همانطور که قبلاً اشاره شد کنه‌ها علاوه بر آنکه مهم ترین ناقل ویروس هستند، مهم ترین مخزن ویروس CCHF در تمام دنیا نیز محسوب می‌شوند و هنگامی که کنه ای آلوده می‌شود برای تمام عمر آلوده باقی مانده و این آلودگی را به نسل‌های بعد از خود نیز منتقل می‌کند و این کنه‌ها هستند که باعث می‌شوند ویروس از یک اپیدمی تا بروز اپیدمی بعدی در طبیعت حفظ شوند (۱۲).

فصل: با توجه به آنکه کنه مهمترین مخزن و ناقل بیماری می‌باشد فصل شیوع بیماری هم تقریباً همان فصولی از سال است که کنه‌ها شروع به فعالیت و خونخواری می‌نمایند، بطوریکه در آفریقای جنوبی و روسیه (در حاشیه رودخانه ولگا و دن) که کنه هیالوما مارٹیاتوم ناقل اصلی بیماری است (۱۸). بیماری در فصل بهار از ماه آوریل تا ژوئن (فروردهن تا خرداد) بسیار شایع می‌باشد ولی در خاورمیانه و بالکان با اینکه بیماری در فصول گرم سال شایعتر است، تغییرات موسومی و فصلی واضحی در بروز موارد بیماری دیده نمی‌شود. بطور کلی در این مناطق خصوصاً در کشورهای خاور میانه که در دشت و صحراء کشاورزی می‌نمایند و جمعیت زیادی از کنه‌ها در این نقاط زندگی می‌کنند بیشترین موارد شیوع بیماری از اوخر بهار تا اوایل پاییز اتفاق می‌افتد. در سایر نقاط آفریقا (بجز آفریقای جنوبی) که بیماری غالباً به صورت غیر هموارازیک است الگوی خاص فصلی ندارد (۴).

راههای انتقال به انسان: راههایی که انسان می‌تواند از آن طریق به ویروس CCHF آلوده شود عبارتند از:

-۱ آلودگی توسط گوش کنه: این راه که مهمترین راه انتقال بیماری به انسان است غالباً از طریق گوش کنه هیالوما رخ می‌دهد (۱۳، ۱۲، ۴، ۱).

-۲ در بسیاری از موارد کشاورزان و دامداران با مشاهده کنه آنرا گرفته و کنه را در لای انگشتان خود له می‌کنند و در صورتی که در انگشتان فرد زخم سطحی وجود داشته باشد و آن زخم به محتویات بدن کنه آلوده شود ویروس می‌تواند وارد خون فرد شده و باعث آلودگی انسان شود (۱۳، ۴).

نیست بلکه بیشتر به ویرولانس و بیماری زائی گونه‌های متفاوت ویروس در مناطق مختلف دنیا بستگی دارد. بطوریکه در جنوب روسیه بیماری خفیف تر است و میزان مرگ و میر حدود ۵ تا ۱۰٪ دارد ولی در جنوب آفریقا طی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ میزان مرگ و میر بیماری ۲۵٪ و در آسیای مرکزی و خاورمیانه بین ۳۵٪ تا ۵۰٪ حتی بیشتر گزارش شده است و این در حالی است که در اپیدمی‌های بیمارستانی درصد مرگ و میر بالاتر هم گزارش شده است. بهر حال تفاوت‌های خود ویروس‌ها، راه انتقال بیماری به انسان و میزان و دوز ویروسی که وارد بدن می‌شود از فاکتورهای مهمی هستند که در شدت بیماری تأثیر دارند (۱۳، ۱۴).

وضعیت شیوع بیماری در ایران:

این بیماری که از قدیم ایام در کشور ما وجود داشته است در قدیمی ترین نسخه مکتوب در کتاب گنجینه‌های خوارزمشاهی که توسط جرجانتی حکیم و دانشمند معروف ایران نگارش شده است بتفصیل توصیف شده بطوریکه پس از بیان علامت بیماری همچون خون در ادرار، خونریزی معقد، استفراغ خونی، خلطهای خوتی، خونریزی در حفره شکم و خونریزی از لثه‌ها در این کتاب قید شده است که ناقل این بیماری بندپای کوچکی است که بطور طبیعی انگل برخی پرنده‌گان است (۱۳).

بیماری CCHF که در ایران که در بعضی از مناطق خاص به آن حصبه قره میخ گفته می‌شود. برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ از استان خراسان توسط شوماخوف روسی گزارش شد (۱۳). وی آنچه بادی علیه CCHF را در سرم ۴۵ گوسفند که به مسکو ارسال شده بود را شناساند کرد و آن رابه طور رسمی گزارش نمود. در فاصله سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ (۱۳۵۰-۱۳۵۴ هجری شمسی) به دنبال گزارش دکتر امین الاضری مبنی بر وجود سندروم عفونی و خونریزی دهنده، انتیتو پاستور ایران مطالعه گسترده ای را در استان آذربایجان شرقی انجام داد و طی این ۴ سال ۶۰ مورد بیمار مبتلا به سندروم تب همورازیک (که مردم محلی اصطلاحاً به آن حصبه قره میخ می‌گفتند) را در سه شهرستان سراب، اردبیل و خلخال تحت درمان قرار داد و در سال ۱۹۷۵ دکتر سعیدی و همکاران شواهد سروloژیک وجود بیماری در نمونه‌های انسانی و دامی

نگهداری دام و کشتارگاهها، قصابان و دامپزشکان (۱۳، ۱۲، ۱۴). (۱۵)

-۲- پرسنل پزشکی - جراحان - پرستاران و کارمندان آزمایشگاههای تشخیص طبی (۱۸، ۱۷، ۱۳)

وضعیت شیوع بیماری در دنیا:

از زمان شناخت بیماری تا بحال اپیدمی‌های بیماری CCHF در مناطق زیر رخداد است.

۱۹۴۴-۱۹۴۵ (اتحاد جماهیر شوروی)

۱۹۰۶ زیر

۱۹۷۷ کنگو

۱۹۸۱ آفریقای جنوبی

۱۹۸۴ آفریقای جنوبی

۱۹۹۶ آفریقای جنوبی

۱۹۹۸ پاکستان

۱۹۹۸ عمان

۱۹۹۹ قراقستان

۲۰۰۰ افغانستان

۲۰۰۰ پاکستان

۲۰۰۰ ایران

۲۰۰۱ کوزوو

و بطور کلی بیماری تا بحال در کشورهای زیر گزارش شده است:

از قاره آفریقا: کشورهای سنگال - نیجریه - کنیا - تانزانیا -

اتیوبی - زیر - اوگاندا - آفریقای جنوبی

از اروپای شرقی: کشورهای بلغارستان - یوگوسلاوی -

مجارستان - یونان - ترکیه - آلبانی - کوزوو

از اتحاد جماهیر شوری سابق: روستوف استاوروپول -

DAGستان - ارمنستان - ترکمنستان - ازبکستان - قرقیستان -

اوکراین - قراقستان

از آسیا: کشورهای عراق - پاکستان - هندوستان - ایران -

عربستان - افغانستان - دبی - عمان - ترکیه - شمال غربی چین

(۱۳)

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری در مناطق مختلف دنیا تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و این تفاوت فقط مربوط به اختلاف سرویس تشخیصی و درمانی پزشکی مناطق مختلف

پاستور سنگال انجام شد فقط طی تاریخ ۷۹/۳/۱۸ تا ۱۰/۱۵/۸۱ از طریق اندازه گیری سرولوژیک IgM به روش ELISA اختصاصی بر روی ۲۲ بیمار مشکوک به بیماری تب همورازیک کریمه- کنگو مشخص شد که حداقل ۸۱ انسان در استانهای مختلف ایران قطعاً به این بیماری مبتلا شده اند و از این ۸۱ مورد ۱۵ نفر فوت نموده اند (جدول شماره ۱). همچنین با بررسی سرولوژیکی بر روی ۱۲۰۵ رأس دام از استانهای مختلف کشور مشخص شد که آنتی بادی IgM در ۲۵۸ رأس دام مثبت می شود (جدول شماره ۲) و تخمین زده شد که به این ترتیب باید حدود ۱/۳ دامهای ایرانی با این ویروس آنوده شده باشند.

را در ۱۳٪ از ساکنین منطقه آذربایجان شرقی را به اثبات رساند (۱۹، ۲۰، ۲۱) ولی گزارش رسمی دیگری نبود (هر چند که به صورت اسپورادیک گزارش بروز بیماری داده می شد) تا اینکه از حدود ۳ سال قبل بدنبال وارد نمودن غیر قانونی احشام آنوده از کشورهای افغانستان و عراق به ایران این بیماری مجددآ شایع شد و اولین موارد مشکوک به بیماری CCHF از استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد و با ارسال نمونه خون و سرم بیماران به آزمایشگاه رفاه سازمان بهداشت جهانی مورد فوق تأیید شد. طی یک بررسی جامع که در آزمایشگاه آربو ویروسها و تب‌های همورازیک و بررسی انسپیتو پاستور ایران و با همکاری مرکز رفاه سازمان آربوویروسها و تب‌های همورازیک ویروسی در انسپیتو

جدول ۱- موارد مشکوک انسانی و IgM مثبت و موارد منجر به فوت به تفکیک جنس در استانهای کشور

استان	تعداد کل	تعداد موارد مشکوک				تعداد موارد فوت	تعداد موارد مثبت	IgM مثبت	IgM مثبت به تفکیک جنس	موارد مثبت به تفکیک جنس	IgM مثبت	تعداد موارد مشکوک	موارد مثبت به تفکیک جنس	زن	مرد	زن	مرد	
		زن	مرد	زن	مرد													
۱	۱	۰	۰	۱۰	۳۰	۴۰	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲	۲	۶	۶	۱۲	۱۲	۱۸	۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	۳	۰	۰	۱	۱	۱	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	۴	۰	۰	۲	۴	۷	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸	۸	۰	۰	۱	۱	۲	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۰	۰	۰	۱	۲	۲	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۱	۱	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۲	۲	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۴	۰	۰	۰	۱	۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵	۱۵	۰	۰	۱	۰	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷	۱۷	۰	۰	۰	۳	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹	۱۹	۰	۰	۰	۲	۲	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		۳	۸	۲۲	۵۹	۸۳	۲۲۲											

جدول ۲- موارد مشکوک و IgG مثبت دامی به تفکیک گونه حیوانی در استانهای کشور

استانها	نوبت	گوسفتند										IgG مشکوک مثبت	IgG مشکوک مثبت	بز	گاو	شتر
		IgG مشکوک مثبت														
۱ آذربایجان غربی	-	-	۲	۷	۳۹	۵۵	۱۱	۴۳								
۲ بوشهر	-	-	۲	۲۲	۱	۲	۱۷	۱۲۳								
۳ تهران	-	-	-	-	۱۲	۲۰	۲	۲								
۴ کردستان	-	-	۱۱	۱۰	-	۱	۷۷	۱۰۹								
۵ سیستان و بلوچستان	۲۸	-	-	۱۱	۲۸	۵۱	۵۹	۱۳۸								
۶ مرکزی	-	۹	۱۰	-	-	-	۱	۲								
۷ خوزستان	-	۶	-	-	-	۹	۲۳	۶۹								
۸ قم	-	-	-	-	۱	۱	-	-								
۹ اصفهان	-	-	۸	۵	۱۰	-	-	۶								
۱۰ کهکلیویه و بویراحمد	-	-	-	-	-	-	-	۳۰								
۱۱ فارس	-	۱۳	۹	۱۱	۲۵	۲۵	۳	۲۸								
۱۲ هرمزگان	-	۲	-	-	-	-	۱۷	۵۲								
۱۳ خراسان	-	-	-	-	-	۱۰	-	-								
۱۴ گلستان	-	-	۲۶۴	۶	۱۰	-	-	-								
۱۵ مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-								
تعداد کل	۲۸	۴۰	۲۵۶	۱۱۳	۲۱۴	۲۰۰	۶۰۷									

گوسفتند طی این مراسم خارج از چهارچوب خاص مقررات سازمان دامپزشکی که بطور معمول در کشتارگاه‌ها اعمال می‌شود انجام می‌شود، احتمال بروز بیماری CCHF در این موارد زیاد است (۱۳). در پایان ذکر این نکته نیز مفید است که تا حال ۳ مورد قطعی از موارد ابتلا به CCHF بصورت عفونت بیمارستانی رخ داده است که یک مورد از این سه مورد پزشکی بود که از اصفهان گزارش شده بود (۲۱).

علامت بیماری:

بطور کلی بیماری CCHF دارای ۴ مرحله می‌باشد:

- ۱- دوره کمون- بعد از وارد شدن ویروس به بدن انسان (چه از طریق نیش کنه یا تماس با محصولات خون آلوده) پس از طی یک دوره کمون کوتاه بیماری ظاهر می‌شود. دوره کمون پس از گزش کنه یک تا سه روز و حداقل نه روز می‌باشد و لی در عفونتهای بیمارستانی و تماس با خون و بافت آلوده معمولاً دوره کمون کمی طولانی تر و حدود شش روز و حداقل سیزده روز می‌باشد (۱۳،۱۴). علت کوتاه بودن دوره کمون این

بنابر گزارش اداره کل مبارزه با بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۷۸ از ۴ مورد ابتلای قطعی به بیماری ۲ نفر فوت نموده اند و در سال ۷۹ نیز از ۲۳ نفر مورد قطعی ابتلا ۶ نفر فوت کرده اند و بالاخره در سال ۸۰ که اوج شیوع بیماری محسوب می‌شود از ۶۶ مورد ابتلای قطعی به بیماری ۷ نفر منجر به فوت شده است و فقط طی ۲ ماه اول سال ۸۱ از ۱۹ مورد محتمل مشخص شده است که ۴ مورد قطعاً به بیماری CCHF مبتلا شده و از این تعداد ۱ نفر فوت نموده است.

کانون‌های عمده آلودگی در ایران در حال حاضر در استان‌های سیستان و بلوچستان، اصفهان و گلستان می‌باشد و بیشترین موارد ابتلا در میان قصابان- دامداران و خانمهای خانه داری بوده که بلافاصله بعد از ذبح گوسفتند در منزل بتوسط قصاب، گوشت گوسفتند آلوده را خرد و قطعه کرد و بودند با توجه به آنکه در روز عید قربان و در مراسم مختلف مثل بازگشت زائرین از عتبات عالیات و عقیقه نمودن افراد مختلف، تعداد زیادی از مردم گوسفتند قربانی می‌کنند و ذبح

خونگیری شده است رخ می‌دهد (۱۳، ۲۳). همچنین نقاط تحت فشار مثل محله‌هایی که برای اخذ فشار خون تورینکه بسته می‌شود بیشتر دچار خونریزی پوستی می‌شوند گاهی اوقات بقدرتی خونریزی بینی و هماقمه و ملناه بیمار شدید است که مجبور می‌شویم جهت جبران خون از دست رفته به بیمار خون تزریق نماییم و بالعکس گاهی اوقات شدت این خونریزی‌های به قدری کم و خفیف است که فقط منجر به پتشی مختصری می‌شود (۱۳). (حدود ۱۵٪ موارد) بیماران به دنبال خونریزی دچار تشنجی شدید، دل درد، کمر درد و آرثیتاسیون می‌شوند (۱۲). در معاینه بیمار در ۱۰٪ موارد متوجه دیسترس تنفس بعلت خونریزی‌های ریوی می‌شویم. ضمناً با نوجه به آنکه ویروس سیستم ریتکولوآندولیال را بصورت گستردگی درگیر می‌کند، هپاتوسپلومگالی (در ۳۳٪ موارد) تندرنس کبدی (۵۰٪ موارد) و تندرس طحال و اپیگاستر داریم (۱۲) هنگام بررسی ضربان قلب اگر بیمار دچار خونریزی شدید نشده باشد برادی کاردی پیشرفت نموده و بیمار برادی کاردی می‌شود ولی در صورت بروز خونریزی تاکی کاردی ایجاد می‌شود نشانه‌های پیشرفت بیماری، ویرمن شدید، ترومبوستیوپنی و لتفوتی است و آنزیم AST افزایش می‌یابد علامتی که بر پروگنوز بد و مرگبار بودن بیماری دلالت می‌کند عبارتند از:

- پلاکت زیر بیست هزار
- PTT بیش از ۶۰ ثانیه
- AST بیش از ۲۰۰ و ALT بیش از ۱۵۰ (غالب اوقات نرمال PT,ALT است) (۴)

با پیشرفت شدت بیماری و بروز DIC، خونریزی‌های بیمار غیر قابل کنترل شده و بیمار حجم قابل ملاحظه‌ای خون را از دست می‌دهد لذا دچار شوک و بدنبال آن نارسایی شدید کلیوی و اولنگوری- نارسائی کبد و هپاتیت ایکتریک نکروزان و سندروم هپاتوナル و نارسائی شدید تنفسی و توقف قلبی شده و در همین تابلو فوت می‌نماید. خونریزی مغز نیز از علل اصلی مرگ در این بیماری می‌باشد (۱۳، ۴).

هنگام اتوپسی بیمارانی که از بیماری CCHF فوت نموده اند در کبد نکروز اوزیتووفیلیک (اجسام کانسلمن^{۱۴})،

است که ویروس مستقیم وارد خون می‌شود و اثرات پاتولوژی خود را ظاهر می‌کند در یک گزارش، متعاقب تنفس دهان به دهان و احیاء فرد بیمار، بیماری در عرض کمتر از ۴۸ ساعت دریکی از پرسنل پزشکی همراه با تب و خونریزی شروع شد (۱۳).

۲- مرحله قبل از خونریزی: شروع بیماری معمولاً بصورت ناگهانی بوده و همراه با تب و لرز و سردرد شدید می‌باشد. بیمار از میالری شدید زنرالیزه که بیشتر در پشت کمر و خلف ران ظاهر می‌شود و درد مقاصل و درد شکم، کاهش اشتها و شکایت می‌کند (۱۴). تهوع، استفراغ، درد شکم، کاهش اشتها و اسهال خفیف آبکی از دیگر شکایات بیماران است که در نهایت درد شکم بیشتر در ناحیه راست و فوقانی شکم لوبکالیزه می‌شود. بیمار همزمان دچار تغییرات خلق و خوی می‌شود به این صورت که ابتدا بیفار و آریته و بدانلائق می‌شود ولی بعد از گذشت چند روز این حالت به سمت خواب آلودگی و سستی و رخوت و افسردگی پیش می‌رود. در معاینه بیماران برافروختگی صورت و فقسه سینه، کونزیکتیویت، پرخونی مخاط حلق و ضایعات پتشیال از نشانه‌های شایعی است که جلب نظر می‌کند (۱۳، ۱۲). اغلب بیماران با نوجه به تب بالا برادی کاردی داشته و گاهی اوقات علاوه بر کاهش ضربان قلب دچار افت فشار خون نیز می‌شوند در این مرحله گاهی اوقات هپاتومگالی نیز در این بیماران دیده می‌شود. در آزمایشات این مرحله ممکن است تنها لکوپنی و ترومبوستیوپنی جلب نظر کند. در ۲۵٪ موارد پس از گذشت یک هفته از شروع علامت بیماری بهبودی ظاهر شده و بیماری تمام می‌شود ولی در ۷۵٪ موارد بیماری پیشرفت نموده و وارد مرحله بعدی می‌شود (۲۲).

۳- مرحله تظاهرات خونریزی دهنه: پس از گذشت ۱ تا ۱۰ روز از شروع بیماری و بطور متوسط از روز پنجم بیمار ناگهان دچار خونریزی می‌شود (۱۳). خونریزی بیمار بصورت هماچوری- ایستاکسی- منومترورازی- هماقمه، ملنا و خونریزی‌های لته و ملتحمه چشم و گوش ظاهر می‌شود ولی شایعتر از همه خونریزی پوست و مخاط است که بصورت ضایعات پتشی پورپوریک ظاهر می‌شود خونریزی‌های پوستی غالباً در طول خط زیر بغل و زیر پستانهای خانم‌ها و در محل تزریق و محل هانی که قبلاً از آن مناطق از وریدهای سطحی

^{۱۴} Councilman body

در جدول شماره (۱) معیارهای تشخیصی بالینی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ذکر شده است. چنانچه جمع امتیازات ۱۲ و یا بیشتر شود فرد بیمار بعنوان مورد احتمالی CCHF تلقی شده و تحت درمان قرار می‌گیرد (۱۲).

تشخیص آزمایشگاهی:

بعد از اخذ نمونه خون بیمار، سرم بیمار باید در یک طرف درسته و داخل یک نایلوون سربسته به آزمایشگاه ارسال شود. سایر ترشحات بدن بدون آنکه رقیق شود باید ارسال شوند (۲۳).

- CCHF بیماری برق آسا و کشنده‌ای است و بیمار قبل از آنکه فرصت ساختن آنتی‌بادی بر علیه ویروس عامل بیماری را داشته باشد با پیشرفت بیماری می‌میرد. لذا برای تشخیص زودرس بیماری باید ویروس عامل بیماری را را از خون و بافت‌های بیوپسی شده جدا کرد. برای رسیدن به این منظور با استفاده از تکنیک RT-PCR می‌توان سکانس (نوالی) ژن S ویروس را بطور موفقیت‌آمیز جدا نمود (۲۶، ۱۳، ۴).

- استفاده از PCR بر روی آنزیم ترانس کرپتاز معکوس، علاوه بر اینکه سریع، دقیق و حساس است و با توجه به آنکه RNA ویروس در این روش کاملاً غیرفعال می‌شود، خطر آسودگی کارمندان آزمایشگاه هم بسیار کم و در حداقل ممکن است (۲۶، ۱۲، ۳۰).

- روش دیگر تشخیص آزمایشگاهی بیماری یافتن آنتی‌ژنهای ویروس به طریق ELISA و یا IFA و یا اسپیر مستقیم و کشت از بافت بیوپسی شده کبد است محیط‌های کشت سلولی که برای جدا نمودن ویروس بکار می‌روند دارای تنوع زیادی هستند ولی در همه آنها بدلیل پایین بودن مقدار ویروس، یافتن و جدا کردن ویروس خصوصاً در پاساژ اول بسیار مشکل است (۴).

از دیگر روش‌های تشخیص بیماری استفاده از روش سرولوژی و یافتن آنتی‌بادی سرم افراد مبتلا بر علیه بیماری است. با توجه به آنکه حدوداً یک هفته پس از شروع بیماری بدن انسان شروع به ساختن آنتی‌بادی بر علیه این ویروس می‌نماید می‌توان پس از گذشت این زمان از شروع بیماری به بعد از روشهای مختلف سرولوژیک مثل IFA، ELISA، جهت یافتن آنتی‌بادی استفاده نمود. همانطور که قبلاً ذکر شد

بدون انفلتراسیون سلول‌های التهابی دیده می‌شود و در طحال نکروز پولپ قرمز و سفید ایجاد می‌شود (۳) و به طور گسترده در تمام ارگانها خونریزی دیده می‌شود بطوری که درون معده و روده‌ها و احشاء پر از خون است (۱۲).

احتمال مرگ در هفته دوم به حداقل می‌زان خود رسیده و بسته به عوامل مختلف که قبلاً ذکر شده از ۱۵ تا ۵۰٪ و حتی بیشتر تقاضوت می‌کند (۲۴-۱۳).

۴- مرحله نقاوت: اگر پدیده‌های خونریزی باعث مرگ بیمار نشود از حدود روز دهم تا بیستم بیماری، بتدریج علائم بهبودی ظاهر می‌شود. در طی این مدت که حدوداً دو تا چهار هفته طول می‌کشد بیمار احساس خستگی و ضعف شدیدی دارد و خونریزی‌ها بتدریج بهبود می‌یابد و ضایعات پوستی بیمار کمرنگ می‌شود (۲۱-۳) با بهبود آزمایشات بیمار (CBC U/A) می‌توان بیماران را از بیمارستان مرخص کرد (۲۱). بهبودی بیمار تقریباً بدون عارضه است ولی گاهی اوقات عوارضی همچون آلوپسی توکالیس و یا نوروباتی پریفرال و گزروستومی ممکن است ایجاد شود که در نهایت تمام این عوارض پس از گذشت چندین ماه بهبودی می‌یابند (۴، ۱۲). افراد پس از یک بار ابتلا به بیماری CCHF تقریباً تا آخر عمر نسبت به ابتلا مجدد بیماری مصون می‌باشند (۱۲).

رونده بیماری در طی حاملگی بسیار شدید تر از افراد دیگر است، بطوریکه ابتلا به بیماری در طی حاملگی توانم با خطر بالای مرگ و میر و سقط جنین می‌باشد.

تشخیص:

تشخیص بالینی- جهت تشخیص بالینی بیمار توجه به شرح حال و معاینه بیمار و ایدمیولوژی بسیار مهم و کمک کننده است بطوریکه عواملی مثل حضور فرد در منطقه آندمیک، سابقه گرش کنه و یا تماس با خون و بافت‌های دامها و انسانهای آسوده، شروع ناگهانی بیماری و علائمی مثل تب، سردرد، درد عضلانی همراه با دیابت‌های خونریزی دهنده و خونریزی‌های پوستی و مخاطی وجود علائم آزمایشگاهی مثل لکوینی و ترومبوسیتوپنی به نفع وجود بیماری CCHF است (۷).

سلولهای خونی ایجاد شود، بیمار را بعنوان مورد محتمل CCHF تحت درمان قرار می‌دهیم (۱۳).

تشخیص افتراقی:

بیماریهای عفونی که در تشخیص افتراقی بیماری CCHF قرار می‌گیرند عبارتند از: مalaria - سایر تب‌های خونریزی دهنده ویرال (مثل تب دره دریفت، تب زرد، تب ماربوج، تب لاس، تب هموراژیک ابولا، تب هموراژیک همراه با سندروم کلیوی - تب خونریزی دهنده آرژانتینی، تب خونریزی دهنده بولیویانی) لپتوسپروز - تب کبو و سایر ریکتریوزها لیستریوزیس، تیفوئید، شیگللوزیس - تب راجعه - هیاتیت فولمینانت - متگوکوکسی و از تشخیص‌های غیر عفونی نیز Systemic lupus (SLE) Immune Thrombocytopenic (ITP) (Erythematous Thrombotic thrombocytopenic (TTT) (purpura (purpura

و بالاخره HUS (Hemolytic Uremic syndrome) اشاره نمود (۲۹).

درمان:

درمان حمایتی - اقدامات حمایتی درمانی برای بیماران عبارتند از: بستری فوری بیمار، با توجه به بروز شوک، تجویز مایعات جانشین شونده پلاسمما، تجویز داروهای کاردیوتونیک و تجویز داروهای افزایش دهنده فشار خون تا حدی که جریان خون کلیوی حفظ گردد، البته (۲۵) با توجه به آنکه بیمار دچار سندروم نشت مایع از مویرگهاست به دنبال آن مستعد ابتلاء به ادم ریوی می‌باشد هر چند که بیمار ظاهراً دچار دهیدراتاسیون و هپیوولمی است باید جداً از تجویز بی‌رویه مایعات به بیمار پرهیز کنیم و با کنترل دقیق حجم ادرار، مایعات تجویز شده باید به اندازه نیاز بیمار تجویز شود (۴) از دیگر سو با توجه به بروز DIC و ایجاد خونریزی قدم بعدی کنترل خونریزی بیمار است. در این مرحله با کنترل دقیق هماتوکریت و حجم خون و شمارش سریال پلاکهای بیمار باید مراقب خونریزی بیمار بود و در صورت تشدید خونریزی نسبت به تزریق اجزاء خون مثل Cryoprecipitate، (FFP) - پلاکت - Packed RBC اقدام نمود (۱۳,۲۵). در صورتی که

این آنتی بادی‌ها از حدود روز هفتم بیماری در خون قابل شناسائی هستند و با گذشت زمان مقدار آنها بیشتر و بیشتر می‌شود و بعد از گذشت چندین هفته به حداقل میزان خود می‌رسند. IgM حداقل تا ۴ ماه در خون قابل اندازه گیری می‌باشد ولی در IgG تا ۵ سال هم همچنان در خون افراد مبتلا وجود داشته و قابل اندازه گیری است (۲۸,۲۷,۲۳).

- یکی از روش‌های بسیار موفق جهت جدا کردن روش تلقیح خون بیماران به داخل مغز موش است که اولین بار در سال ۱۹۷۶ توسط بوتنکو انجام شد. در این آزمایش بعد از گذشت ۳ تا ۶ روز از تلقیح خون انسان به مغز موش، ویروس CCHF قابل تشخیص است. در این مرحله جهت تشخیص ویروس از آزمایش مهار آگلوتیناسیون EILSA یا نوترالیزاسیون استفاده می‌کنند (۱۲,۴).

برای تشخیص صحیح تر و برای مراقبت از بیماری سه تعريف طبقه بندی شده (مظنون - محتمل - قطعی) وجود دارد:

- تعريف مظنون: شروع ناگهانی بیماری با تب + درد عضلانی + خونریزی + یکی از علائم ایدمیولوژیک

- (سابقه گرش با کنه یا له کردن کنه با دست، تماس مستقیم با خون نازه یا سایر بافت‌های دام‌ها و حیوانات آلوده تماس مستقیم با ترشحات دفعی بیمار قطعی یا مشکوک به CCHF، اقامت یا مسافرت در یک محیط روستائی که احتمال تماس با دام‌ها وجود داشته اما یک تماس خاص تصادفی را نمی‌توان مشخص نمود.

- تعريف محتمل: موارد مظنون + ترموبوستیوپنی (کاهش پلاکت کمتر از ۱۰۰ هزار در هر میلی لیتر خون) همراه با لکوبنی گلبول سفید کمتر از ۳۰۰۰ در هر میلی لیتر) یا لکوسیتوز (گلبول سفید بیش از ۹۰۰۰ در هر میلی لیتر)

- تعريف قطعی: موارد محتمل + تست سرولوژیک مثبت یا جدا کردن ویروس

توجه: همانطور که قبل ا ذکر شد مطابق دستورالعمل کشوری موارد محتمل باید تحت درمان ریباورین قرار بگیرند. ضمناً در صورتی که فاکتورهای خونی بیمار مظنون در روز اول بستری طبیعی باشد، بیمار را بمدت سه روز تحت نظر قرار می‌دهیم و چنانچه در طی این مدت ۰٪ کاهش در تعداد

تزریقی در دسترس باشد با همان دوز خوراکی دارد به صورت وریدی تجویز می‌شود.

الف: وجود علامت اختلالات سیستم اعصاب مرکزی: شامل تشنج، کوما، گیجی، اختلالات شدید رفتاری و علامت لترالیزه که نشان‌دهنده خونریزی مغزی می‌باشد.

ب: علامت اختلالات شدید متابولیک: شامل PH زیر ۷/۱ دهیدراتاسیون بیش از ۱۰٪ - فشار خون سیتوالیک کمتر از ۹۰mmHg، استفراغ شدید.

ج: علامتی که بدلیل اختلالات شدید بوده و یا پیش آگهی بدی همراه است شامل:

- کاهش پلاکت‌ها به کمتر از صد هزار در هر میلی لیتر در سه روز اول شروع بیماری یا کمتر از بیست هزار در هر میلی لیتر در هر زمان دیگر

- هموگلوبین کمتر از ۷ میلی گرم در دسی لیتر

- علامت DIC شامل اختلالات PTT، PT و افزایش (Fibrin Degradation Product) FDP

- نارسائی کبدی - نارسائی ریوی - ادم ریه یا نارسائی چند عضو (۱۲).

یکی از مهمترین عوارض جانبی ریباویرین آنمی همولیتیک است و در ۱۰٪ بیمارانی که ریباویرین را همراه اینترفرون جهت درمان هپاتیت C مصرف می‌کنند دیده می‌شود ولی از آنجا که شروع این آنمی طی یک الی دو هفته بعد از شروع درمان ظاهر می‌شود علیرغم آنکه بیماران دچار CCHF خودشان هم دچار افت هموگلوبین و آنمی هستند بدلیل کوتاه بوده دوره درمان می‌توان ریباویرین را با احتیاط و کنترل هموگلوبین بیمار تجویز نمود.

از دیگر عوارض مهم ریباویرین ایجاد انفارکتوس قلبی است که باز در بیماران آنیکی بیشتر گزارش شده است. لذا در صورت مصرف دارو در بیمارانی که ناراحتی قلبی دارند، بهتر است که طی درمان بیمار را از نظر بروز مشکلات قلبی و ریوی کنترل نمود.

یکی دیگر از مشکلات دارویی ریباویرین آن است که مصرف آن در زمان حاملگی باعث بروز ناهنجاریهای جنینی و یا مرگ جنین می‌شود و جزء داروهای گروه X می‌باشد و مصرف آن در حاملگی و شیر دهی منوع است ولی علیرغم تراویز نبودن دارو در صورتی که خانم حامله‌ای مبتلا به

بخواهیم جهت قطع تب بیمار از داروهای مسکن استفاده کنیم. باید جداً از تجویز آسپیرین خودداری نماییم چراکه آسپیرین باعث اختلال عملکرد پلاکت‌ها و تشديد خونریزی می‌شود. ضمناً در صورت تجویز مقادیر زیاد خون باید از کلسیم تزریقی برای تصحیح اختلالات انعقادی و بهبود انقباضات و هدایت و نظم ضربان قلب استفاده شود (۱۲).

درمان اختصاصی:

جهت درمان اختصاصی CCHF استفاده از پلاسمای افراد ایمن تأثیر چندانی ندارد و تجویز آن در کوتاه نمودن طول مدت ویرمی، تب و علامت بالینی تأثیر چشمگیری ندارد. اخیراً استفاده از ایمونوگلوبولین اختصاصی بر ضد CCHF در تعداد محدودی از بیماران بلغاری استفاده شده است و ظاهراً نتایج امیدوارکننده‌ای داشته است ولی جهت قضاوت باید مطالعات بیشتری انجام شود (۱۰، ۲۵).

داروی ضد ویروسی ریباویرین که از داروهای مؤثر بر علیه بعضی از ویروسهای حاوی RNA است که بر روی ویروس CCHF هم در Invitro و هم در Invivo کاملاً مؤثر می‌باشد و استفاده از آن در کاهش تب و بهبود علامت بالینی بیماران از جمله جلوگیری از بروز خونریزی اثرات چشمگیری داشته است. این دارو با مهار سنتز mRNA ویروسی باعث مهار ریپلیکاسیون RNA ویروسی می‌شود و امروزه برای درمان بیماری CCHF توصیه می‌شود (۱۳، ۲۵).

باید بلافضله بعداز تشخیص موارد محتمل بیماری، داروی ریباویرین را بمدت ۱۰ روز مطابق روش زیر شروع می‌کنیم. ابتدا ۳۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بصورت یکجا (برای یک فرد بالغ ۲ گرم)

سپس ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۶ ساعت برای ۴ روز (برای یک فرد بالغ ۱ گرم هر ۶ ساعت برای ۴ روز) و سپس ۷/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۸ ساعت برای ۶ روز بعد (برای یک فرد بالغ ۵۰۰ میلی گرم هر ۸ ساعت برای ۶ روز) (۱۰، ۲۵، ۱۳).

در صورتیکه دارو طی شش روز اول بیماری استفاده شود میزان بهبودی ناشی از آن بسیار بالا و با نتایج درمانی بهتر همراه است. معمولاً برای درمان بیماری ریباویرین خوراکی را پیشنهاد می‌کنند و فقط در موارد زیر در صورتی که داروی

- تمام پرسنل بهداشتی که به اطاق بیمار رفت آمد می‌کنند باید از ماسک و گان یکبار مصرف استفاده کنند و در صورتی که از وسائل یکبار مصرف استفاده نمی‌شود باید قبل از آنکه این البسه به رخشوبیخانه ارسال شوند آنها را انوکلاو نمود.

- کلیه وسائل آلوده به خون و ترشحات بدن بیمار و لیسهای بیمار که در حین بستری پوشیده و کلیه نمونه‌های خون و مایعات بدن که جهت انجام آزمایش از بیمار اخذ شده است باید جمع‌آوری شده و داخل کیسه‌های مخصوص فرار داده شوند و بدون آنکه کیسه سوراخ شود بر روی آنها بر جسب مخصوص زده شود. موارد فوق قبل از قرار دادن داخل کیسه باید با مایعات ضد عفونی کننده و بلیچ ضد عفونی شوند (۲۲،۲۲).

- بعد از ترخیص بیمار تمام سطوح اطاق و وسائل موجود در آن اطاق باید ضد عفونی شوند.
بعد از ترخیص بیمار تمام سطوح اطاق و وسائل موجود در آن اطاق باید ضد عفونی شوند.

- پرسنل بهداشتی باید سعی فراوان کنند تا در حین انجام اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیمار دچار زخم و خراش جلدی نشده و سوزن بدست آنها فرو نزود (خصوصاً تأکید می‌شود که از Recapping سرنگ‌ها جداً خودداری نماید) و اساساً باید پرسنل مشخص و معینی که قبل "آموزش کافی داشته باشند وظیفه انجام اقدامات درمانی بیمار را به عهده داشته باشند و این وظیفه به عهده افراد مختلف و بی تجربه نباشد (۲۵،۲۴).

کمپروفیلاکسی: بهترین پروفیلاکسی، مرافت از بیماران همراه با رعایت اقدامات لازم جهت پیشگیری از آلودگی کارکنان سیستم بهداشتی است البته این کار نه آسان و نه ارزان است ولی باید نهایت سعی و تلاش انجام شود تا اقدامات پیشگیری صحیح انجام شود (۲۴).

ولی به هر حال در مورد افراد زیر کمپروفیلاکسی با داروی ریباورین توصیه شده است.

- افراد خانواده و یا پرسنل سیستم‌های بهداشتی که با ترشحات بدن فرد بیمار تعاس داشته‌اند.

- پرسنل سیستم بهداشتی که در حین انجام اقدامات درمانی و تشخیصی سوزن آلوده به دستشان فرو رفته است.

CCHF شده و جان وی در خطر باشد باید دارو را همراه با رعایت سایر اقدامات درمانی حمایتی استفاده نمود.

در صورتی که خانم جوانی به بیماری مبتلا شود و حامله نباشد توصیه می‌کنیم که تا ۱۶ ماه بعد از اتمام مصرف داروها از حاملگی جلوگیری نماید همچنین در صورتی که جهت مرد بیمار مبتلا به CCHF دارو شروع می‌نماییم و همسرش حامله باشد به بیمار توضیح کافی داده تا در حین مصرف دارو در صورت مقاربت و نزدیکی از کاندوم استفاده نمایند (۱۲).

در بیمارانی که خونریزی دارند حتی امکان تا کنترل خونریزی، نباید آنها را جابجا نماییم و با توجه به خطر بروز خونریزی و خطر انتقال بیماری، پس از تشخیص بیماری حتی امکان از خونگیری‌های غیر ضروری اجتناب نماییم (۱۲).

در پایان توجه به این نکته مهم است که در دوره نقاوت بیماری غالباً طولانی و سیر بهبودی بسیار کند و آهسته است و بیمار ممکن است تا چندین هفته پس از بیماری به وضعیت عادی بازگردد (۱۲،۱).

پیشگیری و کنترل:

ایزوپلاسیون بیماران- ویروس CCHF هم از طریق تماس خانگی و هم بصورت بیمارستانی منتقل می‌شود و خون و محتویات استفراغ بیمار شدیداً آلوده کننده بوده و باعث انتقال بیماری می‌شود. مهمترین راه انتقال عفونت به پرسنل سیستم بهداشتی فرو رفتن سوزن آلوده حین عمل جراحی و یا حین خونگیری است (۳). در مواقعی که بیمار مبتلا به CCHF با مشکل تب و درد شکم و خونریزی مراجعه می‌کند گاهی اوقات سریعاً به اطاق عمل جراحی فرستاده شد و لاپاراتومی می‌شوند که البته همه بیمارانی که به این گونه لاپاراتومی شده اند متعاقب لاپاراتومی فوت کرده اند و در موارد معدودی جراح و پرسنل اطاق عمل هم مبتلا شده اند (۳). لذا باید بیماران مشکوک به CCHF و با حین بیمارانی که با مشکل تب و خونریزی مراجعه می‌کنند را ایزوله نمود و در مورد آنان قوانین جداسازی و ایزوپلاسیون مطلق + رعایت شود یعنی که مسائل زیر دقیقاً رعایت شوند:

- بیمار باید در اطاقی در خصوصی بستری شده و درب اطاق همیشه بسته باشد (۳۱،۴).

- بوشیدن چکمه و دستکش و یا لباسهای محافظت کننده جهت پیشگیری از گزش کنه. در صورت عدم وجود چکمه، بهتر است پاچه شلوار خود را داخل جوراب خود نمایند.

- کنترل مداوم لباسها و کفش‌ها و مناطق مرطوب و پرمی بدن از نظر وجود کنه و در صورت مشاهده کنه آنرا با دست بدون دستکش له نکنند.

- هنگام مشاهده کنه بر روی پوست بدن خود باید آن را آهسته و آرام و بوسیله یک موچین یا پنس از بدن خود جدا کنید برای این کار به آهستگی کنه را با موچین گرفته و به آرامی و یا یک سرعت ثابت آن را از پوست جدا کنید.

در صورت پیچاندن کنه و یا کندن سریع کنه، قسمت دهانی کنه داخل پوست باقی مانده و باعث ایجاد عفونت ثانویه در آن محل می‌شود.

بعد از خروج کنه، زخم را تمیز نموده و آن را با یک ماده ضد عفونی کنید. بسیاری از افراد در صورت مشاهده کنه روی پوست بدن خود از روش‌های سنتی و خانگی مثل استفاده از آتش کبریت و آتش سیگار- لاک ناخن و ژل روغنی جهت جدا نمودن کنه استفاده می‌کنند ولی باید دانست که در صورت استفاده از این روش‌ها، کنه محظیات روده خود را به داخل جریان خون انسان می‌ریزد و با رگورژیتاسیون روده کنه، احتمال انتقال بیماری CCHF به انسان بیشتر می‌شود (۳۴).

در مورد پیشگیری از بیماریها در کشتارگاهها و مراکز نگهداری دام‌ها نیز رعایت اقدامات زیر ضروری است:

- دامداران و پرورش دهندگان شترمرغ باید از خطر وجود بیماری و روش‌های صحیح کنترل عفونت و حفاظت شخصی در برابر گزش کنه آموزش کافی داشته باشند (۴).

- باید قبل از وارد نمودن دام‌ها و یا شترمرغ به کشتارگاهها آنها را از بقیه گله جدا نموده و قرنطینه کرد و با استفاده از سوم کنه کش مثل سوموم پیرترونیدی آنها را سمپاشی کرده و پس از ۱۲ تا ۱۴ روز که بقایای سم از بدن آنها دفع شد، حیوان را به کشتارگاه اعزام نمایند. علت توصیه استفاده از سوموم پیرترونیدی اثرات شدید کشنیدگی کنه، مسمومیت زدایی سریع و نیمه عمر کوتاه این سوموم در بدن پستانداران است (۱۲).

دوز پیشنهاد شده جهت پروفیلاکسی mg ۲۰۰ ۱۲ هر ساعت به مدت ۵ روز می‌باشد (۲۵).

ساختمان اقدامات لازم در جهت پیشگیری و کنترل بیماری: یکی از مؤثرترین استراتژی‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت آن است که مانع گزش کنه شویم و با توجه به تنوع فراوان و انتشار گسترده کنه‌ها باید در وهله اول با استفاده از داروهای کنه کش مثل هیپوکلریت ۲٪ و با ترکیبات پیرترونیدی سعی کنیم که در مناطق آلوده کنه‌ها را از بین ببریم. هنگامی که این سوموم با مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر در هر هکتار استفاده شوند، احتمال باقی ماندن کنه در این زمین‌ها بسیار کم می‌شود. ضمناً افرادی که در مناطق آندمیک زندگی می‌کنند و یا به مناطق آندمیک سفر می‌کنند باید روش‌های محافظت از خود در مقابل کنه را بیاموزند و آنها را رعایت کنند. مهمترین اصول حفاظت شخصی در برابر گزش کنه آنست که در مناطق آندمیک هنگام خروج از منزل خصوصاً وقتی که به جنگل و علفزارهای بلند که کنه در آنجا زیاد است می‌رومیم، اقدامات زیر را انجام دهیم (۱۲).

- استفاده از داروهای دور کننده حشرات + نظری (N.N.Diethyl.m.toluamide) DEET منزل داروی DEET که بر روی پوست بدن افراد اسپری و یا مایلده و یا آغشته می‌شود مانع از آن می‌شود که انسان نزدیک شود. این دارو در صورتی که بصورت مداوم و با غلطنهای بالاتر از ۱۰٪ استفاده شود ممکن است باعث بروز تشیع در کودکان شود. بهمین دلیل مصرف غلطنهای بالاتر از ۱۰٪ آن برای کودکان ممنوع است. جهت کاهش بروز عوارض جانبی آن توصیه می‌شود که DEET فقط در نقاطی از پوست استفاده شود که در معرض گزش کنه قرار دارند و تا حد امکان از غلطنهای بالا استفاده نشود. همچنین توصیه می‌شود که کودکان بعد از استفاده دست خود را به دهان نبرده و به چشم خود نمالند. ضمناً "از استفاده از آن در محل‌های زخم و التهاب پوستی اجتناب شود و هنگام مراجعت منزل بقایای DEET را از پوست شستشو داده و در صورت بروز حساسیت با پزشک تماس بگیرند (۴,۱۲).

- پوشیدن لباسهای آغشته به پرمترین هنگام خروج از منزل

پرستاران- کارکنان بیمارستانی و آزمایشگاهها در مورد بیماری- راههای انتقال و کنترل آن بعنوان یک عفونت بیمارستانی آموزش دیده باشدند.^(۳۵,۱۲)

نقش ویروس CCHF در تولید سلاح‌های بیولوژیک و بیوتورپیسم:

اکثر ویروس‌های عامل ایجاد تبهای خونریزی دهنده مثل تب زرد- تب دره دریفت- تب خونریزی دهنده کریمه کنگو- تب لاسا و بیماری ابولا و ماربوبگ چون از طریق آتروسل قابلیت انتشار دارند می‌توان از آنها در مقاصد نظامی و سلاح‌های بیولوژیک استفاده نمود و از آنجا که ویروس‌های ایجاد کننده تبهای همورازیک موجب موربیدیتی بالا و در بعضی افراد باعث مرگ می‌شود و بدلیل آنکه این ویروس‌ها برآختی در محیط کشت سلولی رشد نموده می‌توان به میزان بالانی آنها را تکثیر نمود لذا می‌توان از آنها به صورت تسليحات بیولوژیک استفاده کرد. در میان این ویروسها فیلوبویروس‌ها مثل ویروس ماربوبگ وابولا بدلیل آنکه روش تهیه راحت داشته و قدرت آلوده کنندگی زیادی دارند و از طرفی بعلت آنکه واکسن و داروی مناسبی برای آنها تابحال شناخته نشده است، بسیار خطرناک و منجر به مرگ و میر زیادی می‌شوند. پس بهترین کاندیدا جهت تهیه سلاح بیولوژیک از میان خانواده ویروس‌های همورازیک می‌باشدند. در مورد استفاده از ویروس CCHF بعنوان یک سلاح بیولوژیک گفته می‌شود که فقط محققین روسی تحقیقاتی روی آنها انجام داده و آنرا بعنوان یک سلاح بیولوژیک ارزیابی نموده اند ولی چون خانواده ویروس‌های بونیاوارپیده به حرارت، خشکی و اشعه ماورای بنفس حساس هستند و از طرفی داروی مژیری مثل ریباویرین بر علیه آن وجود دارد کاندید مناسبی برای استفاده آن در تولید سلاح‌های بیولوژیک نیست.^(۳۶)

- حتی الامکان هنگام ذبح حیوانات از دستکش استفاده شود و در صورت وجود زخم در دست افرادی که حیوانات را ذبح می‌کنند نباید دست آنها با خون آلوده تماس داشته باشند.

در مورد استفاده از واکسن برای انسانها جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری CCHF باید گفت که در حال حاضر در کشورهای اروپای شرقی واکسن مشتق شده از مغز موش که با فرمالین غیرفعال شده است طراحی شده و در کشور بلغارستان این واکسن در افراد پرخطر مثل دامداران استفاده شده است ولی هنوز اینمنی و اثربخشی آن تأیید نشده است.^(۲۵)

در پایان ذکر این نکته لازم است که جهت کنترل و پیشگیری از اپیدمی شدن بیماری نقش یک نظام Surveillance قوی و وجود روش‌های عملیاتی مناسب با استفاده از امکانات شبکه‌های بهداشتی درمانی بسیار مهم و ضروری است.

بطوریکه بتوان بر اساس اصول بیماریابی، تشخیص به موقع بیماری، درمان مناسب و افزایش آگاهی در زمینه راههای سرایت و پیشگیری و هماهنگی بین بخشی مناسب ارگانهای ذیربظ مرتباً "Index Case" را تشخیص داده و به موقع از انتشار بیماری و ایجاد اپیدمی جلوگیری نموده و اپیدمی‌های ایجاد شده را نیز با حداقل مرگ و میر کنترل نمود.

جهت بیمار یابی باید برای کلیه پزشکان و بهورزان و کسانی که اولین بیمار بیمار را ویزیت می‌کنند با علامت بیماری کاملاً آشنا شده باشند و بر اساس تعریف استاندارد موارد مشکوک- محتمل و قطعی بیماری به صورت فوری و با تلفن گزارش شود و نمونه سرم بیماران به آزمایشگاه‌های رفرانس که از قبل مشخص شده است ارسال گردد.

جهت درمان مناسب باید داروی ریباویرین حداقل در مراکز استانهای سراسر کشور موجود باشد تا در اسرع وقت برای موارد محتمل و قطعی درمان شروع شود و برای جلوگیری از ایجاد اپیدمی‌های بیمارستانی باید کلیه پزشکان-

منابع

1. Peters CJ. Bunyaviridae in principles and practice of infection disesease. Mandel. C, Douglas. R, Bennelt. J Philadelphia. Churchill living stone. 2000. 1849-1854.
2. Shop RE. Bunyaviridae. Rift valley fever and crimean congo hemorrhagic fever in Tropical infectious disease, principles , pathogenes and practice. Current RI, walker DH, weller PF et al. New York. WB saunders. 1999. 1213-1217.
3. Pana A, Bozovi B, Pavlidou V, et al.Genetic detection and isolation of crimean – congo hemorrhagic fever virus in kosovo, Yugoslavia.Emerg Infect Dis (United States), Aug 2002,(8) 8 p852-4.
4. Cromik MC, Fisher HB, Hoch SP. Crimean-congo hemorrhagic fever in Hunters Tropical Medicine. Strickland GT philadelphia. WB saunders. 2000. 284-288.
5. Morikawa S, Qing T, Xinqin Z, et al.Genetic diversity of the M R N A segment among Crimean- congo hemorrhagic fever virus isolates in China.
6. Papa A, Ma B, Koudou S, et al. Genetic characterization of the M R NA segment of Crimean Congo hemorrhagic fever virus Strains, China. Emerg Infect Dis (United States). Jan 2000,8(1): 50-3.
7. Sanchez AJ Vincent MJ, Nichol ST characterization of the glycoproteins of Crimean Congo hemorrhagic fever virus. J virol (United States), Jul 2002, 76(14) p 7263 –75.
8. bridgen A ,dalrymple AD, Elliott RM dugbe nairovirus S segment: correction of published sequence and comparison of five isolates. Virology (United States), Mar 15 2002, 294(2) p364-71.
9. Bhagat CI, Lewer M, Prins A, et al. Effects of heating plasma at 56 degrees C for 30 min and at 60 degrees C for 60 min on routine biochemistry analytes. Ann Clin Biochem (England), Nov 2000,37 (Pt6) p802-4.
10. Crimean – Congo hemorrhagic fever. Fact sheet No 208 Nov. 2000. <http://www. WHO. Int/inf-fs/en/fact. htm>.
11. Williams RJ, Al- Busaidy S, Mehta FR, et al. Seroepidemiological and tick survey in the Sultanate of Oman. Trop Med Int Health(England), Feb 2000, 5(2) P99-106.
12. منیری رضوان - دسته گلی، کامران - نوروزی ، مهدی : تب خونریزی دهنده کریمه کنگو - تهران - مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تمورزاده - نشر طیب- چاپ اول سال ۱۳۸۰
13. دستورالعمل مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو (CCHF) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت - مرکز مدیریت بیماریها - اداره مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان .
14. Verwoerd DJ ostrich diseases. Rev Sci Tech. Aug 2000.19(2) p638-61.
15. Verwoerd DJ, Olivier A, Gummow B, et al. Experimental infection of vaccinated slaughter ostriches in a natural, open – air feedlot facility with virulent newcastle disease virus. A vian Dis (United states), Jul- Sep 1999, 43(3) p442-52.
16. Swanepoel R, Leman PA, Burt FJ, et al.Experimental infection of ostriches with crimean- Congo haemorrhagic fever virus.Epidemiol Infect (England), Oct 1998, 121(2): 427-32.
17. Weber DJ, Rutala WA risks and prevention of nosocomial transmission of rare zoonotic diseases. Clin Infect Dis (United Ststes), Feb 1 2001, 32(3): 446-56.
18. Borchert M, Boelaert M, Sleurs H, et al. Viewpoint: filovirus haemorrhagic fever outbreaks: much ado about nothing? Trop Med Int Health (England), May 2000, 5(5) p318-24.
19. دکتر آصفی ، ولی الله. مطالعه بالینی ۶۰ مورد بیمار مبتلا به سیندرم خونریزی دهنده عفونی در استان آذربایجان شرقی، مجله نظام پزشکی، سال چهارم (۱۳۵۳)، شماره ۲ صفحه ۱۸۲ تا ۱۸۸.
20. Saidi S, Casals J, Faghihi MA. Crimean hemorrhagic fever- Congo (CHF-C) virus antibodies in man, and in domestic and small mammals in Iran. Am J Trop Med & Hyg. 1975: 24(2): 353-57.
21. Ardoïn A , Karimi Y. Foyer de purpura thrombocytopénique en Iran dans J, Azerbaïda Jan de lest, Med Trop – 1982, 40(3): 219-26.

۲۲. دکتر چینی کار، صادق و همکاران، بررسی سرولوژیک انسان و دام‌های مشکوک به بیماری تب هم‌ورادیک کریمه کنگو به روش الیزای اختصاصی در نقاط مختلف ایران. مجله حکیم زمستان ۱۳۸۰ - شماره ۴ - صفحه ۲۹۰-۳۰۰.

23. Peters , CJ. Infections caused by arthropod and rodent born virus. Branwald E, Fauci A, kasper D. Harrisons Principles of internal medicine New York ,Mc crowhill 2001; p: 1152-1166.

24. Simpson B, Celfand S.Uncommon cause of nosocomial infections. Hospital Epidemiology and infection control. Glen May hall C. williams and wilkins 1996; p: 475-6.

25. CDC management in patients with suspected virus hemorrhagic fever. <http://www.Cdc.gov/epo/mmwr/preview/mmwrht/l/00037085.htm>.

26. Drosten C, Gottig S, Schilling. S. et al. Rapid detection and quantification of RNA of ebola and Marburg viruses, lassa virus, Crimean – Congo hemorrhagic fever virus, rift valley fever virus, dengue virus, and yellow fever virus by real – time reverse transcription- PCR. J Clin Microbiol (United Stats), Jul 2002,40(7) p2323-30.

27. Saito M, Qing T, Niikura M, et al. Immunofluorescence technique using HeLa cells expressing recombinant uncleoprotein for detection of immunoglobulin G antibodies to Crimean – Congo hemorrhagic fever virus. J Clin microbiol (United States) , 2002; 40(2).

28. Saito M, Oing T, Niikura M, et al. Recombinant uncleoprotein- based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of immunoglobulin G antibodies to Crimean- Congo hemorrhagic fever virus. J Clin Microbiol (United States) 2002; 40(5): 1587-91.

29. Benenson SA. Control of communicable disease manual. Washington. American public health Association 1995; p: 51-53.

30. Burt FJ, Leman PA. Smith LF, et al. The use of a reverse transcription– polymerase chain reaction for the detection of viral uncleic asid in the diagnosis of Crimean- Congo haemorrhagic fever. J Virol Methods (Netherlands) 1998; 70(2): 129-37.

31. Sang RC, Dunster LM the growing threat of arbovirus transmission and outbreaks in Kenya: a review. East Afr Med J(Kenya) 2001; 78(12): 655-61.

32. John hopkins – viral hemorrhagic fever. <http://hopkins.BioDefense- org/prevention/VHF: html>.

33. Nur YA, Groen J Heuvelmans H, et al. an outbreak of west Nile fever among migrants in kisangani, democratic republic of Congo 61(6): 885-8.

34. Isaacson M viral hemorrhagic fever hazards for travelers in Africa. clin Infect Dis (Unites States), Nov 15 2001,33 35.

35. Das P infectious disease surveillans update. Lancet Infect Dis (VS) , Feb 2002 2(2) p69.

36. JAMA. hemorrhagic fever virus as biologic weapons. <http://Jama.Org/ issues/ V 287 r 18 /flu/Jst 2000b. html ACP- ASIm. Bioterrorism Resource comter>.