

## عوامل مؤثر در ایجاد کرنیکتروس در ۳۱۲ نوزاد ایکتریک

### چکیده

**زمینه و هدف:** کرنیکتروس یک سندروم عصبی قابل پیشگیری با عوارض نامطلوب است که به علت رسوب بیلی رویین غیرمستقیم در بخش هایی از مغز ایجاد می شود. هدف اصلی در این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در ایجاد کرنیکتروس در نوزادان ایکتریک مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان بوده است.

**روش بررسی:** این پژوهش گذشته نگر با روش نمونه گیری سرشماری طی دوازده ماه ۳۱۲ نوزاد ایکتریک که در بخش نوزادان جهت درمان ایکتر بستری شدند انجام شد. این نوزادان از نظر سن، سطح بیلی رویین سرم، وزن زمان تولد، جنس، سن حاملگی، زمان ترخیص از زایشگاه و فاکتورهای خطر مندرج در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با روش آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

**یافته ها:** ۲۵ بیمار از ۳۰۵ نوزاد ایکتریک بستری شده در بخش نوزادان به عنوان کرنیکتروس حد ترشیخیص داده شدند. تاثیر سن حاملگی، جنسیت، سطح بیلی رویین توتال سرم، زمان ترخیص از زایشگاه، عوامل خطرساز (اسیدوز، پره ماقوریتی، همولیز، هیپوگلیسمی، سپسیس، دیسترس تنفسی)، وزن زمان تولد، ناسازگاری های گروههای خونی و کمبود G6PD بر بروز کرنیکتروس به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت که موارد معنی دار به شرح زیر است: میانگین سطح بیلی رویین توتال در مبتلایان به کرنیکتروس  $32 \text{ mg/dl}$  و در سایر نوزادان ایکتریک  $20 \text{ mg/dl}$  بوده که این اختلاف معنی دار است ( $P=0.001$ ). بروز کرنیکتروس در نوزادان پر خطر به طور معنی داری از نوزادان کم خطر بیشتر بوده است ( $P<0.001$ ). نوزادان کمتر از ۲۵۰۰ گرم به طور معنی داری از نوزادان دارای وزن زمان تولد بیشتر از ۲۵۰۰ گرم دچار کرنیکتروس شدند ( $P=0.04$ ).

**نتیجه گیری:** نوزادان پر خطر به درمان زودهنگام و مؤثر هیپربیلی روینمی برای جلوگیری از بروز کرنیکتروس در سطوح کمتر بیلی رویین نسبت به نوزادان کم خطر نیازمندند.

**کلمات کلیدی:** بیلی رویین، کرنیکتروس، نوزاد، ایکتر.

\*شهین بهجتی اردکانی<sup>۱</sup>

علی نیکخواه<sup>۲</sup>

مجتبی صداقت<sup>۳</sup>

۱. گروه کودکان

۲. دستیار کودکان

۳. گروه پژوهشی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*نویسنده مسئول: تهران، خیابان دکتر محمد قریب، مرکز

طبی کودکان، بخش نوزادان

تلفن: ۶۶۹۲۰۹۸۱-۳

email: behjatis@tums.ac.ir

### مقدمه

برای بروز کرنیکتروس عوامل متعددی دخیل هستند که برخی از آنها عبارتند از سطح بیلی رویین غیرمستقیم (غیرکونژوگه)، جامعیت سد خونی - مغزی در نوزاد و استعداد ذاتی نورونها نسبت به آسیب ها و سوموم. طبق مطالعات انجام شده، بروز کرنیکتروس در نوزادان ترم

کرنیکتروس یا آنسفالوپاتی هیپربیلی رویینی یک سندروم عصبی است که به علت رسوب بیلی رویین غیرمستقیم در گانگلیونهای قاعده ای و هسته های ساقه مغز بروز کرده و در نتیجه، علایم عصبی بیشتر مربوط به درگیری نواحی مذکور می باشد.

همه آزمون‌ها  $0/05$  بوده و بنابراین ضریب اطمینان (C.I)  $95\%$  می‌باشد.

### یافته‌ها

در این مطالعه  $305$  نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند که  $25$  نوزاد دچار عالیم کرنیکتروس بودند در حالی که سایر بیماریهای مشابه (سپسیس، خونریزی مغزی، هیپوگلیسمی و غیره) کنار گذاشته شدند. متغیرهای مورد بررسی عبارتند از: سطح بیلی رویین توتال سرم، جنس، سن حاملگی، کمبود G6PD، ناسازگاری گروههای خونی، وزن زمان تولد، زمان ترخیص از زایشگاه، عوامل خطر. در بررسی آماری تنها در موارد زیر اختلاف معنی‌دار وجود داشته است:

از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس  $21$  مورد بیلی رویین بالای  $25$  میلی‌گرم درصد و فقط چهار مورد بیلی رویین کمتر از  $25$  میلی‌گرم درصد داشتند. همچنین میانگین بیلی رویین توتال سرم در  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس  $32$  میلی‌گرم درصد و در  $280$  نوزاد دیگر  $20$  میلی‌گرم درصد بوده که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار است ( $P=0/001$ ).  $18$  مورد از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ( $72\%$ ) و  $91$  مورد از  $280$  نوزاد ایکتریک دیگر ( $32/5\%$ ) پرخطر بودند که معیارهای آن قبلًا ذکر شد. این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار است ( $P<0/001$ ). هشت مورد از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ( $32\%$ ) و  $41$  مورد از  $280$  نوزاد ایکتریک دیگر ( $14/6\%$ ) دارای وزن زمان تولد کمتر از  $2500$  گرم بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار است ( $P=0/04$ ). در سایر موارد اختلاف موجود از نظر آماری معنی‌دار نبوده است ولی به اختصار ذکر می‌شوند:

هشت مورد از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ( $32\%$ ) و  $64$  مورد از  $280$  نوزاد ایکتریک دیگر ( $22/9\%$ ) پره ترم بودند که این اختلاف معنی‌دار نبود ( $P=0/32$ ).  $14$  مورد از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ( $56\%$ ) و  $142$  مورد از  $280$  نوزاد ایکتریک دیگر ( $50/7\%$ ) مذکور بودند که این اختلاف نیز معنی‌دار نبوده است ( $P=0/67$ ).  $24$  مورد از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ( $96\%$ ) و  $241$  مورد از  $280$  نوزاد ایکتریک دیگر ( $86/1\%$ ) در کمتر از  $72$  ساعت از زایشگاه ترخیص شدند که این اختلاف معنی‌دار نیست ( $P=0/2$ ). سه مورد از  $25$  نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ( $12\%$ ) و  $23$  مورد از  $280$  نوزاد ایکتریک دیگر ( $8/2\%$ ) کمبود G6PD داشتند که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی‌دار نیست

سالم در غیاب همولیز در صورتی که سطح بیلی رویین توتال سرم کمتر از  $25$  میلی‌گرم درصد باشد بسیار نادر است. با این وجود در محدوده نسبتاً وسیعی از سطح بیلی رویین ممکن است عالیم کرنیکتروس بروز کند. ( $21-50$  میلی‌گرم درصد). عموماً عالیم کرنیکتروس طی هفته اول زندگی خود را نشان می‌دهد ولی گاهی اوقات تا  $2-3$  هفتگی به تأخیر می‌افتد.<sup>۱</sup>

به عنوان یک قاعده هر چه نوزاد پره ماقورتر باشد، بیشتر مستعد ابتلا به کرنیکتروس خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، متاسفانه هنوز تخمین دقیقی از شیوع کرنیکتروس در دسترس نیست چرا که محدوده عالیم این سندروم عصبی بسیار وسیع است. بسیاری از بیماران مبتلا به سندروم مذکور از بین رفته و در آنها یکی که زنده می‌مانند، عوارض فراوانی در آینده بروز می‌کند که برخی از آنها مانند عقب‌ماندگی ذهنی، ناشنوایی حسی-عصبی<sup>۲</sup> و فلج اندامها، غیر قابل برگشت و جبران ناپذیر می‌باشند. در این مطالعه ما قصد داریم تا تاثیر برخی عوامل مؤثر در بروز کرنیکتروس را مورد بررسی قرار دهیم.

### روش بررسی

در یک مطالعه گذشته‌نگر نوزادانی که در مدت زمان یکسال (از  $82/1/1$  تا  $83/1/1$ ) با شکایت ایکتریک به مرکز طبی کودکان مراجعه کرده و جهت انجام اقدامات درمانی بستری شدند مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه معیار حذف افراد نوزادانی بودند که پرونده آنها جهت متغیرهای تعیین شده ناقص بود که از مجموع  $312$  نوزاد بستری شده، هفت نوزاد به همین دلیل از مطالعه خارج شدند. نمونه‌گیری به صورت سرشماری کلیه نوزادان ایکتریک بستری شده در مرکز طبی کودکان انجام شد.

از  $305$  نوزاد مورد مطالعه،  $25$  مورد دچار عالیم کرنیکتروس بودند. برای انجام این تحقیق، ابتدا پرسشنامه‌ای طراحی شد که حاوی سوالات مورد نظر و بررسی متغیرهای تعیین شده در جهت اهداف و فرضیات مطالعه می‌باشد. اطلاعات بدست آمده و پرایش شده و با نرم‌افزار آماری SPSS ویراست دهم وارد رایانه شدند. برای توصیف متغیرهای کمی از میانگین و انحراف معیار و برای توصیف متغیرهای کیفی از درصد استفاده شده است. نوزادان دچار کرنیکتروس با توجه به عوامل مؤثر در گروههای دوتایی تقسیم‌بندی شدند. داده‌ها با روش آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی‌دار

دیگر هرچه وزن زمان تولد کمتر باشد، (جدا از پره ماقوریتی که یک فاکتور خطر مجزا و مهم محسوب می‌شود) با اعداد بیلی رویین کمتر (حتی در حد  $41\text{ mg}/\text{dl}$ )<sup>۱۰</sup> احتمال بروز کرنیکتروس وجود دارد.<sup>۶</sup> در مطالعه ما نیز همین نتیجه بدست آمد و ۳۲٪ نوزادان مبتلا به کرنیکتروس LBW بودند. طبق مطالعات قبلی، پره ماقوریتی یک فاکتور خطر برای بروز کرنیکتروس در اعداد پایین بیلی رویین محسوب می‌شده است.<sup>۷</sup> بنابراین اغلب منابع توصیه می‌کنند تا نوزادان ایکتریک پره ماقور در سطح پایین‌تر بیلی رویین نسبت به نوزادان ترم تحت درمان مناسب هیپر بیلی رویینی قرار گیرند.<sup>۸</sup> در مطالعه ما ۳۲٪ از نوزادان مبتلا به کرنیکتروس پره ترم بودند که در مقایسه با سایر نوزادان ایکتریک (۲۲٪)<sup>۹</sup> اختلاف معنی داری مشاهده نشد. از ۲۵ نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ۱۴ مورد پسر و ۱۱ مورد دختر بودند.<sup>۷-۱۰</sup>

در اغلب مطالعات سطح بیلی رویین نوزادان پسر از دختر بیشتر بوده که شاید به دلیل شیوع بیشتر G6PD<sub>def</sub> در پسرها باشد ولی جنسیت، فاکتور خطر عمده‌ای برای بروز کرنیکتروس محسوب نمی‌شود البته این اختلاف شاید به علت فرهنگ خاص موجود در کشور ما باشد که توجه بیشتری به نوزادان پسر و مراجعه زودتر آنها به بیمارستان مرسوم است. در مطالعه در آمریکا، ۸۰ کودک مبتلا به کرنیکتروس مزمن را طی ۱۴ سال (۱۹۸۴-۱۹۹۸) مورد بررسی قرار دادند. همه این کودکان، در کمتر از ۷۲ ساعت پس از زایمان از زایشگاه ترجیص شده بودند.<sup>۸</sup> فراوانی کمبود G6PD در نوزادان مبتلا به کرنیکتروس در مطالعه ما ۱۲٪ بوده است. نقش اتیولوژیک کمبود آنزیم G6PD در بروز ایکتر نوزادی در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. در مطالعه‌ای نشان داده شده که نوزادان دچار کمبود این آنزیم سه برابر بیشتر از نوزادان سالم، مستعد ابتلا به هیپر بیلی رویینی نوزادی هستند.<sup>۹</sup>

در مطالعه ما ارتباط معنی داری از این نظر پیدا نشد. طی سالهای گذشته، کرنیکتروس به وضوح در نوزادان دچار ناسازگاری گروههای خونی (به خصوص ناسازگاری RH) و به دنبال شروع دیرهنگام فوتوراپی و تعویض خون دیده می‌شد اما مطالعات اخیر نشان می‌دهند که این بیماری در گروه وسیع‌تری از نوزادان بروز کرده و در واقع به نوعی دچار طغیان مجدد (افزایش بیلی رویین‌های بالا در سالهای اخیر) شده است.<sup>۱۰-۱۱</sup> در مطالعه ما شش نوزاد مبتلا به کرنیکتروس

(P=۰/۴۵). شش مورد از ۲۵ نوزاد مبتلا به کرنیکتروس (۲۴٪) و ۱۹ مورد از ۲۸۰ نوزاد ایکتریک دیگر (۶٪) ناسازگاری ABO داشتند.

## بحث

همانطور که پیش‌تر ذکر شد در این مطالعه کلیه نوزادان ایکتریک مراجعت کننده به مرکز طبی کودکان طی یکسال (فروردین ماه ۸۲ تا فروردین ماه ۸۳) که جهت انجام اقدامات درمانی برای درمان ایکتر بستری شدند مورد بررسی قرار گرفتند. در اینجا به تفکیک به بحث ارتباط متغیرها با کرنیکتروس و نتایج مطالعات مشابه می‌پردازم. تقریباً در همه مطالعات نشان داده شده که سطح بیلی رویین با بروز کرنیکتروس ارتباط مستقیم داشته و هر چه این میزان بالاتر باشد، احتمال بروز آنسفالوپاتی بیلی رویین بیشتر می‌شود.<sup>۱</sup> در مطالعه ما مشاهده شد که میانگین بیلی رویین توتال سرم در ۲۵ نوزاد مبتلا به کرنیکتروس ۳۲ میلی‌گرم درصد و در ۲۸۰ نوزاد ایکتریک دیگر ۲۰ میلی‌گرم درصد بوده است.

بر اساس تجربیات بالینی، اسیدوز باعث تشدید مسمومیت بیلی رویین می‌شود.<sup>۲</sup> همچنین Sepsis و سایر عفونتها سیستمیک از طریق کاهش ظرفیت اتصالی آلبومین به بیلی رویین و افزایش نفوذپذیری سد خونی- مغزی باعث تشدید مسمومیت بیلی رویین می‌شوند.<sup>۳</sup> همولیز در نوزادان دارای ناسازگاری گروههای خونی و RH یک فاکتور خطر کلاسیک و عمله برای هیپر بیلی رویینی شدید و بروز کرنیکتروس محسوب می‌شوند.<sup>۴</sup> مکانیسم‌های افزایش خطر در چنین نوزادانی هنوز کاملاً روشن نیست. در واقع معلوم نیست که چرا در هر سطحی از بیلی رویین خطر کرنیکتروس در حضور همولیز در مقایسه با عدم همولیز، بیشتر است.<sup>۴</sup> نوزادان پره ماقور بیشتر در معرض خطر اثرات توکسیک بیلی رویین بر مغز هستند. در واقع کرنیکتروس در نوزادان پره ماقور در حضور سطوح پایین‌تری از بیلی رویین ایجاد می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود که درمان مناسب ایکتر در سطوح پایین بیلی رویین سرم در نوزادان پره ماقور آغاز شود.

نقش دیسترس تنفسی احتمالاً به علت وجود اسیدوز تنفسی می‌باشد.<sup>۵</sup> نوزادان دارای وزن زمان تولد کم (LBW) در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به کرنیکتروس هستند.<sup>۶</sup> البته این مورد در مورد نوزادان VLBW (کمتر از ۱۵۰۰ gm) بیشتر صادق است. به عبارت

شدید شروع شده و در نوزادان پرخطر (معیارهای آن قبلًا ذکر شد) در اعداد پائین تر بیلی رویین اقدامات درمانی موثر آغاز گردد. همچنین نگذاریم عدد بیلی رویین به میزان پرخطر بر سد چرا که به طور مستقیم با بروز کرنیکتروس در ارتباط است. با توجه به تعداد زیاد نوزادان مبتلا به کرنیکتروس در این مرکز و ریسک فاکتورهای موثر درمان سریع و با اعداد پائین تر بیلی رویین را توصیه می نماید.

ناسازگاری ABO داشتند که تنها در دو مورد آنها شواهدی از همولیز دیده شد.

**پیشنهادات:** توصیه کلی بر این است که با توجه به آثار ویرانگر و قابل توجه کرنیکتروس مخصوصاً اینکه عوارض آن پس از مدتی مزمن شده و باعث بروز عقب ماندگی ذهنی و اختلالات حرکتی شدید و ناشناختی می شود، درمان سریع، قاطع و موثر هیپر بیلیرویینی

## References

- Kaplan M, Hmmerman C. Understanding severe hyperbilirubinemia and preventing kernicterus: adjuncts in the interpretation of neonatal serum bilirubin. *Clin Chim Acta* 2005; 356: 9-21.
- Thomas B, Newman MD, Liljestrand P, Jeremy RJ, Ferriero DM, Yvonne W. Outcomes among Newborns with Total Serum Bilirubin Levels of 25 mg per Deciliter or More. *N Engl J Med* 2006, 354: 1889-900.
- Koivisto M, Wasz-Hockert O, Vuorenkoski V, Partanen T, Lind J. Cry studies in neonatal hyperbilirubinemia. *Acta Paediatr Scand* 1970, 56: 26-67.
- Nwaesei CG, Van Aerde J, Boyden M, Perlman M. Changes in auditory brainstem responses in hyperbilirubinemic infants before and after exchange transfusion. *Pediatrics* 1984; 74: 800-3.
- Watchko JF. The Clinical Sequels of Hyperbilirubinemia. In: Maisels MJ, Watchko JF, Editors. Neonatal jaundice. Amsterdam: Harwood Academic Publishers: 2000; p.115-35.
- Wennberg RP, Ahlfors CE, Bhutani VK, Johnson LH, Shapiro SM. Toward Understanding Kernicterus: A Challenge to Improve the Management of Jaundiced Newborns. *Pediatrics* 2006; 117: 474-85.
- Watchko JF, Oski FA. Kernicterus in preterm newborns: past, present, and future. *Pediatrics* 1992; 90: 707-15.
- Watchko JF. Neonatal hyperbilirubinemia. What are the risks? *N Engl J Med*. 2006; 354: 1947-9.
- Johnson L, Brown AK. A pilot registry for acute and chronic kernicterus in term and near-term infants. *Pediatrics Suppl* 1999; 104: 736.
- Weng YH, Chou YH, Lien RI. Hyperbilirubinemia in healthy neonates with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. *Early Hum Dev* 2003; 71: 129-36.
- Brown AK, Johnson L. Loss of concern about jaundice and the reemergence of kernicterus in full-term infants in the era of managed care. In: Fanaroff AA, Klaus MH, Editors. Yearbook of neonatal and perinatal medicine. St. Louis, Missouri: Mosby Yearbook: 1996; p.17-28.
- Ebbesen F. Recurrence of kernicterus in term and near-term infants in Denmark. *Acta Paediatr* 2000; 89: 1213-7.

## Risk factors of kernicterus; a study in 312 icteric neonates

Behjati Ardakani S.<sup>1\*</sup>  
Nikkhah A.<sup>2</sup>  
Sedaghat M.<sup>3</sup>

1- Department of Neonatology  
Children's Hospital, Medical  
Center  
2- Children's Hospital, Medical  
Center  
3- Department of Social Medicine

Tehran University of Medical  
Sciences

### Abstract

**Background:** Kernicterus, also known as bilirubin encephalopathy, is a neurologic syndrome resulting from the deposition of unconjugated bilirubin in the basal ganglia and brainstem nuclei. Indirect bilirubin is toxic for brain. Neurologic dysfunction (BIND) that include acute phase (hyperbilirubin encephalopathy) and chronic phase (Kernicterus) resulting from hyperbilirubinemia and disruption of blood brain barrier. In this study, the association between bilirubin encephalopathy and risk factors was evaluated.

**Methods:** In this retrospective study, 312 icteric neonates were admitted in the neonatal ward of Children's Hospital, Medical Center, Tehran, and 305 of these cases were evaluated. Patient histories were taken and physical examinations were performed. For each patient, the age, sex, birth weight, time of discharge from the hospital and risk factors were recorded, and a questionnaire was completed.

**Results:** In this study, of the 305 icteric neonates evaluated, 25 cases had kernicterus. Risk factors included acidosis, prematurity, hemolysis, hypoglycemia, sepsis, respiratory distress, low birth weight, ABO incompatibility and G6PD deficiency. The mean level of bilirubin in cases of kernicterus was 32 mg/dl and in the others was 20 mg/dl ( $p=0.001$ ). Kernicterus was most common among high risk neonates ( $p<0.001$ ). Birth weight less than 2,500 gm was also an important factor ( $p=0.04$ ).

**Conclusion:** High-risk neonates need prompt treatment for hyperbilirubinemia compared to low risk neonates.

**Keywords:** Bilirubin, kernicterus, neonate, icteric.

\* Corresponding author: Department of Neonatology Children's Hospital, Medical Center, Gharib Ave., Tehran. Tel: +98-21-66920981-3 email: behjatis@tums.ac.ir