

اثربخشی آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به انتخاب محصول غذایی مناسب براساس نشانگر رنگی تغذیه‌ای (چراغ راهنمای) مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی

چکیده

دربافت: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ پذیرش: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ آنلاین: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰

زمینه و هدف: آموزش جامعه در راستای تغذیه صحیح می‌تواند نقش مهمی در کاهش شیوع بیماری‌های غیرواگیر داشته باشد. نشانگر رنگی تغذیه‌ای (چراغ راهنمای) مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی مقادیر عوامل خطر در بروز بیماری‌های غیرواگیر (انرژی، قند، چربی، نمک و اسیدچرب ترانس) را به مصرف کنندگان انتقال می‌دهد. شدت خطر عوامل گفته شده از طریق سه رنگ قرمز، زرد و سبز به ترتیب نشان‌دهنده خطر، هشدار در مصرف مکرر و ایمن جهت استفاده از محصولات غذایی براساس شرایط بدنی و جسمانی مصرف کنندگان ارایه می‌شود. پژوهش کنونی با هدف تاثیر آموزش بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به انتخاب غذای مناسب براساس نشانگرهای رنگی تغذیه‌ای مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی صورت پذیرفت.

روش بررسی: در مطالعه تجربی کنونی، انتخاب تصادفی ۳۷۹ نفر از دانشجویان^۹ دانشکده فعل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت پذیرفت. آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در مورد نشانگر رنگی تغذیه‌ای براساس تکمیل پرسشنامه محقق‌ساخته از دی ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶ اندازه‌گیری شد. آموزش به صورت چهربه‌چهره با استفاده از پمپلت صورت گرفت و در فاصله زمانی سه تا شش ماه پس از آموزش، دوباره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان با تکمیل پرسشنامه تعیین شد.

یافته‌ها: میانگین امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد پیش از آموزش به ترتیب ۰/۸۴، ۱/۱۲±۰/۸۴ و ۱/۲۵±۰/۲ بود. امتیازات پس از آموزش به ۱/۱۱/۷۲±۰/۷۵، ۱/۱۸/۶۷±۰/۳/۱۸، ۱/۱۷/۶۹±۰/۴/۷ ارتقا یافت. تفاوت معناداری در امتیازات آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پیش و پس از آموزش مشاهده شد ($P<0/05$).

نتیجه‌گیری: آموزش نشانگر رنگی تغذیه‌ای نقش موثری در بهبود آگاهی، نگرش و تا حدودی عملکرد دانشجویان در انتخاب محصول غذایی مناسب داشت.

کلمات کلیدی: نگرش، آموزش، برچسب محصول غذایی، ایران، آگاهی، عملکرد، دانشجویان، نشانگر رنگی تغذیه‌ای.

زهرا اسفندیاری^{۱*}، محمد رضا مراثی^۳

فاطمه استنکی^۱، وحید صنعتی^۱

الناز پناهی^۱، نادر اکبری^۱

رویالسادات مدنی^۱، زیلا مصیریان تنها^۱

۱- گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲- گروه تحقیق و توسعه، معاونت خلا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۳- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۴- مرکز تحقیقات سرطان‌شناسی امدادی آندروسون، دانشگاه تکراس، هوستون، تکراس، آمریکا.

* نویسنده مسئول: اصفهان، جاده اصفهان شیراز، خیابان خلیج فارس ۳۶، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت غذا و دارو.

تلفن: ۰۳۱-۳۶۵۴۷۹۵۰
E-mail: research_esfandiry@mui.ac.ir

مقدمه

مرگ‌ومیر ۳۵ میلیون انسان که معادل ۶۰٪ از کل مرگ‌ومیر جهان می‌باشد به‌واسطه بیماری‌های غیرواگیری مانند قلبی-عروقی، سرطان، دیابت و تنفسی اتفاق می‌افتد.^۲ استراتژی سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۲۵ میلادی، کاهش خطر مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر تا میزان ۲۵٪ است.^۱ در ایران کاهش ۰/۳۰٪ متوسط مصرف نمک، به صفر رساندن میزان اسیدهای چرب ترانس در روغن‌های

عادات غذایی نادرست و دریافت بالای پنج شاخص موثر بر سلامت (انرژی، قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس) از محصولات غذایی، یکی از مهمترین عوامل خطر در بروز بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان و دیابت معرفی شده‌اند.^۱ در حال حاضر سالیانه

آگاهی، نگرش، عملکرد و نشانگر رنگی تغذیه‌ای از دی ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۶ در ۹ دانشکده فعال (بهداشت، پیراپزشکی، پرستاری، پزشکی، تغذیه، توانبخشی، داروسازی، دندانپزشکی و مدیریت و اطلاع‌رسانی) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی شد.

طراحی "پرسشنامه آگاهی، نگرش و عملکرد انتخاب محصولات غذایی مناسب براساس نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی" براساس ضابطه نشانگر رنگی تغذیه‌ای سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعتبار علمی و روایی (Validity) پرسشنامه توسط اساتید دانشکده تغذیه و علوم غذایی، آمار و اپلیمیلوژی و داروسازی و کارشناسان خبره نظارت بر محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت پذیرفت.^{۱۰} ضرب آلفای کرونباخ (Cronbach's alpha) برای تعیین روایی سوالات پرسشنامه محاسبه گردید ($\alpha = 0.75$). در نهایت پرسشنامه‌ای براساس ویژگی‌های دموگرافیک، ۱۲ سوال در خصوص آگاهی (K1-K12)، جدول (۱)، شش سوال در خصوص نگرش (A1-A6)، جدول (۲) و هفت سوال در خصوص عملکرد (P1-P7)، جدول (۳) آماده‌سازی گردید.

سوالات در بخش آگاهی تأکید بر شناخت جامعه تحت پژوهش نسبت به عنوانی بیماری‌های غیرواگیر، نشانگر رنگی تغذیه‌ای، رنگ‌های تعریف‌شده آن و ارتباط عوامل خطر بیان‌شده برروی نشانگرها با بیماری‌های غیرواگیر داشت. نحوه امتیازدهی به بخش آگاهی به صورت "بله" و "خیر" طراحی گردید. به پاسخ‌های درست و غلط در این بخش به ترتیب امتیازات ۱ و ۰ اختصاص یافت. فاصله امتیاز برای بخش آگاهی از ۰ تا ۱۲ و امتیاز کمتر از ۶، ضعیف در نظر گرفته شد.

سوالات قسمت نگرش با اهمیت بر توجه مصرف‌کنندگان به اطلاعات مندرج در نشانگر رنگی تغذیه‌ای در بسته‌بندی محصولات غذایی طراحی گردید. پاسخ به سوالات این بخش براساس مقایسه لیکرت از "شیدیداً مخالفم"، "مخالفم"، "نظری ندارم"، "موافقم" و "شیدیداً موافقم" از امتیاز ۰ تا ۴ و امتیاز کلی ۲۴ بود. امتیازات کمتر از ۱۲ به عنوان ضعیف در نظر گرفته شد. پاسخ به سوالات قسمت عملکرد که مربوط به نحوه خرید محصولات غذایی توسط مصرف‌کنندگان براساس بررسی اطلاعات در نشانگر رنگی تغذیه‌ای

خوارکی و محصولات غذایی و جایگزینی آن با چربی‌های اشباع‌نشده و ثابت نگهدارشدن میزان بیماری‌های دیابت و چاقی به عنوان سه هدف اصلی برای رسیدن به کاهش میزان بیماری‌های غیرواگیر در سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.^{۱۱}

سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان سازمان ناظر بر سلامت و اینمی محصولات غذایی مانند دیگر کشورهای دنیا از جمله انگلیس،^{۱۲} نیوزیلند،^{۱۳} آلمان،^{۱۴} ایتالیا،^{۱۵} استرالیا،^{۱۶} کشورهای آسیایی^{۱۷} و آمریکایی^{۱۸-۱۹} اقدام به پیاده‌سازی طرح درج نشانگرها رنگی تغذیه‌ای (چراغ راهنمای) بر روی بسته‌بندی محصولات غذایی نموده است تا داده‌های شفاف و قابل درک در خصوص مقدار دریافت شاخص‌های موثر بر سلامت در محصولات غذایی را به آگاهی مصرف‌کنندگان برساند.^{۲۰}

درجه خطر و سلامت شاخص‌های موثر بر سلامت از طریق سه رنگ قرمز، زرد و سبز در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان داده می‌شود. رنگ‌های قرمز، نارنجی و سبز به ترتیب در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان‌دهنده بالا، متوسط و کم بودن شاخص مورد نظر است و به ترتیب به عدم مصرف، هشدار در مصرف مکرر و اینم بودن برای مصرف براساس شرایط بدنی و جسمانی مصرف‌کنندگان اشاره دارد.^{۲۱} ناکافی بودن آگاهی و نگرش جامعه و در نتیجه انتخاب نامناسب محصولات غذایی در عملکرد می‌تواند فرد را از مصرف غذای سالم محروم نماید. بنابراین آموزش، آگاهی‌رسانی و افزایش سطح سواد سلامت و در نتیجه خودمراقبتی با هدف انتخاب درست محصولات غذایی در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر اهمیت بسزایی دارد.^{۲۲}

گزارشات متشرشده در کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد که استفاده از رنگ در نشانگر رنگی تغذیه‌ای در تصمیم‌گیری درست، عملکرد و رفتار مصرف‌کنندگان در خصوص انتخاب محصول غذایی سالم‌تر، موثر بوده است.^{۱۱-۱۳} هدف از این پژوهش، سنجش اثربخشی آموزش نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

روش بررسی

پژوهش کنونی از نوع تجربی و بر اساس پنج متغیر آموزش،

۴۳ (۱۱/۴٪) نفر در پژوهش کنونی شرکت نمودند. در مجموع، ۲۵۳ نفر (۶۷/۸٪) در مقطع کارشناسی، ۵ مورد (۱/۳٪) در مقطع کارشناسی ارشد و ۱۲۱ دانشجو (۳۱/۹٪) مقطع دکترا در حال تحصیل بودند. ارتباط معناداری در جنسیت، رشته و مقطع تحصیلی و سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مطالعه کنونی مشاهده نشد ($P > 0.05$).

جداول ۱ تا ۳ به ترتیب سوالات مربوط به متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد و همچنین تعداد و درصد پاسخ‌های انتخاب شده مربوط به فاکتورهای گفته شده را نشان می‌دهد. در خصوص آگاهی، امتیازات از ۱/۱۲±۰/۸۴ به ۱۱/۷۲±۰/۷۵ افزایش داشت ($P < 0.05$). در حیطه نگرش نیز امتیازات نمونه‌های مورد مطالعه از ۱۴/۴۴±۲ در پیش از مداخله به ۱۸/۶۷±۲/۱۸ پس از اجرای برنامه آموزشی ارتقا یافت ($P < 0.05$). امتیاز عملکرد دانشجویان در انتخاب محصولات غذایی پیش از آموزش ۲/۲۵±۲/۲ و پس از آموزش ۱۷/۶۹±۴/۷ محاسبه گردید ($P < 0.05$).

بحث

نتایج پژوهش کنونی نشان داد که آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در ارتباط با نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی پیش از آموزش پایین بود. سپس با مداخله آموزشی صورت گرفته در امتیاز دو متغیر آگاهی و نگرش و تا حدودی در عملکرد، ارتقا مشاهده شد. در حال حاضر براساس آمار سازمان جهانی بهداشت میزان مرگ‌ومیر بیماری‌های غیرواگیر بالا می‌باشد.

در این خصوص با توجه به اطلاع‌رسانی گستره سازمان‌های ناظر بر سلامت مانند معاونت بهداشتی، درمان و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی، بیشتر دانشجویان (۸۱/۷٪) آگاهی لازم در این خصوص داشتند و با ارایه آموزش این میزان تا ۹۷/۱٪ افزایش یافت (K1). جدول (۱) ۱۷۰۳۱۴۱۳۹۴ اما دانشجویان آگاهی لازم را در خصوص دلیل درج نشانگر رنگی تغذیه‌ای بر بسته‌بندی محصول غذایی که از سیاست‌های در حال اجرا در سازمان غذا و دارو از سال ۱۳۹۴ می‌باشد نداشتند. با آموزش گروه تحت پژوهش، آگاهی در این خصوص با ارتقای چشمگیری همراه بوده است. ارتقای امتیاز در مرحله پیش و پس از آموزش برای دو شاخص

در زمان خرید و تقاضای محصول بود با پنج پاسخ "هیچ وقت"، "به‌ندرت"، "گاهی اوقات"، "اغلب" و "همیشه" با اختصاص امتیاز ۰ تا ۴ و با امتیاز کلی ۲۸ سازماندهی گردید. امتیازات زیر ۱۴ در این قسمت ضعیف لحاظ گردید.

به‌منظور تعیین اعتماد علمی و پایایی (Reliability) پرسشنامه، ۳۰ پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری نموده و با روش آزمون مجدد (Test-retest) به فاصله زمانی یک هفته در دو نوبت پرسشنامه را تکمیل نمودند. تداوم و همگونی سوالات پرسشنامه با تجزیه و تحلیل موردنی هریک از سوالات پاسخ داده شده بررسی گردید ($P < 0.05$).

تکمیل مرحله اول پرسشنامه توسط ۳۷۹ نفر از دانشجویان توسط پژوهشگران آموزش‌دهیده تیم تحقیقاتی کنونی به صورت مصاحبه انجام شد. معیار ورود به مطالعه، دانشجویانی بودند که برای خود یا خانواده خود خرید محصولات غذایی را به صورت مستمر انجام می‌دادند. پس از آن، آموزش به صورت چهره به چهره به صورت گرفت و مطالب آموزشی به صورت پمپلت در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت. سپس در فاصله زمانی ۳ تا ۶ ماه، آزمون ثانویه با استفاده از

پرسشنامه‌ای که مانند پرسشنامه آزمون اول بود تکرار شد.

متغیرهای کمی به صورت میانگین و انحراف‌معیار و متغیرهای کیفی به صورت فراوانی یا درصد محاسبه گردید. بررسی ارتباط رشته، مقطع تحصیلی و جنس دانشجویان شرکت‌کننده با وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد آنها با Mann-Whitney U test تحلیل شد. Student's t-test جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌های کمی-کیفی و تاثیر آموزش بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد در دو آزمون در SPSS software، version 20 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) به کار گرفته شد.

سطح معناداری کمتر از ۰/۰۵ تعریف گردید.

یافته‌ها

از ۳۷۹ دانشجوی شرکت‌کننده در پژوهش کنونی به ترتیب ۲۱۴ و ۱۶۵ دانشجو، زن و مرد بودند. دانشجویان با رشته‌های تحصیلی بهداشت، پیراپزشکی، پرستاری، پژوهشکی، تغذیه، توانبخشی، داروسازی، دندانپزشکی و مدیریت و اطلاع‌رسانی به ترتیب ۴۶ (۱۲/۱)، ۴۶ (۱۲/۱)، ۴۱ (۱۰/۸)، ۴۷ (۱۲/۴)، ۴۷ (۱۲/۴)، ۴۵ (۱۱/۹)، ۳۵ (۹/۲)، ۲۹ (۷/۷) و

جدول ۱: تعداد و درصد فراوانی پاسخهای مربوط به سوالات بخش آگاهی در مرحله پیش و پس از آموزش توسط ۳۷۹ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف	سوال	پیش از آموزش	پس از آموزش	درست	درست	غلط	غلط	درست	غلط	درست	غلط
		(فراآنی)	(فراآنی)	(فراآنی)	(فراآنی)						
K1	بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و سرطان از مهمترین بیماری‌های غیرواگیر هستند. که عادات غذایی نامناسب در بروز آن‌ها نقش موثری دارد.	(۲/۹) ۱۱ (۴۷/۱)	۳۶۸ (۱۲/۹)	۴۹ (۸۷/۱)	۳۳۰						
K2	هدف از درج نشانگر رنگی تغذیه‌ای بر بسته‌بندی محصولات غذایی، ارایه اطلاعات مربوط به عوامل خطر تغذیه‌ای تاثیرگذار در بروز بیماری غیرواگیر است.	(۳/۲) ۱۲ (۹۶/۸)	۳۶۷ (۹۶/۸)	۳۶۷ (۹۶/۸)	(۳/۲) ۱۲						
K3	نشانگر رنگی تغذیه‌ای اشاره به مقدار پنج شاخص موثر بر سلامت (انرژی، قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس) دارد.	(۳/۷) ۱۴ (۹۶/۳)	۳۶۵ (۹۷/۴)	۳۶۹ (۹۷/۴)	(۲/۹) ۱۰						
K4	رنگ سبز ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشانه انتخاب مطمئن محصول غذایی است.	(۰/۸) ۳ (۹۹/۲)	۳۷۶ (۹۸/۴)	۳۷۳ (۹۸/۴)	(۱/۶) ۶						
K5	رنگ قرمز ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشانه بالا بودن میزان شاخص موردنظر و محدودیت در مصرف محصول است.	(۱/۱) ۴ (۹۸/۹)	۳۷۵ (۹۷/۹)	۳۷۱ (۹۷/۹)	(۲/۱) ۸						
K6	رنگ زرد یا نارنجی در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشانه انتخاب به نسبت خوب محصول غذایی است و هشدار به مصرف مکرر محصول دارد.	(۱/۶) ۶ (۹۸/۴)	۳۷۳ (۹۷/۶)	۳۷۰ (۹۷/۶)	(۲/۴) ۹						
K7	مقدار بالای انرژی ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان می‌دهد که مصرف زیاد محصول غذایی، می‌تواند منجر به چاقی و افزایش وزن شود.	(۱/۱) ۴ (۹۸/۹)	۳۷۵ (۹۷/۱)	۳۶۸ (۹۷/۱)	(۲/۹) ۱۱						
K8	مقدار بالای قند ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان می‌دهد که مصرف زیاد محصول غذایی، می‌تواند منجر به بیماری دیابت شود.	(۲/۱) ۸ (۹۷/۹)	۳۷۱ (۹۸/۲)	۳۷۲ (۹۸/۲)	(۱/۸) ۷						
K9	مقدار بالای چربی ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان می‌دهد که مصرف زیاد محصول غذایی، می‌تواند منجر به بیماری چاقی و افزایش وزن شود.	(۲/۴) ۹ (۹۷/۶)	۳۷۰ (۹۷/۶)	۳۷۰ (۹۷/۶)	(۲/۴) ۹						
K10	مقدار بالای نمک ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان می‌دهد که مصرف زیاد محصول غذایی، می‌تواند منجر به بیماری قلبی-عروقی شود.	(۲/۶) ۱۰ (۹۷/۴)	۳۶۹ (۹۶/۰)	۳۶۴ (۹۶/۰)	(۴/۰) ۱۵						
K11	مقدار بالای اسیدهای چرب ترانس ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای نشان می‌دهد که مصرف زیاد محصول غذایی، می‌تواند منجر به بیماری سرطان شود.	(۳/۲) ۱۲ (۹۶/۸)	۳۶۷ (۹۸/۴)	۳۷۳ (۹۸/۴)	(۱/۶) ۶						
K12	امکان مقایسه دو محصول متفاوت مانند شیر و آب میوه براساس اطلاعات ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای برای مصرف کنندگان وجود ندارد.	(۳/۴) ۱۳ (۹۷/۶)	۳۶۶ (۹۹/۵)	۳۷۷ (۹۹/۵)	(۰/۵) ۲						

جدول ۲: تعداد و درصد فراوانی پاسخ‌های مربوط به سوالات بخش نگرش در مرحله پیش و پس از آموزش توسط ۳۷۹ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف	سوال	"شیدیداً موافق"	"موافق" (فراوانی)	"نظری ندارم"	"مخالفم" (فراوانی)	"شیدیداً موافق"	"موافق" (فراوانی)	"پیش از آموزش"	"پیش از آموزش"
		پیش از آموزش	آموزش	پیش از آموزش	آموزش	پیش از آموزش	آموزش	آموزش	آموزش
۱۰	توجه به اطلاعات مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی در خصوص نشانگر رنگی تغذیه‌ای اهمیت دارد.	۱۱۰	۱۰	۲۱۰	۲۹	۲۰	۲۵	۲۰	۲۰
(۲/۶)	(۵/۳)	(۶/۶)	(۵/۳)	(۷/۷)	(۸۱/۸)	(۵۴/۱)	(۵)	(۱۹)	(۲۰۵)
A1		(۲/۱) ۸	(۳۹/۶)	(۳۷/۹)	(۸۹/۴)	(۸/۷)	(۳/۲)	(۱۲)	(۳۱)
A2	توجه به میزان قند، چربی، نمک و اسیدچرب ترانس و رنگ ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی در پیشگیری از بیماری غیرواگیر اهمیت دارد.	(۱/۶) ۶	(۱/۶) ۶	۱۴۰	۳۳۹	۱۲	۳۱	۱۶	۲۵
A3	توجه به میزان انرژی در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی در پیشگیری از چاقی و افزایش وزن اهمیت دارد.	۱۵۰	(۲/۱) ۸	(۱/۸) ۷	(۱/۳) ۵	(۴) ۱۵	۳۵	(۶/۶)	(۶/۶)
A4	بهتر است مصرف کنندگان براساس شرایط جسمانی فیزیکی خود و باکمک اطلاعات ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی، محصول غذایی مورد نیاز خود را انتخاب نمایند.	۱۲۰	(۲/۴) ۹	(۳۱/۷)	(۵۲/۸)	(۸۵/۸)	(۴/۷)	(۶/۶)	(۴/۵)
A5	عدم انتخاب درست و عدم اصلاح الگوی مصرف محصول غذایی می‌تواند بر سلامت مصرف کنندگان تاثیرگذارد باشد و منجر به بروز بیماری‌های شود که هزینه‌های درمانی سنگینی بر خانواده‌ها تحمل نماید.	۲۰۰	(۴/۸) ۸	(۵۲/۸)	(۴۴/۸)	(۴۷/۴)	(۰) ۰	(۰/۱) ۸	(۰/۸) ۳
A6	آموزش به جامعه در خصوص نشانگر رنگی تغذیه‌ای در راستای الگوی مصرف، ارتقای سطح سواد سلامت و پیشگیری از بروز بیماری‌های غیرواگیر اهمیت دارد.	۱۸۹	(۴۹/۸)	(۶۰/۷)	(۴۲/۵)	(۲۶/۶)	(۵/۳)	(۱/۱) ۴	(۱/۷) ۶

جدول ۳: تعداد و درصد فراوانی پاسخ‌های مربوط به سوالات بخش عملکرد در مرحله پیش و پس از آموزش توسط ۳۷۹ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف	سوال	"همشه"	"اغلب"	"پیش از"	"پیش از"	"گاهی اوقات"	"بهندرت"	(فراآنی)"	(فراآنی)										
		آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	آموزش	
۶۵	اطلاعات نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی در خرید شما تاثیر دارد؟	P1	۲۸۰	۴۰	۴۶	۸۳	۳۱	۱۲۱	۱۳	۷۰	۹								
(۱۷/۲)	(۷۳/۹)	(۱۰/۶)	(۱۲/۱)	(۲۱/۹)	(۸/۲)	(۳۱/۹)	(۳/۴)	(۱۸/۴)	(۲/۴)										
۷۵	تفاوت رنگ در شاخص‌های موثر بر سلامت در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی در خرید شما تاثیر دارد؟	P2	۳۴۲	۵۵	۱۸	۵۱	۴	۱۱۲	۷	۸۶	۸								
(۱۹/۷)	(۹۰/۲)	(۱۴/۵)	(۴/۷)	(۱۳/۵)	(۱/۲)	(۲۹/۶)	(۱/۸)	(۲۲/۷)	(۲/۱)										
۴۰	میزان انرژی در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی در خرید شما تاثیر دارد؟	P3	۲۳۵	۶۹	۲۳	۶۰	۷	۱۲۰	۸	۹۰	۶								
(۱۰/۶)	(۸۸/۴)	(۱۸/۲)	(۷/۱)	(۱۵/۸)	(۱/۸)	(۳۱/۷)	(۲/۱)	(۲۳/۷)	(۱/۶)										
۲۲	میزان قند در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی و رنگ آن در خرید شما تاثیر دارد؟	P4	۳۲۰	۴۷	۳۱	۶۹	۱۴	۱۳۹	۱۰	۱۰۲	۴								
(۵/۸)	(۸۴/۴)	(۱۲/۴)	(۸/۲)	(۱۸/۲)	(۳/۷)	(۳۷/۷)	(۲/۶)	(۲۶/۹)	(۱/۱)										
۵۰	میزان چربی در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی و رنگ آن در خرید شما تاثیر دارد؟	P5	۲۸۵	۶	۵۰	۴۲	۲۴	۱۶۰	۱۰	۱۲۱	۱۰								
(۱۳/۲)	(۷۵/۲)	(۱/۶)	(۱۳/۳)	(۱۱/۱)	(۷/۳)	(۴۲/۲)	(۲/۶)	(۳۱/۹)	(۲/۶)										
۲۰	میزان نمک در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی و رنگ آن در خرید شما تاثیر دارد؟	P6	۲۰۵	۱۷	۶۵	۳۸	۳۳	۱۴۸	۱۳	۱۵۶	۱۳								
(۵/۳)	(۶۷/۳)	(۴/۴)	(۱۷/۲)	(۱۰)	(۸/۷)	(۳۹/۱)	(۳/۴)	(۴۱/۲)	(۳/۴)										
۲۳	میزان اسیدهای چرب ترانس در نشانگر رنگی تغذیه‌ای مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی و رنگ آن در خرید شما تاثیر دارد؟	P7	۳۷۳	۸۰	۳	۹۲	۱	۱۱۵	۱	۶۹	۱								
(۷/۱)	(۹۸/۳)	(۲۱/۱)	(۰/۸)	(۲۴/۳)	(۰/۳)	(۳۰/۳)	(۰/۳)	(۱۸/۲)	(۰/۳)										

کارکنان شاغل در انتستیتوی تحقیقاتی ملی سلامت در تایوان می‌باشد. در این بررسی در ابتدا یک پرسشنامه شامل ۲۵ سوال در سال ۲۰۱۴ جهت ارزیابی اولیه آگاهی و نگرش توسط کارکنان تکمیل گردید. سپس آموزش نشانگر رنگی تغذیه‌ای با توزیع گسترده اطلاعات از طریق چسباندن پوسترهای طراحی شده از نشانگر رنگی تغذیه‌ای بر روی

گفته شده شامل هدف و معرفی نشانگر رنگی تغذیه‌ای از میزان زیر ۵٪ به بالای ۹۵٪ همراه بوده است (سوالات K2 و K3). ارتقای وضعیت در امتیاز نگرش و عملکرد (سوال A1 و P1) نیز تحت تاثیر مداخله آموزش مشاهده گردید (جداول ۱ تا ۳). یافته‌های مطالعه کنونی هم‌استا با پژوهش صورت گرفته در یک رستوران بر روی

(سوالات K4-K6، A2 و P2).

از نتایج قابل توجه در پژوهش کنونی آن است که نگرش دانشجویان، در خصوص نقش الگوی مصرف تغذیه‌ای مناسب بر سلامت و پیشگیری از بروز بیماری‌ها، در مرحله پیش از آموزش مثبت بوده است و همچنین آموزش به جامعه در خصوص نشانگر رنگی تغذیه‌ای در راستای اصلاح در الگوی مصرف، ارتقای سطح سواد سلامت و پیشگیری از بروز بیماری‌های غیرواکیر را ضروری و مهم دانستند (A5-A6).

از محدودیت‌های پژوهش کنونی می‌توان به مواردی مانند خوداظهاری در تکمیل سوالات پرسشنامه بهویژه در بخش عملکرد و عدم امکان بررسی آن به صورت عینی در زمان خرید محصول غذایی، همچنین عدم انجام پژوهش‌های مشابه در کشور در خصوص بررسی تاثیر آموزش اطلاعات مندرج در بسته‌بندی محصول غذایی بر سواد سلامت و خودمراقبتی اشاره کرد. مطالعه کنونی نشان داد اگرچه آموزش نشانگر رنگی تغذیه‌ای نقش موثری در بهبود آگاهی و نگرش دانشجویان داشت اما عملکرد آن‌ها در انتخاب محصول غذایی مناسب براساس اطلاعات مندرج در نشانگر رنگی تغذیه‌ای تا حدودی قابل پذیرش می‌باشد.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به انتخاب محصول غذایی مناسب براساس نشانگر رنگی تغذیه‌ای (چراغ راهنمای) مندرج بر بسته‌بندی محصولات غذایی" مصوب در شورای پژوهشی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۵ با کد تصویب ۲۹۵۲۰۴ و اخلاق IR.MUI.REC.1395.2.204 می‌باشد و حمایت مالی آن توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است.

میزهای غذاخوری، محیط رستوران بهویژه در مسیر دریافت غذا، ارسال ایمیل اطلاعات مدنظر به کلیه کارکنان و برگزاری کمپین‌های اطلاع‌رسانی صورت گرفت. در سال ۲۰۱۵ نیز پرسشنامه بعدی با هدف ارزیابی نگرش و عملکرد کارکنان تکمیل گردید. تاثیرات مثبت آموزش نشانگر رنگی تغذیه‌ای، به عنوان یک روش قابل پذیرش و قابل فهم که می‌تواند منجر به انتخاب محصول غذایی سالم‌تر گردد در این مطالعه نتیجه گیری شد.^{۱۱}

بررسی وضعیت امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در خصوص رنگ‌های ارایه شده در نشانگر رنگی تغذیه‌ای، نشان‌دهنده ضعف در این معیار در زمان پیش از آموزش می‌باشد (سوالات K4-K6، A2 و P2). استفاده از رنگ‌های سبز، زرد و قرمز در نشانگر رنگی تغذیه‌ای شرایطی را برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند که در راحت در خصوص مقدار و درجه خطر عوامل تاثیرگذار بر سلامت بهویژه بیماری‌های غیرواکیر میسر گردد. همچنین صرفه‌جویی زمانی در انتخاب محصول غذایی مناسب براساس شرایط جسمانی فیزیکی از دیگر منافع آن است.

با توجه به تعداد و فراوانی پاسخ‌های ارایه شده در بخش عملکرد به موارد "شدیداً موافق" و "موافق" در مرحله پس از آموزش می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از رنگ در نشانگر رنگی تغذیه‌ای فرایند انتخاب محصول غذایی را برای دانشجویان تسهیل می‌کند. در واقع پهبود عملکرد دانشجویان در زمان انتخاب محصول غذایی مشاهده می‌شود. در دیگر مطالعات صورت گرفته، اشاره به سهولت انتخاب محصول غذایی توسط خریداران براساس نگاهی سریع به رنگ‌های نشانگر رنگی تغذیه‌ای شده است.^{۱۲} با توجه به اهمیت موضوع در بخش پایینی نشانگر رنگی تغذیه‌ای، راهنمایی برای رنگ‌ها در ایران در خصوص مقدار عامل خطر (اندک، متوسط و زیاد) درج شده است. بهمین دلیل بخشی از سوالات پرسشنامه پژوهش کنونی به آن اختصاص یافت

References

1. World Health Organization (WHO). Global Status Report on Non-Communicable Diseases 2014 [Internet]. 2014 Jan [cited 2014 Jan 1]. Available from: <http://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-2014/en>
2. Iranian National Committee for NCDs Prevention and Control. National Action Plan for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases and the Related Risk Factors in the Islamic Republic of Iran, 2015-2025.
- [Internet]. 2015 Jan [cited 2015 Jan]. Available from: <http://www.nedrc.info/index.php/en/publications/item/404-ncd-national-action-plan-for-prevention-and-control-of-non-communicable-diseases-and-the-related-risk-factors-in-the-islamic-republic-of-iran,-2015-2025>
3. Peykari N, Hashemi H, Dinarvand R, Haji-Aghajani M, Malekzadeh R, Sadrolsadat A, et al. National action plan for non-communicable diseases prevention and control in Iran; a response to emerging epidemic. *J Diabetes Metab Disord* 2017;16:3.

4. Department of Health in England. Traffic-light food labeling [Internet]. 2015 Jan [cited 2015 Jan]. Available from: http://www.fph.org.uk/uploads/ps_food_labelling.pdf
5. Department of Health in England. Guide to creating a front of pack (FOP) nutrition label for pre-packed products sold through retail outlets. [Internet]. 2014 Jan [cited 2014 Jan]. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566251/FOP_Nutrition_Labelling_UK_guidance.pdf
6. Volkova E, Neal B, Rayner M, Swinburn B, Eyles H, Jian Y, et al. Effects of interpretive front-of-pack nutrition labels on food purchases: protocol for the Starlight randomized controlled trial. *BMC Public Health* 2014;14:968.
7. Mhurchu CN, Eyles H, Jiang Y, Blakely T. Do nutrition labels influence healthier food choices? Analysis of label viewing behavior and subsequent food purchases in a labelling intervention trial. *Appetite* 2018;121:360-5.
8. Borgmeier I, Westenhoefer J. Impact of different food label formats on healthiness evaluation and food choice of consumers: a randomized-controlled study. *BMC Public Health* 2009;9:184.
9. Scott-Thomas C. Italy says UK traffic light labeling could harm traditional foods. [Internet]. 2013 Dec [cited 2013 Dec]. Available from: <http://www.foodnavigator.com/Policy/Italy-says-UK-traffic-light-labelling-could-harm-traditional-foods>
10. Beard TC, Nowson CA, Riley MD. Traffic-light food labels. *Med J Aust* 2007;186:19.
11. Chen HJ, Weng SH, Cheng YY, Lord AYZ, Lin HH, Pan WH. The application of traffic-light food labelling in a work suite canteen intervention in Taiwan. *Public Health* 2017;150:17-25.
12. Sonnenberg L, Gelsomin E, Levy DE, Riis J, Barraclough S, Thorndike AN. A traffic light food labeling intervention increases consumer awareness of health and healthy choices at the point-of-purchase. *Prev Med* 2013;57(4):253-7.
13. Lundeberg PJ, Graham DJ, Mohr GS. Comparison of two front-of-package nutrition labeling schemes, and their explanation, on consumers' perception of product healthfulness and food choice. *Appetite* 2018;125:548-56.
14. Gorski Findling MT, Werth PM, Musicus AA, Bragg MA, Graham DJ, Elbel B, et al. Comparing five front-of-pack nutrition labels' influence on consumers' perceptions and purchase intentions. *Prev Med* 2018;106:114-121.
15. Lima M, Ares G, Deliza R. How do front of pack nutrition labels affect healthfulness perception of foods targeted at children? Insights from Brazilian children and parents. *Food Qual Prefer* 2018;64:111-9.
16. Iran Food and Drug Administration. Act for Traffic Light on Food Labelling with no. 688/479/D. [Internet]. 2016 June [cited 2016 June]. Available from: www.fda.gov.ir/item/2471
17. Ministry of Health and Medical Education Center for disease Control. A National Profile of Non-Communicable Disease Risk Factor in Iran. [Internet]. 2009 Dec [cited 2009 Dec]. Available from: <http://www.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.jsp?id=53>

Influence of education on knowledge, attitude and practices of students of Isfahan University of Medical Sciences to traffic light inserted on food labeling

Zahra Esfandiari Ph.D.^{1,2*}
 Mohammad Reza Marasi Ph.D.³
 Fatemeh Estaki M.Sc.¹
 Vahid Sanati M.Sc.¹
 Elnaz Panahi M.Sc.¹
 Nader Akbari M.Sc.¹
 Roya Alsadat Madani Ph.D.¹
 Jila Mosberian Tanha M.Sc.⁴

1- Department of Food Science and Technology, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 2- Department of Research and Development, Vice Chancellery for Food and Drug, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 3- Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
 4- MD Anderson Cancer Research Center, University of Texas, Houston, Texas, United States.

Abstract

Received: 11 Oct. 2018 Revised: 18 Oct. 2018 Accepted: 09 Apr. 2019 Available online: 19 Apr. 2019

Background: Nutrition education and introduction of procedures for choosing healthier food have an important role to reduce the rate of non-communicable diseases. It was shown the amount of risk factors of non-communicable diseases such as energy, salt, sugar, fat and trans fatty acid on the traffic light of food labelling. The status of risk is presented through three colors of red, yellow and green that are the signs of risk, cautious and safe use of food. The object of this study was to evaluate the influence of education on the knowledge, attitude and practices of Isfahan University of Medical Sciences students to the traffic light on food labeling.

Methods: This project was an empirical study performed by random sampling of 379 students of nine schools in Isfahan University of Medical Sciences from January 2017 to March 2018. The knowledge, attitude and practices of students toward the traffic light were assessed by self-administered and structured questionnaire. Education was performed face to face with the usage of pamphlet. In the period of three to six months, questionnaires were refilled out by students to determine knowledge, attitude and practice. Descriptive statistics were calculated using SPSS in mean \pm SD. Paired t-test was performed to assess the influence of education in total score of knowledge, attitudes and practices in test-retest. P value was considered less than 0.05 as statistically significant.

Results: Before education, the average of scores for knowledge, attitude and practice was 1.12 ± 0.84 , 14.44 ± 4 and 2.25 ± 2.2 , respectively. Afterwards, the scores were increased to 11.72 ± 0.75 , 18.67 ± 3.18 and 17.69 ± 4.7 after education. Significant difference was observed in the scores of knowledge, attitude and practice of students before and after education ($P<0.05$).

Conclusion: Education of traffic light had a significant role in the improvement of knowledge, attitude and to some extent of practice of students in selection of healthier food.

Keywords: attitude, education, food labeling, Iran, knowledge, practice, students, traffic light.

* Corresponding author: Chancellery for Food and Drug, Isfahan University of Medical Sciences, 36th Khalij-e-Fars St., Isfahan-Shiraz Road, Isfahan, Iran.
 Tel: +98 31 36547950
 E-mail: research_esfandiary@mui.ac.ir