

بررسی ارتباط سطح منیزیم و عوارض ایکتر در نوزادان

چکیده

دریافت: ۱۳۹۹/۱/۱۴ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ پذیرش: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ آنلاین: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

زمینه و هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح منیزیم سرمی و شدت ایکتر انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی نوزادانی که در بازه زمانی دو ساله، مهر ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران بهدلیل زردی نوزادی بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نوزادان با بیلی رویین ۱۶-۲۰ mg/dl در دسته‌ی هایپربیلی رویینی متوسط و بیشتر یا مساوی dl ۲۰ در دسته‌ی هایپربیلی رویینی شدید تقسیم شدند. مقدار منیزیم سرمی و عوارض کلینیکی هایپربیلی رویینی در این نوزادان ثبت شد.

یافته‌ها: تعداد ۱۰۰ بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین سطح سرمی منیزیم در این بیماران dl ۲/۳۲ بود. این مقدار در نوزادان دچار تشنج (P=۰/۰۳۸)، تب (P=۰/۰۴۸) و انسفالوپاتی مزمن (P=۰/۰۰۳) به صورت معناداری بیشتر بود. میانگین سطح سرمی منیزیم به صورت چشمگیری در هایپربیلی رویینی شدید بیشتر از متوسط بود (P<۰/۰۰۱). منیزیم سرم در عوارض انسفالوپاتی مزمن (P=۰/۰۰۷)، فیستیگ (P=۰/۰۰۱)، رتروکولی (P=۰/۰۰۱)، هایپرتونی (P=۰/۰۰۴)، هایپوتونی (P=۰/۰۰۱) و تشنج (P=۰/۰۳۰) به صورت چشمگیری متفاوت بود. سطح سرمی منیزیم با بیلی رویین توتال همبستگی مشبی داشت (r=۰/۴۴۳، P>۰/۰۰۱) و با احتمال وقوع انسفالوپاتی مزمن ارتباط داشت (OR: ۴/۱۵، P=۰/۰۴۰) و منیزیم بالای ۲/۱۵ می‌تواند با حساسیت ۱۰۰٪، ویژگی ۴۷/۸٪، ارزش اخباری منفی ۱۰۰٪ و ارزش اخباری مشبی ۱۴/۳٪ پیش‌بینی کننده‌ی انسفالوپاتی مزمن باشد.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که سطح سرمی منیزیم به صورت معناداری با سطح سرمی بیلی رویین توتال سرم و شدت هایپربیلی رویینی مرتبط است و می‌تواند احتمال وقوع انسفالوپاتی مزمن را پیش‌بینی کند.

کلمات کلی: بیلی رویین، هایپربیلی رویینی، منیزیم، زردی نوزادی.

راضیه سنگسری^۱، مریم سعیدی^{*}،
ملیحه کدیور^۱، مهسا نیکنام^۲

^۱- گروه نوزادان، مرکز طبی کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

^۲- گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: تهران، خیابان دکتر قربیب، مرکز طبی کودکان، گروه نوزادان.

تلفن: ۰۲۱-۶۱۴۷۷۸۰
E-mail: m_saidi52@yahoo.com

مقدمه

حاضر مؤثرترین و معمول‌ترین روش درمان زردی نوزادان، فتوترایپ می‌باشد و در موارد مقاوم، بروز کریکتروس یا بالاتر رفتن میزان بیلی رویین از سطح خطر، تعویض خون اقدام اصلی همراه با فتوترایپ می‌باشد.^۱ هایپربیلی رویینی با بیلی رویین بالای mg/dl ۲۵ با افزایش خطر اختلال عملکرد نوروولژیک ناشی از رسوب بیلی رویین همراه است. این اختلال زمانی رخ می‌دهد که بیلی رویین از سد خونی مغزی می‌گذرد و به بافت مغز می‌رسد.^۲ انسفالوپاتی، کرن ایکتروس و

زردی نوزادی یکی از شایعترین موارد ارجاع و بستری در طب نوزادان می‌باشد که معمولاً خوش‌حیم است و در هفته اول پس از تولد در ۶۰٪ نوزادان رسیده و ۸۰٪ نوزادان نارس دیده می‌شود.^۳ در حدود ۱۱-۸٪ موارد، سطح بیلی رویین به بالای ۹۵٪ صدک خود پیشرفت می‌کند و نیاز به بررسی و درمان پیدا می‌شود.^۳ در حال

متاپولیک، ۵- نوزادان مبتلا به سپسیس، ۶- نوزادان با اختلالات الکترولیتی، ۷- سابقه تشنج در نوزاد و ۸- نوزاد مادرانی که منزیم سولفات دریافت کرده بودند. در طی بستردی و پیگیری بعدی عوارض کلینیکی و پاراکلینیکی هایپریلی رویینی ارزیابی گردید. میزان هایپریلی رویینی و اندیکاسیون فتوترپی براساس نمودار فتوترپی کتاب نلسون و آکادمی آمریکا مشخص شد.^{۱۰}

هایپریلی رویینی با بیلی رویین بین ۱۶ تا ۲۰ در دسته متوسط (Moderate) و بیلی رویین بیشتر مساوی ۲۰ هایپریلی رویینی در دسته شدید (Severe) تقسیم شدند. عوارض کلینیکی شامل تب، تشنج، آپنه، برادیکاردی ناشی از هایپریلی رویینی و اختلال در معاینات عصبی از جمله اختلال در عضلات بلع (Mal-coordination, Fisting, هایپرتونی، هایپوتونی، کاهش سطح هوشیاری، Spasticity که پیش از زردی در نوزاد وجود نداشته مثبت در نظر گرفته شد. تب و تشنج و آپنه و سایر علایم عصبی علت خاصی به جز هایپریلی رویینی نداشته است. از کلیه نوزادان با علایم حاد انسفالوپاتی و نوزادان با هایپریلی رویینی در حد تعویض خون، براساس نوموگرام بررسی تست شنوایی Auditory brainstem response (ABR) انجام شد و در صورت درگیری، سه ماه بعد مجدد جهت تشخیص موارد درگیری پایدار انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات مربوط به این مطالعه از والدین بیماران، پرونده بیماران، یادداشت‌های مربوط به دستورات پزشک و سیر بیماری و گزارشات پرستاری و آزمایش‌های موجود در پروندها بیماران استفاده شد. معاینه‌ی بالینی به صورت کامل برای هر نوزاد از نظر بروز عوارض توسط فوق تخصص نوزادان انجام می‌شد. کلیه اطلاعات در چک لیستی که براساس فرضیه طرح آماده شده وارد گردید.

پس از پایان گردآوری داده‌ها، اطلاعات پس از دسته‌بندی با استفاده از نرمافزار SPSS software, version 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) مورد بررسی قرار گرفت. برای نمایش داده‌های کمی مانند سن از میانگین و انحراف استاندارد، نما و میانه استفاده شد و داده‌های کیفی اسمی مانند جنس و سطوح انواع متغیرها به صورت فراوانی مطلق و درصد فراوانی گزارش شدند. مقایسه درصد تغییرات فاکتورهای مختلف (سطح بیلی رویین و منزیم) با استفاده از آزمون‌های آماری Chi-square test, Student's t test و Fisher's

فلج مغزی کره آنتویید از عوارض رسوب مزمن بیلی رویین در نورون‌های هسته‌های قاعده‌ای مغز است.^۵ آسیب بیلی رویین باعث تخریب آنزیم‌ها و گیرنده‌های عصبی خواهد بود که یکی از مهمترین آن‌ها، گیرنده‌ی NMDA (NMDA Methyl D Aspartate) است.^۶ نتیجه فعالیت بیش از حد رسپتورهای NMDA نورومنی، افزایش کلسیم سیتوزولیک و تولید رادیکال‌های آزاد است که موجب نکروز نورومنی، آپوپتوزیس یا هر دو یا مشابه آسیب هیپوکسی ایسکمیک می‌گردد.^۶ تحریک طولانی مدت گیرنده NMDA در آسیب عصبی ناشی از آسفیکسی پری‌ناتال که شامل اختلال رشد عصبی و اختلال تکامل یادگیری خاطره بینایی است هم دیده می‌شود.^۷ بلوك رسپتور NMDA می‌تواند در جلوگیری از آسیب نورومنی با واسطه بیلی رویین موثر باشد.^۶

منزیم از کاتیون‌های مهم سلولی بوده و یکی از مهمترین تنظیم‌کننده‌های آنتاگونیستی کمپلکس مولکول بیلی رویین/کانال یونی/گیرنده NMDA در انسان است و بسیاری از آثار فیزیولوژی منزیم با اثر نوروتوکسیک بیلی رویین در تضاد است.^{۸,۹} هرچند اثر محافظت‌کننده عصبی منزیم در پاتوفیزیولوژی انسفالوپاتی هیپوکسی ایسکمی نشان داده شده است ولی هنوز ارتباط منزیم و هایپریلی رویینی نوزادی به طور کامل بررسی نشده است.^۹ مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی منزیم با شدت هایپریلی رویینی و عوارض آن انجام شد.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی و آینده‌نگر، نوزادانی که پس از تولد دچار زردی شده و جهت درمان زردی در بازه‌ی زمانی سال‌های مهر ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. معیار ورود شامل نوزادان ترم کمتر از چهار هفته که در بخش مراقبت بستری شده بودند و بیماری دیگری کودکان تهران، فقط به علت ایکتر بستری شده بودند و بیماری نداشتند، بود. معیارهای خروج از مطالعه شامل موارد زیر بود ۱- نوزادان با بیلی رویین مستقیم بیش از ۲۰٪ میزان بیلی رویین توتال، ۲- نوزادانی که آسفیکسی با آپگار کمتر از شش در بدو تولد داشتند، ۳- نوزادان با ناهنجاری‌های مادرزادی، ۴- نوزادان با اختلالات

($P=0.030$) به صورت معناداری متفاوت بود که در موارد رتروکولی و هایپوتونی سطح منیزیوم کاهش یافته و سایر موارد افزایش یافته بود. در نوزادانی که نیاز به تعویض خون داشتند، میانگین سرمی منیزیم تفاوت معناداری با بروز آپنه ($P=0.0756$), تشنج ($P=0.163$) و اختلال در ABR سه ماهگی ($P=0.0222$) نشان نداد اما در نوزادانی که نیاز به تعویض خون داشتند، میانگین سرمی منیزیم در افرادی که دچار انسفالوپاتی مزمن شدند به صورت معناداری بیشتر بود ($P=0.001$). نتایج آزمون پیرسون نشان داد که سطح سرمی منیزیم با سطح سرمی بیلی روینی توtal همبستگی مثبتی دارد، یعنی با افزایش میزان سطح سرمی منیزیم، سطح بیلی روینی توtal نیز افزایش می‌یابد ($r=0.443$, $P<0.001$). این همبستگی هم در هایپریلی روینی شدید ($P=0.0228$), و هم در هایپریلی روینی متوسط شدید ($P=0.001$) و هم در هایپریلی روینی متوسط

exact test انجام گرفت. برای مقایسه داده‌های بیشتر از دو گروه از Anova test استفاده شد. $P<0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

در مجموع تعداد ۱۰۰ بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند (جدول ۱). کلیه نوزادان بستری شده در نهایت با بهبود ترخیص شدند و موردنی از مرگ و میر گزارش نشد. ۲۰ نفر از افراد مورد مطالعه دچار هایپریلی روینی متوسط و ۸۰ نفر دچار هایپریلی روینی شدید بودند (جدول ۲). میانگین سطح سرمی منیزیم در $32\pm32/2 \text{ mg/dl}$ به دست آمد. این میزان در نوزادان دچار تشنج ($P=0.038$), تب ($P=0.048$) و عالیم انسفالوپاتی مزمن ($P=0.003$) به صورت معناداری بیشتر بود. میانگین سطح سرمی منیزیم با بروز آپنه ($P=0.022$) وجود اختلال در ABR سه ماهگی ($P=0.022$) رابطه معناداری نشان نداد. میانگین و انحراف معیار سطح سرمی منیزیم در نوزادان با هایپریلی روینی شدید ($P=0.046$) و در نوزادان با هایپریلی روینی متوسط ($P=0.025$) بود که میزان آن به صورت معناداری در هایپریلی روینی شدید بیشتر از نوع متوسط بود ($P=0.001$). میانگین سرمی منیزیم در عوارض انسفالوپاتی مزمن ($P=0.007$), فیستینگ ($P=0.01$), رتروکولی ($P=0.004$), هایپرتونی ($P=0.001$) و تشنج ($P=0.001$)

جدول ۱: اطلاعات دموگرافیک نوزادان مورد مطالعه

P^*	متغیر
	جنسيت (درصد)
دختر (۴۴٪)	پسر (۵۶٪)
سن زایمان (روز)	طبعی (۴۳٪)
سازارین (۵۷٪)	۷۲/۵
میانگین سن حاملگی (هفتة)	۰۴/۳۸
میانگین وزن تولد (g)	۲۰/۳۹۱

جدول ۲: اطلاعات دموگرافیک در دو گروه نوزادان دچار هایپریلی روینی شدید و متوسط مورد مطالعه

P^*	میانگین هایپریلی روینی شدید (نفر ۸۰)	میانگین هایپریلی روینی متوسط (نفر ۲۰)	متغیر
۰/۰۳۸	پسر (۷۶٪) دختر (۲۵٪)	پسر (۴۰٪) دختر (۶۰٪)	جنسيت
۰/۰۸۷	طبعی (۴۰٪) سازارین (۶۰٪)	طبعی (۶۰٪) سازارین (۴۰٪)	نوع زایمان
۱۰/۰	میانگین سن (روز) میانگین سن حاملگی (هفتة)	۸۰/۵	
۱۱۹/۰	۲۵/۳۷	۵۰/۴۰/۳۸	میانگین وزن تولد (g)
۰/۰۰۲	۶۱/۰±۴۵۹/۳۰۲۹	۸۸/۳۵۹±۰/۳۳۴۰	درمان دریافتی (درصد)
۰/۰۰۱	فتوترابی (۴۰٪) تعویض خون (۶۰٪)	فتوترابی (۱۰۰٪) تعویض خون (۰٪)	میانگین طول فتوترابی (روز)
۰/۰۰۳	۵	۳	آزمون آماری: *Student's t test. $P<0.05$ معنادار در نظر گرفته شد.

جدول ۳: اطلاعات آزمایشگاهی در دو گروه نوزادان دچار هایپریلی روینی شدید و متوسط مورد مطالعه

P*	بیلی روینی شدید هایپریلی روینی متوجه (میانگین ± انحراف معیار) (نفر) (۸۰ نفر)	بیلی روینی متوجه هایپریلی روینی متوجه (میانگین ± انحراف معیار) (نفر) (۲۰ نفر)	متغیر
۰/۰۰۱	۸۳/۲±۳۱/۲۳	۰۰/۱±۱۴/۱۸	بیلی روینی توتال (mg/dl)
۰/۰۱۰	۶۹/۶±۵۷/۲	۱۳/۰±۵۸/۰	بیلی روینی مستقیم (mg/dl)
۰/۰۰۹	۹۳/۱±۳۴/۲	۰۱/۱±۴۲/۱	سطح رتیک (درصد)
۰/۴۹۷	۱۸/۶±۲/۱۷	۰۰/۸±۱۰/۱۶	سطح گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز
۰/۷۳۹	۴۲/۱۲±۲۷/۱۶	۶۴/۱±۴۴/۱۶	هموگلوبین اولیه (mg/dl)
۰/۰۰۱	۲/۳۹±۰/۴۶	۲/۰۷±۰/۲۵	سطح سرمی منیزیم

* آزمون آماری: Student's t test P<0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

جدول ۴: میانگین سرمی منیزیم در گروه دچار هایپریلی روینی شدید در نوزادان مورد مطالعه بر حسب بروز عوارض

رجستیک Binary نشان داد که سطح منیزیم در بیماران مبتلا به زردی می‌تواند با احتمال وقوع انسفالوپاتی مزمن ارتباط داشته باشد (P=0/۰۴، OR: ۱۵/۴). نتایج نشان داد که منیزیم بالای ۱۵/۲ می‌تواند با حساسیت ۱۰۰٪، ویژگی ۸۲/۴٪، ارزش اخباری منفی ۱۰۰٪ و ارزش اخباری مثبت ۲۸/۱۴٪ پیش‌بینی کننده انسفالوپاتی مزمن باشد.

بحث

در مطالعهی حاضر که در نوزادان با درجات متوسط و شدید هایپریلی روینی انجام شد، یافته‌های مطالعه حاضر نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین سطح سرمی منیزیم و سطح سرمی بیلی روین توتال سرمی بود که در واقع بیانگر ارتباط سطح سرمی منیزیم با شدت هایپریلی روینی می‌باشد. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح سرمی منیزیم در گروه دچار هایپریلی روینی شدید در مقایسه با گروه دچار هایپریلی روینی متوسط به صورت معناداری بیشتر بود. این نتایج می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این موضوع باشد که افزایش سطح پلاسمایی منیزیم ممکن است ناشی از حرکت خارج سلولی منیزیم داخل سلولی در نتیجه آسیب سلولی نورون‌ها و اریتروسیت‌ها باشد. در واقع، مسمومیت با بیلی روین پس از افزایش سطح سرمی بیلی روین به سطح توکسیک، تنها محدود به نورون‌ها نمی‌باشد بلکه منجر به آسیب سلولی جنزال می‌گردد.^{۱۱}

نام	عوارض	میانگین سرمی منیزیم	P	انحراف معیار
تب	دارد	۲۰/۲	۰/۵۱۹	۰/۴۲
تشنج	ندارد	۳۱/۲		۰/۴۳
هایپوتونی	دارد	۶۷/۲	۰/۰۳۰	۰/۶۳
هایپرتونی	دارد	۳۱/۲		۰/۴۳
اختلال بلع	دارد	۲۰/۲	۰/۰۰۱	۰/۳۰
آپنه	ندارد	۶۰/۲		۰/۳۶
رتروکولی	دارد	۶۳/۲	۰/۰۰۴	۰/۳۵
فیستیک	ندارد	۲۴/۲		۰/۳۱
پس از انسفالوپاتی	دارد	۳۰/۲	۰/۶۱۲	۰/۲۲
مزمن	ندارد	۳۵/۲		۰/۴۱
اختلال ABR حداد	دارد	۲۴/۲	۰/۰۰۱	۰/۰۲۹
اختلال ABR سه ماه	دارد	۱۰/۳		۰/۰۰۱
اختلال ABR حداد	ندارد	۲۴/۲	۰/۰۰۱	۰/۰۳۲
اختلال ABR سه ماه	دارد	۵۸/۲		۰/۰۳۲
اختلال ABR حداد	دارد	۱۰/۳	۰/۰۰۱	۰/۰۰۰
اختلال ABR سه ماه	ندارد	۲۴/۲		۰/۰۳۱
اختلال ABR حداد	دارد	۶۵/۲	۰/۰۰۷	۰/۰۴۸
اختلال ABR سه ماه	دارد	۴۵/۲		۰/۰۵۴
ندارد	۲۴/۲		۰/۰۳۱	۰/۰۳۱
مختل	۶۳/۲		۰/۰۲۲	۰/۰۳۸
سالم	۴۵/۲			۰/۰۵۴

* آزمون آماری: Student's t test P<0/05 معنادار در نظر گرفته شد.

سطح منیزیم هم بالا رفت. در مورد ارتباط منیزیم با عوارض مربوط به هایپریلی روینمی می توان گفت منیزیم به صورت محافظتی در زمان رخداد عوارض جدی از جمله هایپرتونی، تشنج، انسفالوپاتی بالا می رود که می توان علت این تغییر را جلوگیری از ایجاد عوارض جدی برای بدن توضیح داد. مطالعه حاضر دارای محدودیت هایی بود. در این مطالعه، ترخیص بیماران در برخی موارد با رضایت شخصی بوده است و امکان پیگیری بیماران وجود نداشت. همچنین عدم همکاری برخی والدین بیماران برای انجام ABR باعث شد تعدادی از داده ها اطلاعات ناقصی داشته باشند. از طرفی مطالعه کنونی مقطعی بود و نمی توانست به صورت کامل ارتباطات علت و معلولی ارزیابی نماید. از این رو انجام مطالعات آینده نگر یا کوهروت می تواند به بررسی دقیق تر این ارتباط پردازد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطح سرمی منیزیم به صورت معناداری با سطح سرمی بیلی روینمی توتال سرم و همچنین شدت هایپریلی روینمی مرتبط است. نقطه برش منیزیم بالای $15/2 \text{ mg/dl}$ توانست پیش بینی کننده شدت هایپریلی روینمی با حساسیت بالایی باشد.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل پایان نامه تحت عنوان "بررسی سطح منیزیم بر عوارض ایکتر در نوزادان بستری در مرکز طبی کودکان" طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۶ در مقطع دکترای تخصصی در سال ۱۳۹۸ و با کد ۹۴۱۱۱۶۵۰۳۹ می باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.

در مطالعه Sarici و همکاران نیز مانند مطالعه کنونی ارتباط مثبتی بین سطح سرمی منیزیم و شدت هایپریلی روینمی مشاهده شد و ارتباط مستقیمی بین سطح سرمی منیزیم و سطح سرمی بیلی روینمی توتال گزارش گردید.^{۱۲} همچنین نشان دادند که در گروه دچار هایپریلی روینمی متوسط و شدید، ارتباط مستقیم و معناداری بین سطح سرمی منیزیم و توتال بیلی روینمی سرم وجود دارد. در مطالعه Imani و همکارانش نیز مشخص گردید در بیماران با هایپریلی روینمی، سطح منیزیم تام سرم با افزایش سطح بیلی روینمی سرم افزایش یافته و با شدت هایپریلی روینمی مرتبط است.^۸ اما در مطالعه Karambin و همکاران ارتباط بین شدت هایپریلی روینمی و هایپرمنیزیمی به دست نیامد و حتی با هایپریلی روینمی متوسط نیز افزایش میزان منیزیم پلاسمای بروز کرد.^{۱۳} در مطالعه دیگری مشاهده شد که میزان آهن، منیزیم و منگنز در نوزادان مبتلا به زردی در مقایسه با افراد سالم به طور معناداری بیشتر است.^{۱۴} در مطالعه Hasan و همکاران نشان داده شد که سطح سرمی منیزیم در نوزادان دچار زردی به طور چشمگیری نسبت به گروه کنترل بدون زردی بالا می رود که به خروج آن از داخل سلول در اثر همولیز ربط داده شده است.^{۱۴} مطالعه کنونی دارای حجم نمونه مناسب تری نسبت به سایر مطالعات پیشین انجام شده در این زمینه بود. در این نتایج به گونه ای که مشاهده شد، در ابتدا ارتباط معناداری بین سطح منیزیم سرم و میزان بیلی روینمی سرم وجود داشت و در واقع با افزایش بیلی روینمی،

References

- Habibi M, Mahyar A, Ayazi P, Ahmadabadi F, Javadi A. The effect of clofibrate on hyperbilirubinemia of term neonates. *Acta Med Iran* 2012;21:5.
- Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. The effect of traditional remedies (Camel's Thorn, Flixweed and Sugar Water) on idiopathic neonatal jaundice. *Iran J Pediatr* 2011;21(3):325.
- Bhutani VK. For a safer outcome with newborn jaundice. *Indian pediatrics* 2004;41(4):321.
- Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S, Rezagholizadeh F. Clinical course and prognosis of hemolytic jaundice in neonates in North East of Iran. *Maced J Med Sci* 2011;4(4):403-7.
- Wong V, Chen W-X, Wong K-Y. Short-and long-term outcome of severe neonatal nonhemolytic hyperbilirubinemia. *J Child Neurol* 2006;21(4):309-15.
- Volpe JJ. Neurology of the Newborn E-Book: Elsevier Health Sciences; 2008.
- Abbey P, Kandasamy D, Naranje P. Neonatal Jaundice. *Indian journal of pediatrics* 2019;1-12.
- Imani M, Rezaee-pour M, Mohamdi M, Shiri M, Noroozifar M, Mahmodi N. Study of relationship between total Magnesium and total bilirubin levels in neonates' sera before and after phototherapy. *Razi Journal of Medical Sciences* 2012;19(100).
- Khosravi N, Aminian A, Taghipour R. Total serum magnesium level in icteric neonates before and after phototherapy. *Tehran Univ Med J* 2011;69(7).
- Affify M, Mohsen A, Allam E, Abdelkarem H. Role of magnesium ion in neonatal jaundice. *Life Sci J* 2012;9(3):2276-7.
- Abdelmoez AT, Zaky DZ, Maher AM. Role of cerebrospinal fluid IL-8 as a marker for differentiation between acute bacterial and aseptic meningitis. *J Egypt Soc Parasitol* 2014; 44(1):205-10.
- Sarici SÜ, Serdar MA, Korkmaz A, Erdem G, Oran O, Tekinalp G, et al. Incidence, course, and prediction of hyperbilirubinemia in near-term and term newborns. *Pediatrics* 2004;113(4):775-80.
- Karambin M, Heidarzadeh A, Norouzi H. Total Serum Magnesium Level in Icteric Neonates before and after Phototherapy in Patients Admitted to 17 Shahrivar Hospital, Rasht, 2012-2013. *J Guilan Univ Med Sci* 2015;24(95):16-23.
- Hasan E. Evaluation of Copper, Zinc, Manganese, and Magnesium Levels in Newborn Jaundice in Baghdad. *Ibn AL-Haitham Journal For Pure and Applied Science* 2017;24(3).

The relationship between magnesium levels and complications of jaundice in infants

Abstract

Received: 02 Apr. 2020 Revised: 09 Apr. 2020 Accepted: 13 Aug. 2020 Available online: 20 Aug. 2020

Razieh Sangsari M.D.¹
Maryam Saeedi M.D.^{1*}
Malihe Kadivar M.D.¹
Mahsa Niknam M.D.²

1- Department of Neonatology,
Children's Hospital Medical
Center, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of Pediatrics, School
of Medicine, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.

Background: The effects of magnesium physiology are contradictory to the neurotoxic effect of bilirubin, but the relationship between magnesium level and hyperbilirubinemia in neonates has not been well studied. In this study, we investigated the relationship between serum magnesium level and hyperbilirubinemia and hyperbilirubinemia complications at the Children's Medical Center.

Methods: In this cross-sectional and prospective study, 100 neonates who were admitted to the Children's Medical Center from October 2018 to 2019 due to neonatal jaundice were enrolled. Neonates were divided into two groups: serum bilirubin levels 16-20 mg/dl were included in the moderate hyperbilirubinemia group and bilirubin >20 mg/dl into severe hyperbilirubinemia group. Serum magnesium levels and clinical complications of hyperbilirubinemia including fever, seizure, apnea, bradycardia, and abnormal neurological examinations were recorded in these infants.

Results: In this study, 100 neonates were evaluated. The mean serum magnesium level in these patients was 2.32 mg/dl. This rate was significantly higher in neonates with seizure ($P=0.038$), hyperbilirubinemia fever ($P=0.048$), and neonates with chronic encephalopathy ($P=0.003$). The mean serum magnesium level was significantly higher in severe hyperbilirubinemia ($P<0.001$). Serum Magnesium in complications of chronic encephalopathy ($P=0.007$), Fisting ($P=0.001$), retrocoli ($P=0.001$), hypertonia ($P=0.004$), hypotonia ($P=0.001$) and seizures ($P=0.030$) were significantly different. The serum magnesium levels were positively correlated with total bilirubin ($r=0.443$, $P<0.001$). The magnesium levels correlated with the chronic encephalopathy (OR: 4.15, $P=0.040$) and it was observed that magnesium levels above 2.15 could predict chronic encephalopathy with a sensitivity of 100%, the specificity of 47.82%, a negative predictive value of 100% and a positive predictive value of 14.28%.

Conclusion: The results of this study showed that serum magnesium levels significantly correlated with serum total bilirubin and magnesium cutting points above 2.15 mg/dl in patients with jaundice could predict chronic encephalopathy.

Keywords: bilirubin, hyperbilirubinemia, magnesium, neonatal jaundice.

*Corresponding author: Department of
Neonatology, Children's Medical Center,
Dr. Gharib St., Tehran, Iran.
Tel: +98-21-61472780
E-mail: m_saeidi52@yahoo.com