

تهییه توبرکولین گاوی در ایران

دکتر هادی هدایتی - دکتر مرتضی صدری - ابوالفضل نیک بین

دورسه هنلی، خوکجه هندی، توبرکولین گاوی استاندارد
انگلستان (۱ و ۲ و ۳ و ۴) .

مقدمه:

توبرکولین ماده پروتئینی است که در اثر رشد میکروب سل در محیط تولید می‌گردد.

برای اولین بار ربرت کخ آن بی برد و معتقد بازارت درمانی این ماده بود ولی امروزه برای تشخیص آلرژی سلی و نشان دادن تماس قبلی بدن با میکروب سل بکار می‌رود. در ایران تاکنون توبرکولین از سه سویه بین‌المللی انسانی T.B.-PN و T.B.-DT و T.B.-C تعیین حساسیت به میکروب سل در انسان و انجام برنامه مبارزه با سل گاوی بکار می‌رود. بنظر میرسد چنانچه توبرکولین از سویه گاوی تهییه گردد برای تشخیص سل گاوی و جستجوی اثر واکسن G.C.B در انسان و دام اختصاصی ترو حساس‌تر باشد. با توجه باین نظر کوشش بعمل آمد که با استفاده از سویه گاوی میکروب سل (سویه بین‌المللی T.B.-AN5) توبرکولین تهییه گردد و کار بردن آن در تشخیص سل گاوی در گاو و آلرژی سلی در انسان ارزش یابی گردد.

مقاله زیر خلاصه کوشش مزبور را عرضه میدارد:

مواد موردنیاز:

سویه گاوی سل، محیط استون برنیک، محیط لوانشتان جانسون مدیفیه، محیط سیب‌زمینی، محیط سنتیک مایع

روش کار:
ابتدا میکروب سل گاوی در محیط جامد مدیفیه لوانشتان جانسون و محیط اختصاصی Stonebrink (۱) با دو پاساژ بفاصله ۴۵ روز تکثیر گردیده سپس در محیط سیب زمینی دارای محیط Watson-Reid (۲) بمدت یکماه پرده گیری شده است. پرده حاصله در محیط سنتیک مایع دورسه هنلی شده است. پرده حاصله در محیط اختصاصی ترو حساس‌تر باشد. میکروب سل گاوی در آن پس از ۲/۵ ماه در اتو ۳۷ درجه قرار داده می‌رسد. در اثر اتولیز میکروب پروتئین سلی که آندوتوكسین میکری است بداخل محیط منتشر می‌گردد. پس از رشد کامل میکربها با حرارت دادن ظروف کشت بمدت سه ساعت در بخار ۹۶ درجه کشته و عصاره‌گیری می‌شوند سپس بكمک صافی‌های بوختر Buchner و سایتر Seitz اجرام میکری از محیط مجزا می‌شوند چون محیط اولیه فاقد پروتئین بوده است. "طبعیتاً" پروتئین‌های تولید شده در محیط به واسطه رشد میکروب سل ایجاد شده و کلاً پروتئین سلی می‌باشند. مایع صاف شده با اسید تریکلراستیک ۴۰ درصد به نسبت ۱ و ۹

کد:

۱ = $\frac{1}{100}$	توبرکولین گاوی استاندارد انگلستان
۲ = $1/500$	" "
۳ = $1/2500$	" "
۴ = $1/100$	گاوی رازی
۵ = $1/500$	" "
۶ = $1/2500$	" "

جدول تزریق:

چپ			راست				شماره خوکچه
۲	۳	۴	۱	۵	۶		۵۳/۶۸
۴	۶	۳	۵	۲	۱		۵۳/۶۹
۲	۵	۳	۶	۴	۱		۵۳/۷۲
۵	۱	۴	۳	۶	۲		۵۳/۷۴
۱	۲	۳	۴	۶	۵		۵۳/۷۶
۳	۵	۱	۲	۶	۴		۵۳/۷۷

نتیجه:

پس از ۲۴ ساعت قرمزی حاصله در اثر تزریق را بررسی و قطر طولی و عرضی آن اندازه‌گیری شده میانگین واکنش در جدول ۲ نشان داده میشود:

شماره خوکچه							
۱۴	۱۶/۵	۲۰	۲۰	۱۸	۱۴		۵۳/۶۸
۲۲	۱۲	۱۵	۲۰	۲۰	۲۴		۵۳/۶۹
۲۲	۲۰	۱۷	۱۸	۲۵	۲۶		۵۳/۷۲
۱۷	۲۵	۲۴	۱۵	۱۵	۱۷		۵۳/۷۴
۲۲/۵	۲۰	۱۸	۲۴	۱۶	۲۰		۵۳/۷۶
۱۹	۲۱	۲۵	۲۲	۱۵	۲۴		۵۳/۷۷

مجاور میگردد و مجموع یک شب در ۴ درجه قرار داده میشود. روز بعد مایع روئی خارج و رسوب تشکیل شده دوبار با اسید تریکلراستیک یک درصد و یکبار با نمک طعام ده درصد شسته هربار نیمساعت در سه‌هزار دور سانتریفیوژ و رسوب توبرکولین مجزا میگردد. رسوب حاصله در مایع زیر حل و به یک دهم حجم اولیه رسانده میشود:

سففات دی سدیک M ^{۱/۱۵}	ع سانتیمتر مکعب	"	M / ۳	"	"	"	"
"	۸/۸	"	۵۵	درصد	گلیسرین		
"	۲۰	"	۵		فنل		
"	۱۰	"	۵		نمک طعام		
"	۵	"	۱۰		آب قطر		
"	۱۰۰	"	تا				

مقدار پروتئین در محلول حاصل با دستگاه کجلدال اندازه‌گیری میشود.

برای کنترل سترونی توبرکولین تولید شده در محیط‌های عادی هوایی و بیهوایی و محیط تیوگلیکولات سدیم کشت داده میشود و تا دو هفته در اتو ۳۷ درجه نگهداری میشود. از نظر آزمایش بیضرری مقدار نیم سانتیمتر مکعب زیر جلدی و یک سانتیمتر مکعب داخل صفاقی به دو خوکچه تزریق میگردد که تا یکماه تحت کنترل و سالم بوده‌اند.

عيارسنجی بیولوژیکی:

۲۰ سر خوکچه هندی Albinos را انتخاب (۴) و با مخلوط (پودر کشنه میکرب سل گاوی و پودر سنگپا و روغن پارافین استریل) بخسas و دو ماه بعد که حساسیت بحد کافی رسید برای آزمایش بکار برده شده‌اند. ده سر ازین خوکچه‌ها را موجینی و شش سر از بهترین آنها انتخاب شده‌اند. توبرکولین رازی تهیه شده را با تامپون فینکه توئین دار به یک میلی‌گرم در میلی‌لیتر رسانده سپس $\frac{1}{100}$ و $\frac{1}{500}$ و $\frac{1}{2500}$ میلی‌لیتر رسانده شد. توبرکولین گاوی استاندارد که یک میلی‌گرم در میلی‌لیتر بود با همین تامپون بر قته‌ای فوق در آورده طبق کد و جدول زیر بهر خوکچه ۱/۰ سانتیمتر مکعب از راه بین جلدی در شش نقطه تزریق گردید:


جدول شماره ۳ مرتب شده جهت مقایسه با استاندارد و محاسبات آماری:

گاوی رازی			گاوی انگلستان			ماده بکار رفته
۶	۵	۴	۳	۲	۱	کد
۱/۲۵۰۰	۱/۵۰۰	۱/۱۰۰	۱/۲۵۰۰	۱/۵۰۰	۱/۱۰۰	رقت شماره خوکچه
۱۴	۱۸	۲۰	۱۴	۱۶/۵	۲۰	۵۳/۶۸
۱۷	۲۰	۲۳	۱۵	۲۰	۲۴	۵۳/۶۹
۱۸	۲۰	۲۵	۱۷	۲۲	۲۶	۵۳/۷۲
۱۵	۱۷	۲۴	۱۵	۱۷	۲۵	۵۳/۷۴
۱۶	۲۰	۲۴	۱۸	۲۰	۲۲/۵	۵۳/۷۶
۱۵	۲۱	۲۴	۱۹	۲۲	۲۵	۵۳/۷۷
۹۵	۱۱۶	۱۴۰	۹۸	۱۱۷/۵	۱۴۲/۵	جمع
۱۵/۸۳	۱۹/۲۲	۲۳/۲۲	۱۶/۳۳	۱۹/۵۸	۲۳/۷۵	میانگین
۳۵۱			۳۵۸			جمع واکنش

۱۱۸ Relatif potency

پس از انجام محاسبات آماری (۵) قدرت نسبی

منحنی مقایسه توبرکولین گاوی استاندارد و توبرکولین گاوی رازی



(توبرکولین رازی) از لحاظ قدرت معادل توبرکولین گاوی استاندارد بوده میتوان آنرا در انجام آزمایشات آرژی مورد استفاده قرار داد.

تشکر:

از آقای D.B.Lee رئیس دپارتمان تهیه توبرکولین در انگلستان بعلت در اختیار گذاشتن سوش گاوی و توبرکولین استاندارد و آقایان زالی، خدیوی و میرهاشمی بواسطه کمک‌های تکنیکی تشکر می‌گردد.

بحث:
با وجود شاباهت زیاد سویه‌های انسانی میکرب سل با سویه‌های سل گاوی این دوسویه میکربی از نظر بعضی از خواص بیوشیمیائی باهم متفاوتند و در حیوانات نیز بیماری‌زاییشان متفاوت می‌کند، به این جهت بنظر می‌آید که توبرکولین تهیه شده از سویه گاوی آلودگی حیوانات و انسان‌را با این میکرب بهتر نشان می‌دهد. برای بررسی دقیق این مطلب احتیاج به تهیه توبرکولین گاوی بود که طبق گزارش فوق عملی گردیده است. بطوریکه مقایسه دو منحنی بدست آمده و محاسبات آماری نشان می‌دهد توبرکولین گاوی تهیه شده در ایران

References

1. Lesslie, I.W. (1959) J. comp. Path. 69, 1-10
2. Watson E.A. Canad. Publ. hlth. J. 26, 268, 1935

-
- 3. Preparation of Weybridge bovine tuberculin central Veterinary Laboratory Weybridge England 1974
 - 4. Method of assay of tuberculin in guinea pigs
 - 5. Statiatical method in biological assay by D. J. Finney 301, 1971.