

# مجله دانشکده پزشکی تهران

شماره سوم آذر ماه ۱۳۴۸ سال بیست و هفتم

## درمان بیمار مسموم با پنجاه گرم نفتالین

بكمك دياريز صفاقى و کلية مصنوعى

دكتور عبدالصمد رفعت \* دكترسياوش سمندر \*\* دكتور حسني ميري \*\*\*

در پانزدهم تیرماه سال جاري بيماري مسموم با پنجاه گرم نفتالين بنام ی - ر در روز چهارم مسموميت همراه بايرقان شديد و آنوري و اورمي ۳ گرم و اختلالات الکتروليت به بخش کلية مصنوعى بيمارستان کمك رجوع کرد .

ظاهرآ در ساعت ۳ بعداز ظهر روز ۱۱/۴/۴۸ مقدار پنجاه گرم نفتالين بقصد انتخار خورده و مدت دو روز موضوع اين مسموميت را مكتوم داشته و در روز سوم بعلت ظهور بيرقان به پزشك مراجعه و علت مکشوف و پس از برقراری آنوري در روز چهارم یعنی در تاريخ ۱۵/۴/۴۸ در ساعت ۱۲ ظهر به بيمارستان کمك مراجعه و بفاصله دو ساعت یعنی در ساعت ۲ بعداز ظهر همان روز تحت درمان دياريز صفاقى قرار گرفت .

\* استاد بيماريهاي داخلی دانشکده پزشكی و رئيس بخش کلية مصنوعى بيمارستان کمك .

\*\* استاد بيار دانشکده پزشكی .

\*\*\* دستيار دانشکده پزشكی .

معایینات: بیماری است ۲۲ ساله بنامی . ر. با حالت عمومی خراب باتب درجه که پوست و مخاطش کاملاً زرد بوده و با یک حالت بی حالی در روی بستر افتاده است.

#### امتحانات دستگاهها:

دستگاه گردش خون - صداها در چهار کانون قلب طبیعی. فشار خون  $12/8$  نیض در درجه حرارت  $38.8$  - نیض  $11.0$  در دقیقه. الکتروکاردیوگرام T منفی و R بزرگ را نشان داد.

دستگاه تنفس: ریتین سالم - رادیوگرافی قلب و ریتین سالم بود.

دستگاه هاضمه: کبد قابل لمس و تاحدی حساس - اسهال شدید پر رنگ و استفراغ صفراء وجود است. پوست بیمار بعلت یرقان دارای زردی است. مخاط چشم و مخاط دهان زرد رنگ است.

دستگاه ادراری: آنوری کامل بود. مریض ما از روز ورود تا مدت ۱۸ روز حتی قطره‌ای ادرار نکرد ولی بعد از این تاریخ بكمك کلیه مصنوعی و دیالیز صفاقی ادرارش کم کم شروع شد و رو بافزایش گذارد.

امتحانات آزمایشگاهی: اوره  $30$  گرم - پتاسیم  $2$  میلی اکی وalan و سدیم  $176$  میلی اکی وalan و کلسیم  $90$  میلی گرم در لیتر و کلر  $140$  میلی اکی وalan در لیتر خون بود. آزمایش کومبز (Coombs) منفی، واندنبرگ غیر مستقیم مثبت، بیلی رو بین مستقیم  $3$  میلی گرم و بیلی رو بین غیر مستقیم  $55$  میلی گرم. مقاومت گلبو لی همولیز از آب نمک  $5$  درصد شروع و در  $1\%$  کامل شده است. ذخیره قلیائی  $21$  میلی اکی وalan در لیتر بود. گویچه قرم  $1000$  ر.  $2$  - گویچه سفید  $11800$  - اوزینوفیل  $2$ ، باتونه  $3$ ، سگمانته  $74$ ، لنفو سیت  $18$ ، مونوسیت  $3$  - هموگلوبین  $24$  گرم درصد - آنیزوسیتوز و هیپو کرومی موجود است. هماتو کریت  $17\%$  - زمان سیلان خون  $55$  و انعقاد آن  $5$  دقیقه بود. در بزل اکتشافی مغز استخوان تعداد رتیکولوسیت‌ها افزایش یافته و در امتحان خون بیمار، Corpuscle de Heinz یافتیم. قطعه قطعه شدن گویچه‌های

قرمز در امتحان خون محیطی جلب توجه میکرد.

در ساعت دو بعد از ظهر روز ۱۵ مرداد که بیمار را تحت درمان دیالیز صفاقی قرار دادیم وزنش ۸۰۰۰ گرم بود.

مدت ۷ روز دیالیز صفاقی را با موافقیت کامل ادامه داده و برای اینکار از محلول ایزوتونیک دیالیز صفاقی ۱۵ در هزار گلوله کز انتخاب نمودیم. با وجود اینکه اوره خون مريض پائين آمد ولی ادرار باز نشد. در روز هفتم دیالیز صفاقی با وجود احتیاطات لازمی که از لحاظ تزریق آنتی بیوتیک موضعی برای جلوگیری از عفونت مایع صفاقی انجام دادیم معهذا آزمایشگاه وجود چند لکوسیت را در مایع صفاق نشان داد.

برای جلوگیری از خطر چرکی شدن مایع صفاق اجباراً دیالیز صفاقی را قطع نموده و چون هنوز ادرار بیمار باز نشده بود روز بعد ناچاراً بیمار را مدت شش ساعت در زیر دستگاه کلیه مصنوعی (همودیالیز) قرار دادیم و مدت سه روز آنتی بیوتیک را با شدت هرچه بیشتر به بیمار تزریق نمودیم و در روز چهارم یعنی در روز یازدهم مراجعت بیمار به بخش چون عفونت صفاق روبرو باشد رفته بود مجدداً دیالیز صفاقی را برای بار دوم آغاز و ادامه دادیم. آنوری بهمان شدت با وجود ادامه دیالیز بر قرار بود. در روز هیجدهم مسمومیت، بیمار ابتدا ۱۵۰ سانتی متر مکعب ادرار غلیظ خارج کرده و روز بعد مقدار آن به ۵۰۰ سانتی متر مکعب وسیس بیک لیتر در روز افزایش یافت. چنین ادراری پنج گرم در لیتر اوره داشت و دارای آلبومین بوده و وزن مخصوص آن ۱۰۰۹ بود - Débit minute ششصد گویچه سفید در دقیقه و ۲۰۰ گویچه قرمز در دقیقه را نشان داد. با وجود اینکه ادرار باز شده بود و اوره خون تدریجاً پائین میآمد. وجود اجسام هینز (Heinz bodies) در پلاسمای خون دلیل آن بود که این آنمی هموگلوبین در اثر مسمومیت است.

چون مريض با وجود باز شدن ادرار و نزول اوره خون آنمیک بود مقدار سه شیشه خون ایزوگروپ تازه برایش تجویز نمودیم و خوشبختانه پس از ۱۸ روز آنوری و اختلالات الکترولیتیک و افزایش اوره خون حالت رو باصلاح رفته و با بهبودی کامل بیمارستان را ترک کرد.

توسط گوئتز (Goetze) و سپس تو سط مصنفین دیگر مانند ناش (Nash)، تیلور (Taylor) و روسل در سال ۱۹۴۹ شرح داده شد. بیشتر در نزد کودکان که اشتباهاً یک گلوله نفتالین میخورند و زمانی در نزد بالغین که مقدار زیاد نفتالین ویا ورمیفوژ نفتالین بخورند دیده میشود. بیمار ما از این لحاظ که پنجاه گرم پودر نفتالین خورده شاید در نوع خود بسابقه باشد.

اختلالات هاضمه - مانند تهوع - اسهال - استفراغ شایع است.

**اختلالات عصبی** - گاهی مریض تحریک شده، هذیان گفته، لرزش داشته و زمانی بیحال است.

اختلالات ادراری - شامل اشکال درادرار کردن و آنوری رهگذر است. ادرار تیره بوده حاوی آلبومین و خون است (مریض ما ۱۴ روز آنوری داشت و ادراری خارج نکرد تا رنگ آنرا به بینیم). اما پس از ۱۴ روز ادراری بسیار پرنگ شبیه برنگ چائی حاوی عناصر صفراء و آلبومین خارج نمود.

حالت عمومی مختلف است مریضی است رنگ پریده گاهی سیانوز داشته و گاهی تبدیل است (بیمار ما تبیش در ابتدا ۳۸ درجه و سپس میزان آن به ۳۹ و ۵ درجه رسید). کبد و طحال این بیماران معمولاً بزرگ است ویرقان در بعضی از موارد دیده میشود.

اختلالات خونی - که در مسمومیت با نفتالین شایع است. کم خونی سه تا دهت روز بعد از خوردن ماده سمی ظاهر میگردد. آنمی شدید با ۱۵ تا ۲۰ میلیون گویچه قرمز همراه با اسپرسیتوز (Spherocytose) ورتیکولوسیتوز شدید همراه با قطعه شدن گویچه قرمز و کاهش مقاومت گلبوالی دیده میشود. پلی کروماتوفیلی و تعداد زیادی نورموبلاست و ماکروبلاست وجود دارد آنمی محتملاً ماکروسیتر است. در اثر همولیز رنگ خون زرد مایل به قهوه‌ای میگردد و در اشکال شدید، همو گلبوالین اوری و ضایعات شدید لوله ادرار بوجود میآید.

ظهور اجسام هینز (Corps de Heinz) علامت مبداء سمی این آنمی همولیتیک است که در جریان آن آزمایش کو میز منفی است (مریض ماهر دارای جسم هینز در

خون بود و امتحان کو مبز آن نیز منفی بود) تعداد لوکوسیت‌ها گاهی تا ۳۰ هزار عدد می‌رسد. هموگلوبین اوری بسیار شایع است.

در مغز استخوان سلول‌های نارس (نورمو بلاست و رتیکولوسیت) وجود دارد. لوکوسیتوز و میلوسیت و میلو بلاست ممکن است پیدا شود. گاهی لوکوسیتوز به ۱۳۲۰۰۰ میرسد. از لحاظ عمومی تب نیز شایع می‌باشد.

تشخیص - تشخیص آن بعلت فقدان آثار (Absence des Commémoratifs) مشکل است. بوی نفتالین که از ادرار و مدفو ع خارج می‌شود علامتی است که باید جلب توجه کند (بدبختانه مریض ما در مدت ۱۸ روز حتی یک قطره ادرار نکرد که بوی آنرا تعیین کنیم) اما مدفو ع اسهالی آن دارای بوی نفتالین بود. گاهی پیدا کردن نفتل در ادرار به تشخیص کمک می‌کند ولی این علامت ثابتی نیست.

تشخیص علت آنمی همولیتیک بسیار مشکل است. اگر از مسموم شدن بیمار خبر نداشته باشیم در این صورت این نوع آنمی همولیتیک را اشتباه‌ابنام (La maladie de Lederer) و یا آنمی همولیتیک کریپتوژنتیک (Anémie hémolytique cryptogénétique) مینامیم.

فقدان مادرزادی گلوکز ۶ - فسفات دی هیدروژناز - phos (glucose - 6 phos dihydrogenase) سبب بروز اشکال شدید آنمی همولیتیک می‌گردد. فقدان عامل گلوکز ۶ - فسفات دی هیدروژناز در گویچه قرمز سبب حساسیت گویچه قرمز بموادی مانند نفتالین می‌گردد. [اجتماع فاویسم با گلوکز ۶ - فسفات دی - هیدروژناز] گویچه‌های حساس معمولاً از گویچه‌های پیتر بوجود آمده و اینها اجسام هینز را بوجود می‌آورند. تحقیق اجسام هینز برای شناسائی آنمی‌های همولیتیک که در اثر بعضی داروها بوجود آمده مفید است.

اجسام هینز (Heinz bodies) سازمانهای داخل کورپوسکولی - intra corpacular است که از اکسیداسیون هموگلوبین و بهم خوردگی شکل اصلی آن بعلت اکسیداسیون گروه تیول‌ها بوجود آمده است. در این عارضه بیلی رو بین کلی و غیر مستقیم زیاد می‌شود.

## مأخذ

- 1) Atuk, N.O. Mosca. A. and Kunin, c. Ann. Int. Med. 60. 28, 1964
- 2) Becker. C.G., Becker, E.L. Maher, J.F. and Schreiner. Arch. Int Med. 110: 178, 1962
- 3 ) Clinical Hematology. Maxwell. M . Wintrobe Philadelphia U.S.A. 623- 636 - 1968
- 4) Doyle, J.E. Extracorporeal Hemodialysis Therapy in Blood Chemistry Disorders Springfield III., 1962. Charles. c. Thomac.
- 5) Glaister. Medical Jurisprudence and Toxicology, 11 th ed. Edinburgh. 1962. E S. livingstone, Ltd.
- 6) Hoehn, D. Nephrosis probably du to excessive use of «Stay - Way» insect Repellent. J A.M.A 128: 513,1945
- 7) Johnstone, R.T. The insecticides: clinical aspect California Med: 84: 4. 1956
- 8) Kark, R.M., Pirani, C.L., Pollack, V.E., Muehreke, R.C. and Blahey T.D. Ann, Int. med., 48: 751, 1958
- 9) Lowens-tein, L. and Balhew, D.H. M.A.J., 78: 195, 1958
- 10) Rafelson, Maxe. Basic Biochemistry 2 nd ed. New York, Mac millan, 1968
- 11) Schanker, L.S. Pharmacol. Rev., 14: 501, 1962
- 12) Stein Beck, A. W. Nephrotic syndrome. M.J. Australia, 1. 543, 1960
- 13) Strauss, M.B. and Welt, L.G. Diseases of the Kidney. Boston, 1963. Little, Brown co