

سندرم دوپویترن در بیماریهای کبدی*

تناوب شیوع سندرم دوپویترن در بیماران الکلیک و سیروز های لاینک نوع الکلیک نخستین بار بوسیله Wolfe Davidson, Summerskill کشf وجود آن به اثبات رسید که بعداً مورد قبول همگان قرار گرفت. از آنجاییکه وجود این سندرم در بعضی از بیماریهای کبد نیز دیده میشد، بخشش مطالعات بیمارستان تحقیقاتی شهر نیویورک درمورد اثبات وجود ویا عدم وجود این سندرم در بیماریهای کبدی از نوع الکلی وغیرالکلی مطالعات وسیعی انجام داده و نگارنده که بسته این تحقیقات بودم خلاصه آنرا بشرح زیربینظر برسانم.

بیماران مورد مطالعه ما شامل ۹۰ نفر بیمار مبتلی به انواع مختلف امراض کبدی بودند (۴۸ نفر مرد و ۴۲ نفر بقیه زن بودند) در طی دو سال مطالعه که بر روی این بیماران انجام گرفت تمام آزمایشها کبدی که برسوم کلیه بخشاهای تحقیقاتی از جهت بررسی کامل دربورد نوع بیماری کبدی بیماران میباشد بوسیله ما انجام گرفت و قریب ۵۰ نفرشان بعد از مرگ تحت مطالعه آسیب شناسی دقیق قرار گرفته بودند از این ۹۰ بیمار ۷۶ نفرشان سیروزالکلیک و ۱۴ نفرشان سرطان ثانوی واولیه کبد. ۷ نفرشان هپاتیت نوع ویروسی و سرمی، ۷ نفرشان سیروز بر قانی از نوع انسدادی و ۲ نفرشان دچار سندرم باقی، ۱ نفر دچار سیروز قلبی و ۱ نفر نیز دچار استحاله حاد چربی کبد شده بود. من بیماران زن بین ۳۵ تا ۸۱ و مرد بیماران مرد ۱۷ تا ۸۵ سال بوده است.

طبقه بندی زیر که بوسیله Moorhead در دردشت درجه ظهور سندرم دوپویترن پیشنهاد شده بود مورد استفاده ما در این بیماران قرار گرفت:

۱ - درجه اول: وقتی که دانه های ریز فیبروزی در امتداد نیام یا اوتار عضلات تا کننده سطحی انگشتان دست ظاهر میشود.

* استادیار دانشکده پزشکی

** این مقاله قبلاً در شماره اول سال ۱۹۶۶ Journal of the Mount-Sinai Hospital

از زبان انگلیسی انتشار یافته است

۲- درجه دوم : هنگامی که بجای ظهور این دانه های فیبروزی استطالة های فیبروزی نسبتاً سختی بین این اوتار نمایان میگردد.

۳- درجه سوم : هنگامی که این رشته های فیبروزی منجر به کوتاه شدن این اوتار وبالاخره خم شدن انگشتان دست دیگردد.

۴- درجه چهارم : مجموعه درجات ۱ و ۲ و ۳ را دربرداشت باشد.
در ۶۲ بیمار مبتلی بدیگروزالکلیک تعداد ۳۶ نفر از برداشتم. ۲۰ نفر از زنان دچار الکلیسم شدید باشد طولانی بودند - ۴۰ نفرشان و با ۸/۴ درصد این بیماران بوضوح دچار سندرم دوپویترن شده اند.

در ۸۲ نفر از بیماران که دچار بیماریهای کبدی از انواع دیگر بودند فقط در ۱۰ نفرشان و با در ۷/۳۵ درصدشان سندرم دوپویترن دیده شد (تابلوی ۱) چنانکه ملاحظه میشود تناوب شیوع اریتم کف دست و آنژیوم های عنکبوتی شکل (Spider Angiomata) نیز در این بیماران مقایسه شده است.

تابلوی ۱

نوع بیماری کبدی	تعداد بیماران	سندرم دوپویترن	آنژیوم	اریتم پالس	Spider
سیروزالکلیک	۶۲	۳۵ (۷۰/۴)	۱ (۶۴/۱)	۰ (۴/۱)	(۷۰/۴/۴)
سیروز کاردیاک	۱	۱ (۱۰۰/۱)	۰	۰	۱ (۱۰۰/۱)
سرطان کبد	۱۰	۰ (۷۰/۰)	۰ (۷۰/۰)	۴ (۴۰/۰)	۳ (۷۰/۰)
سیروز دراثر بر قان انسدادی	۷	۲ (۷۰/۰)	۱ (۹/۱)	۱ (۹/۱)	۰ (۷۰/۰)
دز نرمانس چربی کبد	۱	۰	۰	۰	۰
سندرم پانشی	۲	۰ (۷۰/۰)	۱ (۷۰/۰)	۱ (۷۰/۰)	۱ (۷۰/۰)
هپاتیت	۷	۱ (۷۰/۰)	۱ (۷۰/۰)	۱ (۷۰/۰)	۱ (۷۰/۰)

گروه تحقیقاتی ما در طی این مطالعات کوشید تاشاید بتواند ارتباطی بین درجه و شدت ظهور این سندرم باشد و ضعف الکلیسم بیماران قائل شود ولی متأسفانه ثابت شد که بهبود عوجه بین درجه ظهور سندرم دوپویترن و شدت دوره الکلیسم رابطه مستقیم وجود ندارد.

چنانکه از طالعه تابلوی II برمی آید ما کوشیدیم که در یک مری مطالعات دیگر خود شاید بتوانیم در رابطه وجود شدت ضایعات کبدی با نتایج بدست آمده از آزمایشها کبدی تحقیقاتی انجام داده و احتمالاً ارتباط وجود خرانی نتایج آزمایشها کبدی را در ضایعات پیش روی کبدی نیز بررسی نمائیم. آنچه ما نتیجه گرفتیم ثابت نمود که تقریباً پسیاری از موارد

شدت و خراص نتایج آزمایش‌های کبدی الزاماً متراوف شدت خایعات کبدی نخواهد بود چه در بیماران کبدی با ضایعات بسیار پیش‌رفته ممکن است آزمایش‌های کبد کاملاً طبیعی یا اختلال مختص بر را نشان دهند و بر عکس .

تابلوی ۲

نوع بیماری کبد	تعداد بیماران	نتایج آزمایش‌های کبدی	سندروم دوبویترن مشبت منفی
سیروز الکلیک	۶	اعمال کبدی شدیدآ مختل شده است (۸ لفر)	۴
	۲۰	» بطور متوسط « (۲۷)	۷
	۱۴	» طبیعی بوده است (۱۴)	۶
سرطان کبدی	۱۰	» شدیدآ مختل شده است (۰)	۰
	۳	» بطور متوسط مختل شده است (۳)	۱
	۷	» طبیعی بوده است (۷)	۳
دزنسانس شدید چربی	۱	» شدیدآ مختل شده است (۰)	۰
	۰	» بطور متوسط « (۰)	۰
	۱	» طبیعی بوده است (۱)	۰
سروزد راثررقان انسدادی	۷	» شدیدآ مختل شده است (۱)	۱
	۲	» بطور متوسط « (۲)	۱
	۲	» طبیعی بوده است (۲)	۰
سندروم بانتی	۲	» شدیدآ مختل شده است (۰)	۰
	۰	» بطور متوسط « (۰)	۱
	۰	» طبیعی بوده است (۰)	۰
سیروز قلبی	۱	» شدیدآ مختل شده است (۰)	۰
	۰	» بطور متوسط « (۰)	۰
	۰	» طبیعی بوده است (۰)	۱
هپاتیت	۷	» شدیدآ مختل شده است (۲)	۱
	۰	» بطور متوسط « (۰)	۰
	۰	» طبیعی بوده است (۰)	۰

خلاصه

وجود سندرم دوپویترن را ما در. ۹ بیماری که بد اسراف مختلط کبد دچار بودند تحت مطالعه قرار دادیم.

آنچه از مطالعات خود نتیجه گرفتیم این بود که ۴ نفرشان دچار این سندرم در مراحل مختلف بوده‌اند.

در ۲۶ نفر بیماریستی به سیروزالکلیک مورد مطالعه‌ما ۴ نفرشان سندرم دوپویترن را بوضوح دارا بودند.

این تناوب در دسته دیگر از بیماران که دچار بیماری‌های کبد غیر از سیروزالکلیک بودند فقط در ۷/۳ درصدشان بد اثبات رسید.

بدوآما کوشیدیم تابوسیله گرفتن یک شرح حال دقیق از وضعیت شغلی - اعتیادات و احتمالاً خایعاتی که قبل از درستهایشان در اثر ضربه شکستگی و کارهای دیگر پدید آمده بود بررسی کرده و این بیماران را از گروه مورد مطالعه خود حذف کنیم تا ظهور سندرم دوپویترن که بعلل دیگر نیز دیده می‌شود اشکالی در نتیجه مطالعات ما که صرفاً روی بیماران کبدی نوع الکلیک صورت گرفته بود پدید نیایورد. آنچه ما نتیجه گرفتیم این تناوب شیوع سندرم دوپویترن در بیماران الکلیک ۵/۰٪ و در بیماران کبدی دیگر ۳۵٪ بوده است.

Références

- Bijan Nazari, M. D
- 1- Dupuytren's contracture associated with Liver Disease Journal of The Mount Sinai Hosp. Volume XXXIII No=1 Jan -Feb - 1966; 72
 - 2- Wolf, Stanley, Summerskill, Davidson ; Dupuytren, contracture Jimed 255 ; 559, 1656