

ازبخش سرطان بیمارستان بهلوی

آخرین تقسیم‌بندی سرطان پستان یا تقسیم‌بندی T.N.M.

* دکتر سهیل مجد

مدتها بود احساس میگردید تقسیم بندیهای جدیدی برای سرطان‌های اعضاء مختلف بدن مورد احتیاج است و تقسیم بندیهای متنوعی که امروزه بکار می‌رونند ناکامل بودن خود را بخوبی نشان داده‌اند.

اعضایی که بیشتر وزودتر از همه شامل تقسیم بندی شده‌اند آنها بی هستند که تقریباً در قسمت خارجی سطح بدن قرار گرفته و یا دسترسی بدانها نسبتاً آسانتر است و سردسته این نوع سرطانها سرطان پستان است.

باید متذکر گردید که قبل از کنگره سرطان لندن - سازمان بهداشت جهانی و کمیته سرطان وابسته آن از لحاظ پیشرفت موضعی تمام سرطانها را بچهار قسمت تقسیم نموده بودند $T_1 T_2 T_3 T_4$ که در T_1 تومور متحرک بدون انتشار و پیشرفت موضعی و T_4 که تومور کاملاً باعضاً مجاور چسبیده بود.

در همین زمینه بعداً کمیته آمار و تقسیم بندی وابسته به UICC تقسیم بندی بالینی جدیدی را جهت سرطان پستان و حنجره پیشنهاد نمود که بعدها باید ملاک و مأخذی برای تقسیم بندی سایر تومورهای سرطان قرار گیرد تقسیم بندی که نگارنده به توضیح و انتشار آن مبادرت می‌ورزد در کنگره سرطانی ژانویه ۱۹۶۰ لندن مورد قبول واقع گردیده و امروزه در هر اکثر مبارزه با سرطان مورد استناد است و بنام تقسیم بندی سیستم TNM خوانده می‌شود (T مخفف تومور N مخفف Node یعنی غده لنفاوی و M مخفف متاستاز می‌باشد) و بطور جامعتری T یعنی حالت موضعی تومور اولیه از لحاظ پیشرفت مستقیم، N یعنی حالت غده لنفاوی از لحاظ انتشار ظاهری وبالینی، M متاستازهای دوردست خارج از پستان - کبد - واستخوان وغیره.

حالت تومور بچهار قسمت تقسیم می‌شود که تقریباً مطابقت با پیشنهاد WHO مینماید و ترتیب عبارتنداز $T_1 T_2 T_3 T_4$.

علامت N فقط یک توصیف بالینی است بر حسب اینکه گانگلیون غیر محسوس N_0 محسوس N_1 و یا چسبیده N_2 باشد.

موردی است که کانکلیون فوق ترقه محسوس باشد بنابراین بجهار قسمت تقسیم N_3

میشود $N_0N_1N_2N_3$

صرفظیر از آنکه آیا کانکلیون از لحاظ آزمایش میکروسکوپی آلوده است و یا اخیراً بعد از عمل جراحی آلوده بودن آنها ثابت گردید $+N$ است و اگر منفی باشد مطابق حالت بالینی غده لنفاوی نامگذاری میگردد.

همچنین M که علامت متاستاز است فقط یک تعریف بالینی است شما وقتی بیمار را از لحاظ بالینی معاینه نمودید و دلیلی بر متاستاز در کبد و یا استخوانها یافتید $M0$ است و اگر یافتید $+M$ است.

شما بیمارانی را خواهید یافت که وضع بالینی آنها با یکی از حالات مختلف M, N, T تعطیق مینماید وقتی وضع بیمار از لحاظ TN مشخص گردید میتوان برآحتی او را در یکی از چهار درجه بندی بالینی گروه بندی نمود.

مثالاً بیماریکه توموری در پستان دارد که اندازه قطر آن ازینچ سانتیمتر کمتر بوده و نوک پستان را بداخل نکشیده است و چسبندگی به عضلات سینه و پوست ندارد - غده لنفاوی محسوس نداده متاستاز دور دست ندارد درجه یک یا Stage I است.

بر عکس بیماری که تمام مشخصات فوق را داشته و یک متاستاز در ریه دارد Stage IV است. تقسیم بندی فوق محدودیتها بی رابرای عمل جراحی قائل است مانند حالت Peau d' Orange پوست که اگر زیاد و یا دورتر از تومور اصلی باشد به Stage III میرود که از عمل جراحی بطور قطعی باید صرفظیر نمود. رویه مرفته این تقسیم بندی میدان دید و سیع تری داشته و محقق آناییجی که برای بیماران گرفته میشود بهتر خواهد بود.

تقسیم بندی فوق مؤکداً توصیه شده است آمارها و انتشارات عملی باید مطابق با آن باشند اما مورد استناد و قبول مزاکر و مجامع بین المللی قرار گیرد.

تقسیم بندی سیستم T.N.M

ژانویه ۱۹۶۰ میلادی

T-Tumur

TI - توموری که دوسانتیمتر یا کمتر از آن در طول و عرض فطرش باشد.

- پوست سالم است (غیر از بیماری Paget که محدود به نوک پستان باشد) ..

- عدم کشیدگی نوک پستان بداخل.

- عدم چسبندگی به عضلات سینه

- عدم چسبندگی به جدار قفسه سینه

T_2 - توموری که طویل ترین قطرش بین ۲-۵ سانتیمتر باشد .

یا چسبندگی به پوست بطور ناکامل موجود باشد - پوست فرو رفته 1 یا مهار شده 2 رایج ماری Paget که از نوک پستان 3 تجاوز نموده باشد .

- عدم چسبندگی به عضلات سینه

- عدم چسبندگی به جدار قفسه سینه .

T_3 - تومورین ۱۰-۵ سانتیمتر در طویل ترین قطرش .

یا چسبندگی به پوست بطور کامل (زخم یا انفلتراسیون) موجود باشد .
یا *Peau d'Orange* در ناحیه تومور موجود باشد .

یا چسبندگی به عضلات سینه بطور کامل یا ناکامل موجود باشد .

- عدم چسبندگی به جدار قفسه سینه

توضیح - چسبندگی ناکامل به عضلات سینه یعنی در موقع انقباض عضلات فوق حرکت تومور محدود شود .

T_4 - تومور بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر در طویل ترین قطرش باشد .

- چسبندگی به پوست یا *Peau d'Orange* دورتر از تومور اصلی و نه دورتر از حدود پستان موجود باشد .

- چسبندگی به جدار قفسه سینه موجود باشد .

توضیح - جدار قفسه سینه شامل دندنه ها عضلات بین دندنه و عضله دندنه قدامی است و شامل عضلات سینه نمی شود .

N = غده های لنفاویک ناحیه 4

N_0 - محسوس نبودن غدد لنفاوی در همان طرف 5

N_1 - وجود غده لنفاوی متحرک در زیر بغل همان طرف .

N_2 - وجود غدد لنفاوی غیر متحرک یاک غده چسبیده بدیگری و یا چسبیده بدیگر عناصر تشریحی .

N_3 - غده لنفاوی متحرک یا غیر متحرک در ناحیه فوق ترقوه همان طرف .

1- Dimpled

2- Tethered

3- Nipple

4- Regional Lymph Nodes

5- Homolateral

- تورم بازو .

توضیح - تورم بازو ممکن است بعلت انسداد مجاری لنفاوی حادث شود در چنین وضعی ممکن است غده‌های لنفاوی محسوس نباشد .

متاستازهای دوردست = M₀

- معنی عدم وجود متاستاز دور دست است .

M₀ - متاستازهای دوردست شامل - انتشار مستقیم به پوست دورتر از پستان مبتلا بسرطان و انتشار به پستان مقابله و در نام حالاتی که علاوه بر بالینی و باور توشناسی متاستاز به ریه، پرده‌های جنب، استخوانها و یا آکبید را ثابت نماید .

تقسیم بندی بالینی

تقسیم بندی بالینی ذیل پیشنهاد شده است .

Stage I - توموری است که حداً کثر قدر من پنج سانتیمتر باشد (T₁ یا T₂) چسبندگی به پوست موجود نیست (T₁) یا ناکامل است (T₂).

نوك پستان ممکن است بداخل کشیده شده باشد (T₂) یا بیماری Paget موجود باشد .
 « (T₁ - T₂) »

- چسبندگی به عضلات سینه موجود نیست (T₁ - T₂).

- چسبندگی به قفسه سینه موجود نیست (T₁ - T₂).

- غده‌های لنفاوی زیر بغل همان طرف محسوس نیست (N₀).

- متاستاز دوردست موجود نیست (M₀).

درجه دو یا

- توموری است تا پنج سانتیمتر یا کمتر از آن (T₁ - T₂).

- چسبندگی به پوست موجود نیست (T₁) یا ناکامل است (T₂).

- نوك پستان ممکن است بداخل کشیده شده باشد (T₂) یا بیماری Paget موجود باشد (T₁ - T₂).

- چسبندگی به عضلات سینه موجود نیست (T₁ - T₂).

- چسبندگی به جدار قفسه سینه موجود نیست (T₁ - T₂).

- غده‌های لنفاوی زیر بغل همان طرف قابل لمس و لیکن متحرکند (N₁).

- متاستاز دوردست موجود نیست (M₀).

درجه سه یا

قطع تومور بیشتر از پنج سانتیمتر باشد (T₃ - T₄) یا چسبندگی به پوست کامل باشد (T₃).

نامه دانشکده پزشکی	سال بیست و یکم
یا انتشار به پوست دورتر از تومور اصلی رفته باشد (T ₄)	(T ₄)
یا در ناحیه تومور Peau d'Organge موجود باشد (T ₃)	(T ₃)
یا Peau d' Organge دورتر از تومور رفته باشد (T ₄)	(T ₄)
- چسبندگی به عضلات سینه بطور کامل یاناقامل موجود باشد (T ₃)	(T ₃)
- چسبندگی به جدار قفسه سینه موجود باشد (T ₄)	(T ₄)
- غده های لنفاوی همان طرف غیر متحرک باشند (N ₂)	(N ₂)
- تورم بازو موجود باشد .	
- غده های لنفاوی فوق ترقوه همان طرف قابل لمس یا غیر متحرک باشند (N ₃)	(N ₃)
- متاستاز دوردست موجود نباشد (M ₀)	(M ₀)
درجه چهار یا Stage IV	
- متاستاز دوردست موجود باشد (M ₊) بدون توجه به تومور اصلی و یا غدد لنفاوی .	(M ₊)

مأخذ و مدارک :

I – Seventh International Cancer Congress

II – U.I.C.C انتشارات

III – کنفرانسهای بیمارستان رویال مارسدن لندن -