

نومبر ۱۹۵۵

از مجله: La semaine des hôpitaux de paris

ترجمه: پرهامی دانشجوی سال ششم پزشکی

## گالا آر آرد و اطراف تهران

نگارش:

دکتر منوچهر اقبال      دکتر آثر یزیر

استاد کرسی بیماریهای واگیر      دانشیار انگلشناسی  
دیپس بخش آزمایشگاه  
بیمارستان پهلوی

نمیگان در ۱۹۱۳ طی مطالعات خود درباره لیشمایوزسگ در تهران اجسام لیشمون را در گستردۀ ضایعات پوست و همچنین در گستردۀ اعضاء، بخصوص طحال و مغز استخوان دیده بود معنداً مدتی طول کشید تا وجود لیشمایوز احشائی این حیوان در تهران ثابت شد.

نمیگان چند گستردۀ از ضایعات جلدی و مغز استخوان برای ونیون فرستاد و نظر او را خواست نامبرده حین نشان دادن این گستردۀ ها در جلسه ۱۵ مه ۱۹۱۶ در انجمن پادشاهی طب گرمییری و بهداشت (۱) اظهار داشت که امتحان این گستردۀ ها وجود لیشمایوز احشائی را همراه لیشمایوز جلدی سگ در تهران ثابت نمیکند و برای حل این مسئله مطالعه دقیق تری بایستی انجام شود.

لاوران نیز در ۱۹۱۷ در کتاب خود راجع به لیشمایوز نوشت که موردی که نمیگان دیده بمنظار نمی‌آید که زر الیزاسیون لیشمایاتروپیکا باشد و بعلاوه مشکل است تصور کرد که سگ در عین حال هم به لیشمایاتروپیکا وهم به لیشمایادونوانی آلوده باشد. در جریان ۲۰ سال اخیر چندین بیمار مبتلا به لیشمایوز احشائی از طرف پزشکان ایرانی دیده شده بودند ولی این شرح حال ها بعد از مطالعات دکتر پویا منتشر گردید.

در ۱۹۴۹ دکتر پویا وجود اجسام لیشمون را در طحال یک بچه ۵ ساله اهل حوالی شهرسوار که در بخش آقایدکتر قریب در بیهودگارستان رازی بسته بود با بذل طحال بثبوت رسانید این سوش توسط آقایان دکتر انصاری و دکتر مفیدی در کرسی انگلشناسی و بخش تجسسات علمی دانشکده پزشکی تهران جدا شد و اثر آن روی حیوانات آزمایشگاه مطالعه گردید این شرح حال تشخیص چند حالت دیگر را نیز که توسط دکتر پویا دیده شده بود روشن کرد (۱ مرد ۰ ساله اهل شهرسوار در ۱۹۳۳ یک دختر بچه ۰۱ ساله اهل تنکابن در ۱۹۳۸) بعلاوه دکتر پویا در مطالعه راجع به کلا آزار در ناحیه بحر خزر در ۱۹۴۹ اجسام لیشمون را در گستردگی مغز استخوان یک سگ در بندر چون و چنان دیده بود.

موارد دیگری از لیشممانیوز احشائی در آبادان توسط رید (۱) دیده شد یک بیمار ۴ ساله اهل آبادان که دو بار به کازرون فارس مسافت کرده بود رید بعلاوه اظهار میدارد که کودک ۵ ساله دیگری را که علائم بالینی کلا آزار داشته ولی فرمل- ژل او منفی بوده با استیبو گلو کونات دوسدیم معالجه کرده است . بزل مغز استخوان در این بیمار انجام نشده بود بالاخره گرم لیز (۲) در ۱۹۵۲ وجود اجسام لیشمون را در گستردگی مغز استخوان یک بیمار در سوسنگرد ( خوزستان ) خاطر نشان کرده است.

تمام این مشاهدات نابت میکند که کلا آزار بصورت اسپورادیک در ایران دیده میشود که کانونهای آن در شهرسوار - اردبیل - سوسنگرد - آبادان و کازرون میباشد .

شرح حال زیر یک کانون آندمیک دیگر را بصورت فوق اضافه مینماید این منطقه در حوالی تهران است که در آنجا لیشممانیوز جلدی بد و شکل شهری و روستائی دیده میشود در ده باقر آباد در ده کیلومتری جنوب تهران ما یک مورد کلا آزار مشاهده کرده ایم .

بیمار م.alf. پسر جوان ۱۵ ساله بعلت ضعف فوق العاده - تپ دائمی و ازدیاد حجم شکم مراجعه کرده است در نوش آباد حوالی کاشان متولد شده و همیشه سالم بوده بکارهای زراعتی اشتغال داشته دو سن ۱۰ سالگی با ابوین خود بدھی در جنوب تهران آمده و در آنجا چوپانی میکرده واز صبح تا شام بدون ناراحتی کار کرده است پس از ۸ ماه احساس ناراحتی مینماید و در پهلوی چپ حس سنجکنی میکند و در شبها موقع بازگشت از کار تپ شدید و پس از آن عرق میکرده است این حالت کم کم شدید شده و بعد غیر قابل تحمل گردیده کودک را شهر ری آورده ۱۴ روز در بیمارستان فیروز آبادی بستری میکنند. در آنجا تشخیص بیماری داده نمیشود درمان با کنین مدرها و مقویات قلب بی تیجه بوده است. هر شب ابتدای غروب بیمار تپ میکرده و صبح با عرق زیادی ختم میشده روزها خسته بوده و در عین حال حجم شکم روز بروز زیادتر شده و تنفس را دچار اشکال میکرده بیمار دیگر غذا نمیخورد و در این حال به بیمارستان پهلوی مراجعه نموده است.

بیمار موقع مراجعه لاغر، کم خون باشکم بزرگ و واریکوزیته جلدی بوده لکه‌های خاکستری روشن باندازه‌های مختلف در تمام صورت باستثنای نوک بینی و خط دور بینی دیده میشد منخرین از کبره‌های خونینی پوشیده شده‌اند. لکه‌های مشابه هم روی پاشنه‌ها و سطح چلوئی دستها و پاها مشاهده میگردید. شکم بنظر میآمد که از طحال و کبد پر شده است. طحال بزرگ ( $23 \times 12$  سانتی‌متر) و سطح داخلی آن از خط میانی شکم و ناف گذشته واز پائین تا حفره خاصره رفت. قوام آن سفت‌ولی دردناک نیست - کبد نیز بزرگ ( $25 \times 15$  سانتی‌متر) قوا آن از حد طبیعی سفت‌تر است ولی در فشار دردناک نیست. تمام غدد لنفاوی زیر بغل واپی ترکله و رانی و گردانی بزرگ شده‌اند بدون اینکه در ناک باشند. ضربان قلب سریع و در قاعده و ناحیه وسط بهتر از رأس صدای شنیده میشوند صدای های تنفسی شدید و در پهلوی چپ واضح‌ترند. اشتها کم شده بیمار غذاهای سبک و مقادیر کم غذا را بیشتر ترجیح می‌نماید علاوه بر طبیعی در دستگاه‌های دیگر دیده نمیشند

(دستگاه ادرار - دستگاه اعصاب) منظره بیمار فوراً فکر را متوجه کلا آزار میکرد در فامیل بیمار علائم کلا آزار یا بیماری دیگری دیده نمیشده مادر بیمار و خود او شبیه این بیماری را در دهندیده بودند.

بزل استخوان استرنوم و طحال و غده‌های لنفاوی فردای روز و رود بعمل آمد. مقدار زیادی جسم لیشم من در فروتیهای مغز استخوان دیده شد تعداد سلو لها کم ولی تغییر زیادی در دودمان گلبولهای قرمز ظاهر گردیده بود پلاسموسیتها ۱۲٪ و اوزینوفیل ۵٪ بودند و این دلیل یک ضایعه مزمن است پونکسیون طحال علاوه بر اجسام لیشم من زیادی لنفوسیتها را نشان میداد پونکسیون غده‌های لنفی نیز از نظر جسم لیشم من مثبت بود.

محصول بزل استخوان استرنوم و طحال هر کدام در ۷ لواه N. N. N. کشت شد یک لواه بعد از ۱۱ روز مثبت و سایرین منفی ماندند. سه هاماستر کوچک باعصاره طحال تزریق شدند یک‌ها مستر کوچک اسپر موافق و ۲ ها مستر طلائی ۲ تا ۴ ماه بعد از تلقیح مثبت شدند.

تعداد گلبولهای قرمز ۳۹۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب و گلبولهای سفید ۰۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب بود.

فرمول لو کوسیتر - ۰.۰۵۱٪ نوتروفیل - ۰.۰۱٪ اوزینوفیل ۰.۴۱٪ لنفوسیت ۰.۷٪ مونوسیت نشان میداد. بلاکتها ۱۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب، زمان سیلان ۵/۳ دقیقه، زمان انتقاد (روی لام) ۹ دقیقه، سرعت سدیمه انتاسیون ۱۰۰ میلی متر در ساعت اول وجود تراس آلبومین در ادرار. عدم وجود تخم انگل در مدفوع با آزمایش مستقیم و بعد از فلو تاسیون بالاخره راکسیون فورمول لو کوزلیفیکاسیون و با آب مقطر بترتیب بعد از ۲ ثانیه و ۵/۱ ثانیه مثبت بودند.

امتحان محصولات گرا تازه حوالی جدار راست و چپ بینی، پوست سالم، ران چپ، ساعد و گونه راست همچنین دو ضایعه کوچک روی لب فو قانی و روی انگشت وسطی چپ تماماً منفی بودند. بیمار را تحت سه دوره درمان با گلو کانتیم تزریق داخل عضله لانی (۵ سانتیمتر مکعب) قراردادیم و دنبال آن درمان با ویتامین K و عصاره جگر

انجام شد.

مجهوعاً ۱۸ گرم گلوکاتئیم در دوره اول ۱۸ گرم در دوره دوم ۱۸ گرم در دوره سوم تجویز شده است.

بعد از خاتمه دوره اول درجه حرارت تقریباً طبیعی شد پس از یک هفته تبدو با ره شروع شد ولی پس از خاتمه دوره دوم بکلی قطع گردید.

پونکسیون مغز استخوان ۱۵ روز بعد از دوره اول هنوز مقدار کمی چشم لیشمن تغییر شکل یافته (۱) داشت و کشت این محصول منفی بود ولی راکسیون فرمل لو کوژلیفیکاسیون و آب مقطر پس از ۵/۱ دقیقه مثبت بود. آدنوگرام و اسپلنوگرام که روز ۱۶ به عمل آمد نظیر همین اجسام را تغییر شکل داده نشان میداد بعلاوه واکنش هیستیوسیتر در هر عضو دیده شد.

بزل مغز استخوان ۴ روز بعد از خاتمه دوره دوم درمان از لحاظ میکروسکوپی و کشت منفی بود باز هم راکسیونهای فرمل او کوژلیفیکاسیون و آب مقطر بعد از ۲ دقیقه مثبت بودند.

۴ روز پس از ختم دوره سوم درمان بزل مغز استخوان از لحاظ میکروسکوپی و کشت منفی و واکنش فرمل ژلیفیکاسیون هنوز مثبت بود. روز بعد بیمار مرخص گردید.

وزن بیمار که روز ورود ۲۷ کیلو گرم بود طی ۲ ماه بستری شدن ۲۶ کیلو شده و موقع مرخصی ۳۱ کیلو گرم گردید. طحال از اندازه  $12 \times 23$  سانتیمتر خیلی کوچک شده و به ۱۵ سانتیمتر از کنار دندنه ها رسیده بود. کبد هم بنو به خود از  $25 \times 12$  سانتیمتر به  $5 \times 3$  سانتیمتر از کنار دندنه ها در روز مرخصی رسیده بود.

یکی از علائم ناراحت کننده بیمار خون دماغ بود که بطور نامنظم بدون کوچکترین دلیل روز و شب اتفاق میافتد مقدار خون که روزهای اول، ۱۰ تا ۲۰ گرم بود در اوآخر دوره اول درمان به  $1 \text{ تا } ۲$  قطره رسیده و پنج روز پس از خاتمه

دوره دوم درمان بکملی خوب شد .  
تعداد گلبو لهای قرمز و سفید اگر چه افزایش یافته و لی طبیعی نشده بود لنهو سیتوز کمی کمتر شده بود همچنین مقدار همو گلو بین افزایش یافته بود - بنظر می آید که تصحیح علامت خونی کندتر از بهبودی حال عمومی انجام میشود بعد از مرخص کردن بیمار نامبرده هر ماهه بما مراجعه میکند و تا کنون هیچگونه علامت بیماری نشان نداده است.

در مطالعه ای که از ده با قرآن آباد بعمل آمد تمام کودکان در این ده معاینه شدند و هیچ موردی از کالا آزار مشاهده نگردید بنابراین مورد فوق تنها مورد کالا آزار در جنوب تهران است که میتوان ذکر کرد .

لازم بیاد آوری است که همکار مادر کنار پویا در بیمارستان رازی یک مورد کالا آزار انفاییل در کودکی سه ساله اهل سوهانک در ۲۰ کیلو متری شمال خاوری تهران در دامنه کوهستان یافته است که سوش آن توسط کشت و تلقیح به حیوانات آزمایشگاه توسط دکتر مفیدی در کرسی انگلشناسی دانشکده پزشکی جذب شده است .

#### نتیجه :

بادر نظر گرفتن کمی موارد دیده شده ، هر چند که شر حال هریض ما یک منطقه جدیدی ب نقاط آلوده به کالا آزار در ایران اضافه میکند ، از نقطه نظر اپیدمیولوژی باید گفت که بیماری خیلی نادر و بصورت هپتو آندرمیک در قسمتهای مختلفه کشور دیده میشود ولی در حقیقت این مسئله موضوع کار اپیدمیولوژیک آینده میباشد .

#### نویسنده

پس از انتشار مقاله بالا اطلاعات زیر اضافه شده است :

در سال ۱۳۳۴ یک پسر بچه ۱۲ ساله اهل مشهد به بیمارستان هدايت معرفی

گردید که توسط کرسی انگل شناسی آزمایشات لازم انجام و تشخیص کالا آزار نزد او داده شد و توسط آقای دکتر بینش ورا با گلوکانتیم با موفقیت درمان گردید.

علاوه طبق اطلاع در شهریور ۱۳۳۵ نیز یک مورد مبتلا در بیمارستان نمازی شیراز تشخیص داده شد و تجت درمان قرار گرفته که از مشخصات بیمار و محل آلودگی آن اطلاعی در دست نیست.