

تأثیر ایمونوگلوبولین وریدی در کاهش بروز پنومونی در بیماران مبتلا به بیماری نقص ایمنی متغیر شایع

دکتر زهرا پورباق، دکتر اصغر آقامحمدی، دکتر ابوالحسن فرهودی، دکتر محمد قرگزلو، دکتر مصطفی معین، دکتر مسعود موحدی، دکتر زهرا چاوشزاده، دکتر لیلا جدید، دکتر نیما رضایی
بخش ایمونولوژی و آرژی مرکز طبی کودکان - مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آرژی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده

مقدمه: بیماری نقص ایمنی متغیر شایع (common variable immunodeficiency) یکی از بیماری‌های نقص ایمنی اولیه می‌باشد که با هایپوگامگلوبولینمی و عقونت‌های مکرر نظاهر پیدا می‌کند. دستگاه تنفس یکی از شایع‌ترین ارگان‌های درگیر در بیماران مبتلا به CVID می‌باشد و پنومونی از شایع‌ترین نظاهرات گرفتاری در دستگاه تنفس تحتانی است. استفاده از فرآورده‌های ایمونوگلوبولین در مبتلابان به CVID یک روش درمانی مناسب و انتخابی می‌باشد که در طی دو دهه اخیر باعث کاهش عقونت‌ها در بیماران مبتلا به CVID شده است. هدف از این مطالعه تعیین اثر ایمونوگلوبولین وریدی در کاهش دفعات بروز پنومونی در این بیماران می‌باشد.

مواد و روشها: بدین منظور ۲۶ بیمار مبتلا به CVID که در بخش ایمونولوژی و آرژی مرکز طبی کودکان تشخیص داده شده و حداقل ۹ ماه تحت نظر و درمان با ایمونوگلوبولین وریدی (IVIg) بودند، وارد مطالعه شدند که اطلاعات موردنیاز جهت ثبت تعداد دفعات بروز پنومونی و دفعات بستری در بیمارستان قبل و پس از دریافت IVIg از پرونده بیماران استخراج گردیده است.

یافته‌ها: از میان ۲۶ بیمار مبتلا به CVID، ۱۶ بیمار مذکور و ۱۰ بیمار مؤنث بوده‌اند. میانگین سنی آنها $13/4 \pm 5/1$ سال (حدوده: $4/5$ تا $26/5$ سال) و میانگین مدت زمان پیگیری $72/2 \pm 51/8$ ماه (حدوده: ۵ تا 189 ماه) بوده است. از ۲۶ بیمار مبتلا به CVID در طی این مطالعه $8/80$ آنها قبل از دریافت IVIg مبتلا به پنومونی شده‌اند که پس از درمان با IVIg به $24/6$ ٪ تقلیل یافته است ($P-value = 0/0017$). دفعات ابتلا به پنومونی به ازاء هر بیمار در یکسال از $2/3$ قبل از درمان به $0/6$ پس از دریافت IVIg کاهش یافته است ($P-value < 0/0005$). همچنین $88/5$ ٪ بیماران قبل از دریافت IVIg سابقه بستری در بیمارستان به علت عقونت داشته‌اند که پس از درمان با IVIg به $4/6$ ٪ تقلیل یافته است ($P-value = 0/0025$). دفعات بستری بیمار به ازاء هر بیمار در یکسال از $3/4$ قبل از درمان به $0/7$ پس از دریافت IVIg کاهش یافت ($P-value < 0/0005$).

نتیجه گیری و توصیه‌ها تشخیص زودرس بیماری CVID و درمان منظم بیماران مبتلا با IVIg می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ابتلای به پنومونی و دفعات بستری ناشی از عقونت‌ها و عوارض آنها داشته باشد. این بیماران باید تحت پیگیری‌های منظم و دقیق قرار گیرند تا مصرف مرتباً و کامل IVIg امید به زندگی با کیفیت مطلوب را در این بیماران افزایش دهد.

مقدمه

می باشد. از سال ۱۹۸۰، تزریق ایمونوگلوبولین وریدی (IVIg)، سلامت عمومی در بین این بیماران را افزایش و میزان عفونت‌های دستگاه تنفسی را کاهش داده است. در بعضی از مطالعات پس از شروع درمان با میانگین دفعات ابتلاء به پنومونی در سال به ازای هر بیمار در بیماران مبتلا به CVID، ۰/۱۸، ۰/۱۸ بوده است (۱۱، ۱۲).

بیماران با تشخیص CVID که دچار پنومونی هستند به درمان IVIg با دوز مناسب پاسخ مناسبی می‌دهند بیشتر بیماران CVID با دوز مناسب درمانی mg/kg هر ۳۰۰-۴۰۰ در ۴-۳ هفته یکبار تحت درمان قرار می‌گیرند (۲، ۱۳).

هدف از این مطالعه تعیین اثر ایمونوگلوبولین وریدی در کاهش بروز پنومونی و میزان بسترهای شدن ناشی از عفونت‌ها در این بیماران بوده است.

بیماری نقص ایمنی متغیر شایع (CVID) یکی از بیماری‌های نقص ایمنی اولیه است که تشخیص بیماری بر اساس کاهش در دو IgM، IgG و یا کاهش در دو رده از سه رده ایمونوگلوبولین‌ها می‌باشد. میزان شیوع این بیماری بین $1/10000$ تا $1/50000$ تخمین زده شده است (۱، ۲، ۳، ۴).

بیماران مبتلا به CVID، تعداد سلول‌های B در گردش خونشان طبیعی است اما دچار اشکال در تکامل این سلول‌ها می‌باشند؛ به طوری که در تولید و ایجاد ایمونوگلوبولین‌ها دچار اختلال هستند، همچنین شواهد محکمی در مورد غیرطبیعی بودن سلول‌های T در CVID مطرح شده است (۲، ۵، ۶).

CVID در هر سنی از دوران کودکی تا هنگام بزرگسالی، می‌تواند بروز کند؛ هر چند در دوران کودکی و اوایل جوانی بیشتر دیده می‌شود. دو محدوده سنی در مورد این بیماری وجود دارد: یکی در سن ۶-۱۰ سالگی و دیگری در سن ۲۶-۳۰ سالگی (۷، ۸).

بروز عفونت‌های مکرر از جمله علائم عمدۀ بالینی مبتلایان می‌باشد که در ارگان‌های مختلف ظاهر پیدا می‌کند. عفونت‌های دستگاه تنفسی به خصوص پنومونی از شایع‌ترین عفونت‌ها در بیماران نقص ایمنی هومورال می‌باشد. از جرم‌های شایع در این بیماران می‌توان به جرم‌های کپسول‌دار مثل استرپتوکوک پنومونیه و هموفیلوس آنفلوزا اشاره نمود (۹، ۱۰).

مطالعات اخیر نشان داده اند که ۷۷٪ از بیماران CVID حداقل یک حمله پنومونی، قبل از تشخیص داشته‌اند. تشخیص و درمان زودهنگام، مسأله مهمی در کاهش شیوع بیماری‌های مزمن ریوی در کل بیماران هایپوگام‌گلوبولینی است (۹).

استفاده از فرآورده‌های ایمونوگلوبولینی در مبتلایان به نقص ایمنی اولیه آنتی‌بادی یک روش درمانی مؤثر و انتخابی

مواد و روش‌ها

طبق مطالعات صورت گرفته بر روی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه در ایران تا نیمه دوم سال ۱۳۸۱، تعداد ۹۸ مورد بیمار مبتلا به CVID در بانک اطلاعاتی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه ایران ثبت گردیده بودند (۱۴) که تشخیص ۶۴ مورد از آنها در مرکز طبی کودکان بوده است. تشخیص بیماران بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی (کاهش هر سه کلاس ایمونوگلوبولین‌ها پس از ۲ سالگی و ابتلاء به عفونت‌های مکرر) بوده است (۱). از این تعداد، بیمارانی وارد مطالعه شدند که تحت پیگیری منظم درمان با تزریقات منظم Nordimmun (Sandoglobulin) IVIg و Nordimmun (Sandoglobulin) IVIg و بیمارانی که دارای تزریقات نامنظم و یا تعداد دفعات کم تزریقات IVIg بودند و یا پیگیری دقیقی نداشتند از مطالعه حذف شدند و بدین تحویل ۲۶ بیمار مبتلا به CVID که حداقل ۹ ماه در این مرکز تحت نظر بوده‌اند در این مطالعه تحت بررسی قرار گرفتند.

جدول ۱- خصوصیات توصیفی بیماران مبتلا به بیماری نقص ایمنی
متغیر شایع (تعداد = ۲۶)

محدوده	انحراف معیار میانگین	خصوصیات
۴/۶ - ۲۶/۵	۱۲/۳ ± ۵/۲	سن (سال)
۱ - ۱۳۸	۲۹/۲ ± ۲۵/۳	زمان شروع بیماری (ماه)
۱۵ - ۱۹۲	۹۸/۱ ± ۵۶/۱	زمان تشخیص بیماری (ماه)
۱ - ۱۸۹	۶۸/۹ ± ۴۶/۳	تأثیر تشخیصی (ماه)
۵ - ۱۸۹	۷۲/۲ ± ۵۱/۸	مدت زمان تحت درمان (ماه)
۰ - ۵۶۰	۲۰۶/۳ ± ۱۶۳/۸	سطح IgG قبل از درمان (mg/dl)

داشته‌اند که پس از درمان با IVIg به ۴/۶٪ تقلیل یافته است ($P-value = 0/0025$). که با توجه به $P-value < 0/05$ و آزمون fisher's exact test ارتباط معنی‌داری بین میزان دفعات بسته‌یاری در بیمارستان قبل از شروع درمان با IVIg و پس از آن وجود دارد. میانگین دفعات بسته‌یاری قبل از درمان $۳/۴$ مرتبه در سال در هر بیمار بوده است که به مقدار $۰/۷$ در سال در هر بیمار پس از درمان کاهش یافته است ($P-value < 0/0005$).

فراوانی نسبی ابتلاء بیماران به پنومونی قبل از دریافت IVIg به طور کل $۸۰/۵$ ٪ بوده است که پس از درمان با IVIg به $۲۴/۶$ ٪ تقلیل یافته است ($P-value : 0/0005$) که نشان‌دهنده ارتباط معنی‌داری بین میزان بروز پنومونی قبل از شروع درمان با IVIg و بعد از آن وجود می‌باشد. ضمناً میانگین دفعات ابتلاء به پنومونی قبل از دریافت IVIg $۰/۶$ در سال در هر بیمار بوده است که به مقدار $۰/۶$ در سال در هر بیمار پس از درمان با IVIg رسیده است ($P-value < 0/0005$).

با توجه به $P-value > 0/05$ و آزمون T-test ارتباط معنی‌داری بین دفعات بروز پنومونی با دوز مصرفی IVIg و بین دفعات بروز پنومونی با تأخیر در تشخیص به دست نیامده است. از ۲۶ بیمار مبتلا به CVID قبل از دریافت IVIg ۲۱ نفر حداقل یکبار ابتلاء به پنومونی را تجربه کرده‌اند که از این تعداد ۸ نفر بیش از ۶ بار، ۲ نفر ۳ بار، ۵ نفر ۲ بار، ۶ نفر ۱ بار حمله‌ای از پنومونی را قبل از

روش انجام کار به این نحو بود که اطلاعات مورد نیاز من جمله مشخصات بیمار شامل تاریخ تولد، تاریخ شروع علائم بیماری، تاریخ تشخیص بیماری، مدت پیگیری، سطوح ایمونوگلوبولین‌ها قبل از شروع درمان با IVIg و آزمایشات (Absolute count) CD3, CD19, CD4, CD8 شروع درمان با IVIg و تعداد حملات پنومونی و تعداد دفعات بسته‌یاری بیمار در بیمارستان قبل و پس از درمان با IVIg از پرونده بیماران استخراج و در پرسشنامه ثبت گردید. در طی درمان، برای تمام بیماران سطوح ایمونوگلوبولین‌ها اندازه‌گیری شد و در پرونده‌های موجود درج گردیده است. تشخیص پنومونی بر اساس شرح حال و معاینه بالینی توسط اساتید بخش ایمونولوژی مرکز طبی کودکان و رادیوگرافی ریه‌ها بوده است. همچنین تأیید موارد نیاز به بسته‌یاری بر اساس معاینه بیمار در بخش ایمونولوژی و تأیید اساتید این بخش صورت گرفته است.

نوع مطالعه به کار رفته از نوع پیش تحریس (Pre-experimental) از دسته مطالعات مداخله‌ای بوده است و آنالیز داده‌ها با نرم افزار SPSS (ویرایش دهم) صورت گرفته است و جهت تعیین ارتباط معنی‌دار بین متغیرها از آزمون‌های Paired t-test و Fisher's exact test استفاده شده است.

یافته‌ها

از ۲۶ بیمار مبتلا به CVID، ۱۶ بیمار (۶۱/۵٪) مذکور و ۱۰ بیمار (۳۸/۵٪) مؤنث بوده‌اند. میانگین سنی بیماران $۵/۲ \pm ۱۳۳$ سال و میانگین مدت زمان در تأخیر تشخیص براساس فاصله سن شروع علایم و سن تشخیص بیماری، $۶۷/۹ \pm ۴۶/۳$ ماه بوده است (جدول ۱).

تمامی بیماران درمان درمان $۳۰۰ - ۴۰۰$ mg/kg هر ۳-۴ هفتگه یکبار دریافت کرده‌اند و به مدت $۷۲/۲ \pm ۵۱/۸$ ماه تحت پیگیری قرار گرفتند. از مجموع بیماران بررسی شده $۸۸/۵$ ٪ آنها سابقه بسته‌یاری بیمارستانی قبل از دریافت IVIg

در طی این مطالعه که بر روی ۲۶ بیمار مبتلا به CVID در مرکز طبی کودکان صورت گرفته، کاهش بارز در میزان بروز پنومونی و همچنین دفعات بستری در بیمارستان پس از درمان با IVIg مشاهده گردید. فراوانی نسبی ابتلای بیماران به پنومونی قبل از دریافت IVIg، از ۸۰/۵ به ۳۴/۶٪ کاهش یافت و فراوانی نسبی دفعات بستری بیماران در بیمارستان نیز از قبل به پس از دریافت IVIg از ۸۸/۵ به ۴۶٪ تقلیل یافته است که این نتایج مطابق با سایر مطالعات صورت گرفته می‌باشد. چنانچه در مطالعه Skull and kemp گروه ۱۸ نفره از اطفال مبتلا به هایپوگامماگلوبولینمی که سن متوسط آنها ۱۱/۸ سال بوده است (۳) کودک با تشخیص CVID و بقیه با تشخیص آگاماگلوبولینمی وابسته به جنس، هایپر IgM با زیر گروه‌های کمبود G، میزان بروز عفونت‌های ریوی بیمارانی که تحت درمان با IVIg قرار گرفته بودند با سایر گروه‌های اطفال در جمعیت عادی برابر بوده است و در واقع IVIg باعث کاهش پنومونی گردید (۱۹). همچنین در سال ۱۹۹۹، مطالعه‌ای آینده‌نگر بر روی ۲۲ بیمار مبتلا به هایپوگامماگلوبولینمی (۱۸ نفر با تشخیص CVID و ۴ نفر با تشخیص آگاماگلوبولینمی وابسته به جنس) با محدوده سنی ۷ تا ۲۹ سال که به مدت ۳ سال مورد ارزیابی قرار گرفته بودند، صورت گرفت که این بیماران به طور متوسط ۱۰/۵ سال تحت درمان با IVIg بوده‌اند. قبل از درمان با IVIg، ۱۷ بیمار به پنومونی مبتلا شده بودند که در طی پیگیری ۳ ساله که تحت درمان با IVIg بوده‌اند عوارض ریوی در ۸ بیمار دیده شد. در واقع تشخیص زودهنگام هایپوگامماگلوبولینمی اولیه مهم است زیرا درمان با IVIg با دوز مناسب به تهابی یا با همراهی آنتی‌بیوتیک‌ترایی درازمدت ممکن است از گشرش ضایعات ریوی جلوگیری نماید و امید به زندگی با کیفیت مطلوب را در این بیماران افزایش دهد (۱۱).

همچنین در مطالعه جامع خانم Cunningham که تأثیر ایمونوگلوبولین وریدی را در کاهش بروز پنومونی در بیماران مبتلا به CVID نشان می‌دهد، ۵۰ بیمار مبتلا به CVID که به مدت $6/1 \pm 7/3$ سال تحت درمان بوده‌اند وارد مطالعه شدند که ۲۰ نفر از آنها مذکور و ۳۰ نفر مابقی مؤنث بوده‌اند.

درمان داشته‌اند که پس از درمان با ایمونوگلوبولین از این ۲۶ بیمار فقط در ۹ نفر حادفل یک حمله از پنومونی مشاهده گردید.

بحث

بیماری نقص ایمنی اولیه به واسطه اختلالی که در سیستم ایمنی ایجاد شده است پدید می‌آید که با عفونت‌های مکرر باکتریایی تظاهر می‌یابد و در این میان بیماری نقص ایمنی متغیر شایع (CVID) یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نقص ایمنی اولیه‌ای است که بیشتر مبتلابان، با عفونت‌های مکرر دستگاه تنفس مراجعه می‌نمایند و از آنجایی که بیماران مبتلا مستعد عفونت‌های باکتریایی به‌خصوص در دستگاه تنفس تحتانی می‌باشند، اغلب چهار تخریب در دستگاه تنفسی می‌شوند (۱۵).

بیشتر پژوهشکاران به نقش ایمونوگلوبولین‌ها در کاهش مرگ و میر ناشی از این عفونت‌ها در بیماران مبتلا به نقص ایمنی آشنا هستند و بر این باور هستند که تزریقات منظم ایمونوگلوبولین‌ها محافظتی در برابر عفونت‌های مزمن ریوی می‌باشند که اگر این تزریقات همراه با استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها باشد نتیجه بهتری حاصل می‌گردد (۲).

در میان عفونت‌های دستگاه تنفسی پنومونی از شایع‌ترین تظاهرات می‌باشد. در مطالعه‌ای که در ایران بر روی ۱۲۵ بیمار مبتلا به نقص اولیه آنتی‌بادی صورت گرفته است این نتیجه را نشان داد که تقریباً ۸۹/۶٪ بیماران در گیر عفونت‌های تنفسی بوده‌اند که از این میان پنومونی با میزان ۷۲/۸٪ شایع‌ترین عارضه بوده است (۱۶). همچنین مطالعه اخیری که بر روی ۶۴ بیمار مبتلا به CVID در ایران انجام گرفت، نشان داد که ۸۲/۵٪ بیماران قبل از تشخیص، چهار در گیری ریوی به صورت پنومونی شده بودند (۱۷).

در مطالعه دیگری که بر روی ۱۹ بیمار مبتلا به CVID توسط Martinez و همکاران صورت گرفته است نشان داده شد که ۸/۸۴٪ از بیماران حادفل یک حمله پنومونی را قبل از تشخیص تجربه نموده‌اند (۱۸).

پنومونی و دفعات بستری ناشی از آن دارد که این امر مستلزم پیگیری منظم و دقیق بیماران و مصرف مرتب و کامل IVIg می‌باشد. همچنین آموزش به بیماران جهت مصرف صحیح داروها و تهیه مقدار لازم داروی IVIg و مراجعات منظم می‌تواند کمک مؤثری در این ارتباط باشد و امید به زندگی با کیفیت مطلوب را در این بیماران افزایش دهد و این مطلب می‌تواند قابل توجه کلیه پزشکانی که این بیماران را پیگیری می‌نمایند باشد. پیشنهاد می‌شود که دست‌اندرکاران و مسؤولین امور بهداشت و درمان کشور ترتیبی اتخاذ نمایند تا IVIg با شرایط ساده‌تری در اختیار بیماران قرار گیرد و در صورت امکان این گروه از بیماری‌ها جزء بیماری‌های خاص قرار بگیرند.

میزان کاهش بروز پنومونی از ۸۴٪ قبل از دریافت IVIg به ۲۲٪ پس از درمان با IVIg رسیده است (۲۰). به نظر می‌رسد که علت اختلاف بین کاهش بروز پنومونی پس از درمان در مطالعه مذکور و مطالعه صورت گرفته در مرکز طبی کودکان می‌تواند ناشی از مشکلات اقتصادی خانواده‌های مبتلا بان به CVID و عدم آموزش صحیح در مصرف کامل آنتی بیوتیک‌های تجویز شده باشد. چنانچه در پاره‌ای از موارد با توجه به فقر مالی تهیه دوز کامل دارو برای بیماران مقدور نیست.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تشخیص زودرس بیماری CVID و درمان منظم بیماران با ایمونوگلوبولین وریدی نقش مؤثری در کاهش ابتلای به

منابع

- WHO Scientific Committee: Primary immunodeficiency diseases. Report of an IUIS Scientific Committee. International Union of Immunological Societies. Clin Exp Immunol. 118 Suppl 1:1-28, 1999.
- Webster AB. Common variable immunodeficiency. Immunol Allergy Clin North Am. 21(1): 1-22, 2001.
- Renzo MD, Zhou Z, George I, Becker K, Cunningham-Rundles C. Enhanced apoptosis of T-cells in CVID: Role of defective CD28 co-stimulation. Clin Exp Immunology, 120: 503-512, 2000.
- Baumgart KW, Britton WJ, Kemp A, French M, Roberton D. The spectrum of primary immunodeficiency disorders in Australia. J Allergy Clin Immunol. 100(3): 415-23, 1997.
- Kanegane H, Tsukada S, Iwata T, Futani T, Nomura K, Yamamoto J, et al. Detection of Bruton's tyrosin kinase mutation in hypogammaglobulinaemic male registered as common variable immunodeficiency (CVID) in the Japanese Immunodeficiency Registry. Clin Exp Immunol. 120: 512-517, 2000.
- Bousavaros A, Walker WA. Gastroenterologic and liver disorders. In: Immunodeficiency disorders. 4th Edition. W. B Saunders company. PP: 726-727, 1996.
- Spickett GP. Current perspectives on common variable immunodeficiency (CVID). Clin Exp Allergy. 31: 536-542, 2001.
- Schoh H, Sicherer MD, Jerry A, Winkelstein MD. Primary immunodeficiency

- diseases in adult. *JAMA*. 279(1): 58-61, 1998.
9. Cunningham-Rundles C, Bodian C. Common variable immunodeficiency: Clinical and immunologic features of 248 patients. *Clin Immunol*. 92: 34-48, 1999.
 10. Harry W, Shroeder DR. Primary antibody deficiency. In: *Clinical Immunology: Principles and Practice*. Rich Vol. 1. PP: 34/11-34/22, 2001.
 11. Swinberg SK, Wodell RA, Grodofsky MP, Greeng M, Conly ME. Retrospective analysis of the incidence of pulmonary disease in hypogammaglobulinemia. *J Allergy Clin Immunol*. 88: 96-104, 1991.
 12. Berger M. Goals of therapy in antibody deficiency disorders in Australia. *J Allergy Clin Immunol*. 104(5): 911-13, 1999.
 13. Walker J, Qconnell M, Pluss J, Fccp DO. Usual interstitial pneumonitis in a patient with common variable immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol*. 99(6): 847-51, 1997.
 14. Aghamohammadi A, Moin M, Farhoudi A, Pourpak Z, Rezaei N, Abolmaali K, et al. Primary immunodeficiency in Iran: first report of the national registry of PID in children and adults. *J Clin Immunol*. 22(6): 375-380, 2002.
 15. Kainulainen L, Nikolskelainen J, Vuorinen T, Tevola K, Lippo K, Ruuskanen O. Viruses and bacteria in bronchial samples from patients with primary hypogammaglobulinemia. *Am J Respi Crit Care Med*. 159(4): 1199-204, 1999.
 16. Aghamohammadi A, Moin M, Farhoudi A, Pourpak Z, Movahedi M, Rezaei N, et al. The clinical spectrum of respiratory disease in patients with primary antibody deficiencies. *Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology*. 1(3): 135-140, 2000.
 17. Aghamohammadi A, Farhoudi A, Moin M, Pourpak Z, Rezaei N, Abolmaali K, et al. A Single-Center 20- Year Survey of Infectious Complication in 64 Patients with Common Variable Immunodeficiency. *Medical Journal of Islamic Republic of Iran*. 16(3): 123-128, 2002.
 18. Martinez G, Rogas HF, Manzuri N, et al. Respiratory disorders in common variable immunodeficiency. *Respir Med*. 95: 191-5, 2001.
 19. Skull S, Kemp A. Treatment of hypogammaglobulinemia with intravenous immunoglobulin. *Arch Dis Child*. 74: 527-30, 1996.
 20. Busse P, Razvi S, Cunningham-Rundles CH. Efficacy of intravenous immunoglobulin in the prevention of pneumonia in patients with common variable immunodeficiency. *J Allergy Clin Immunol*. 104: 1001-1004, 2002.