

بررسی میزان آنژیوژنیس در مغز استخوان بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوبئیدی قبل و بعد از درمان

بیمارستان شریعتی، ۱۳۸۱-۸۲

دکتر زهره صناعت (فوق تخصص)*، دکتر سیدمحمد توانگر (استادیار)*، دکتر احمد شریف‌تبریزی (پژوهش عمومی)**، دکتر کامران علی‌مقدم (استادیار)، دکتر اردشیر قوام‌زاده (استاد)، دکتر محمد جهانی (دانشیار)*
*بخش خون و انکولوزی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
** مرکز تحقیقات خون، بیمارستان شریعتی

چکیده

مقدمه: بوجود آمدن عروق خونی جدید یکی از علل مهم در رشد سلولهای بد خیم می‌باشد. عوامل موثر در تولید عروق خونی جدید از ساولهای بدخیم و ماکروفاژها و ماست‌سلها و سلول‌های لنفوцит آزاد می‌شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی عروق خونی جدید در بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوبئیدی که تحت درمان قرار گرفته‌اند می‌باشد.

مواد و روشها: بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوبئیدی قبل و در طول درمان و در انتهای درمان تحت بیوپسی مغز استخوان قرار می‌گیرند و سپس با رنگ‌آمیزی اختصاصی فاکتور VIII میزان تغییر در عروق خونی مغز استخوان بررسی می‌شود. بعد از جمع آوری آنالیز تصویری میانگین چگالی عروق نمونه‌ها قبل از درمان و بعداز درمان مقایسه گردیدند.

یافته‌ها: میانگین (Micro vascular density)MVD قبل از درمان در بیماران APL ($6/81 \pm 3/58$) بود. این میانگین بعداز خاتمه درمان به $4/8 \pm 3/06$ ٪ می‌رسید ($P < 0/0001$). در بیماران غیر APL میانگین MVD قبل از درمان $3/38$ و میانگین MVD بعد از درمان $3/6$ بود که تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: به نظر می‌رسد میزان آنژیوژن در بیماران APL در شروع درمان بالاتر از حد طبیعی است. این میزان با درمان آرسنیک کاهش می‌یابد داروهای متداول شیمی درمانی قادر به کاهش آنژیوژن در بیماران غیر APL نبوده‌اند اثر ضد رگزایی داروهای شیمی درمانی در بیماران لوکمی در صورتی قابل توجه خواهد بود که تاثیر بر روی زنده بودن سلولهای آن‌دوتیلیوم وجود داشته باشد در صورتی که صرفاً دارو از طریق کاهش تعداد بلاست عمل کند، ممکن است کاهش رگزایی در مغز استخوان مشاهده نگردد.

مقدمه

نمونه‌های مغز استخوان ۷۰ بیمار AML که در بیمارستان شریعتی در مرکز تحقیقات خون، انکولوژی و پیوند مغز استخوان بستری شده بودند سال ۱۳۸۲-۱۳۸۱ و تحت درمان با آرسنیک تری اکسید ۱۰ میلی گرم در ۵۰۰ میلی لیتر DW5% در عرض ۳-۲ ساعت) و یا رژیم ۳×۷ (سیتارابین ۱۰۰ میلی گرم بر متر مربع بدن و دانوروبیسین ۴۵ میلی گرم بر متر مربع بدن) قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند و به رمیسیون کامل رفته بودند، اسلاید تهیه شده و مطابق روش زیر زنگ آمیزی گردید. با توجه به اینکه در نجات ایمونو-هیستوشیمی نیاز به نمونه‌های حجیم از مغز استخوان بوده نهایتاً ۳۰ بیمار که نمونه‌های قبل و بعد از درمان آنها قابل بررسی بودند انتخاب گردیدند و ایمونو-هیستوشیمی بر روی آنها انجام گرفت. از این تعداد ۱۷ بیمار (M3) و ۱۳ بیمار انواع دیگر AML بودند.

روش انجام ایمونو-هیستوشیمی

بافت به قسمتهای ۳ میکرومتری تقسیم می‌شود و بر روی لام قرار می‌گیرند و سپس به مدت ۳۰ دقیقه در ۳۶ درجه انکوبه می‌گردند. مقاطع با قراردادن در محلول‌های بصورت سریال رقیق شده اتانول و گزیلول تاحدی که به آب مقطمر برسد، dewaxed و dehydrate می‌گردد. سپس تحت تاثیر پروتئاز و تریپسین قرار گرفته و با رقت ۶۰۰/۱ آنتی بادی پلی‌کلونال خرگوشی فاکتور WVF رنگ آمیزی می‌گردد (به مدت ۹۰ دقیقه در حرارت اتفاق قرار می‌گیرد) و نهایتاً بعد از واکنش ایمونو پراکسیداز با هماتوکسیلین counter stain می‌شود. سپس سه قسمت سلولی انتخاب شده و بالنز X20 توسط میکروسکوپ متصل به کامپیوتر بررسی می‌شوند. مقادیر دیزیتالیزه شده و ناحیه عروقی با استفاده از Image analysis system مشخص شده و بدین ترتیب تحلیل می‌گردد، که Pixel های تصویری عروقی به کل Pixel ها به عنوان درصد واسکولاریتی بیان می‌گردد. این کار برای هر سه منطقه تکرار می‌شود و در صورتی لومون عروقی شمرده می‌شود که با رنگ آمیزی WVF رنگ گرفته باشد نمونه‌های BMB بیماران قبل از شروع درمان و بعداز حصول رمیسیون تهیه گردیده بودند. (تعدادی از نمونه‌های روزهای

آنژیوژنریس یا بوجود آمدن عروق خونی جدید علت مهمی جهت رشد و زندگانی سلولهای نومورال می‌باشد (۱). عواملی که باعث آنژیوژنریس می‌شوند از سلولهای تومورال و یا سلولهای با فتهای اطراف مانند ماکروفاز و لنفوسيت‌ها آزاد می‌گردند. در واقع عوامل آزاد شده از این سلولها باعث افزایش رشد سلولهای آندوتیال جدار عروق می‌شوند (۲،۳،۴). آنژیوژنریس نقش مهمی در پیشرفت و بروز متاستاز در تومورهای بافت نرم دارد (۵) هم چنین وجود آنژیوژنریس در گروهی از بیماری‌های خونی بدخیم از جمله مولتی پل میلوم دیده شده است که این افزایش عروق خونی همراه با فعال بودن بیماری است (۶-۷). در لنفوم نان هوچکین B-CELL وجود آنژیوژنریس با stage بیماری ارتباط داشته است (۸). مشاهده شده است که در انواع لوسمی‌های حاد دانسیته و اسکولار مغز استخوان افزایش می‌یابد (۹). همچنین به نظر می‌رسد که بعد از درمان دانسیته عروق مغز استخوان کم شده و یکی از فاکتورهای پرونوستیک در سرنوشت لوسمی حاد میلوئیدی (Acute myloid leukemia) میزان افزایش عروق ریز مغز استخوان می‌باشد. داروی آرسنیک تری اکسید یکی از داروهای جدید دومثر در درمان بیماران مبتلا به لوسمی حاد پرومیلوسیتیک (Acute promyelocytic leukemia) می‌باشد (۱۳). ولی در عین حال داروهای دیگر شیمی درمانی اثر اختصاصی بر روی آندوتیلیوم عروق ندارند بلکه کاهش چگالی عروقی مغز استخوان بعد از درمان با آنها به دلیل کاهش تعداد سلولهای لوسمی در مغز استخوان و در نتیجه کاهش ترشح مواد بیولوژیک تحیریک کننده رشد عروق از سلولهای لوسمی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان آنژیوژنریس در مغز استخوان بیماران مبتلا به لوسمی حاد میلوئیدی فبل و بعد از درمان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

رانشان دادن برابر $57 \pm 4.3\%$ بود (حداقل ۱٪ وحداکثر ۱۰٪). مشاهده شدکه در بیماران APL با محاسبه $R=0.612$ همبستگی داده‌ها مقادیر قبل و بعد از درمان با $P=0.02$ با یکدیگر ارتباط داشتند. یعنی مقادیر قبل از درمان هرچه بالاتر بود میزان کاهش MVD یکسان بوده و میزان MVD بعداز خاتمه درمان متناسب با آن بالاتر بودیا به عبارت دیگر درصد کاهش MVD بادرمان یکسان بوده و MVD نهائی متناسب با MVD اولیه قبل از درمان بود. در بیماران غیر APL میانگین MVD قبل از درمان ۳/۳۸ و میانگین MVD بعد از درمان ۳/۶ بود که تفاوت معنی‌داری بین این دو گروه وجود نداشت.

هیچگونه ارتباط معنی‌داری در هر دو گروه از بیماران بین چگالی عروقی مغز استخوان و تعداد بلاست مغز استخوان و نیز سلولاریتی مغز استخوان وجود نداشت.

بحث

در مطالعات مختلف نقش آنژیوژنر در تومورهای مختلف نشان داده شده است. درمورد بدخیمی‌های خونی نقش آنژیوژنر MVD در بیماری‌های مثل مولتیپل میلوم و لنفوم‌های B-Cell بیان شده است. همچنین مطالعات انجام شده نشان دهنده افزایش MVD در لوسمی‌ها نسبت به گروه کنترل بود و همچنین مشاهده شده که کمترابی و حصول رمیسیون کامل سبب کاهش MVD به سطح نرمال می‌گردد (۱۱، ۱۰، ۹).

به نظر می‌رسد که علت افزایش MVD در لوسمی‌ها ترشح فاکتورهای آنژیوژنری از سلولهای لوسمیک بوده که ترشح آنها سبب ایجاد عروق جدید در مغز استخوان شد و با کاهش تعداد سلولهای بلاست این میزان به حد نرمال می‌سد. در مطالعه ما نشان داده شدکه میزان آنژیوژنر در بیماران AML-M3 در شروع درمان بالاتر از حد طبیعی است و این میزان بادرمان با آرسنیک کاهش می‌یابد که می‌تواند به علت خواص آنتی لوسمیک دارو باشد یعنی کاهش سلولهای نارس سبب کاهش آنژیوژنر گردد. اما مطالعه

۱۰ و ۲۰ نیز مطالعه گردید که با توجه به اینکه تنها از نظر آماری تغییر قابل توجهی بین نمونه‌های روزهای صفر و روز حصول رمیسیون بطور متوسط روز ۳۰ قابل مشاهده بود، لذا تنها این نمونه‌ها بررسی شدند. از این ۳۰ نمونه مربوط به بیماران، بعد از رنگ‌آمیزی عکس گرفته شد. تصاویر مربوطه Image tool digitalize شده و سپس توسط دو نرم افزار NIH Image و J مربوط به NIH آنالیز گردید. روش آنالیز به این ترتیب بودکه ابتدا سه نقطه Hot spot (مناطقی که بیشترین تعداد رگ را داشتند) بر روی هرلام انتخاب شدند. سپس مساحت عروق بر روی هر field محسابه شده و سپس میانگین این سه منطقه انتخاب شده و بر روی هرلام محسابه گردید. عدد نهائی به میزان چگالی عروقی هر نمونه در نظر گرفته شد. همچنین در صد cellularity مغز استخوان و نیز تعداد بلاست‌ها از گذگالی عروقی مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه نتایج میانگین چگالی عروقی قبل و بعداز درمان توسط آزمون t-test با یکدیگر مقایسه گردیدند.

یافته‌ها

در این طرح تعداد ۱۲ بیمار زن و ۱۸ بیمار مرد مورد مطالعه قرار گرفتند. ۱۳ بیمار AML و ۱۷ بیمار APL بودند در کلیه بیماران APL بررسی سیتوژنتیک (t(15;17) مثبت گزارش شده است. در گروه AML inv(16) t(9;22) گزارش شده است. بعداز جمع آوری آنالیز تصویری میانگین چگالی عروق (MVD) و بیماران مقایسه گردیدند. میانگین چگالی عروق قبل از درمان در بیماران APL $6/81 \pm 3/58$ بود. این میانگین بعداز خاتمه درمان به $3/06 \pm 3/48$ می‌رسید ($P<0.0001$) از طرفی در تمامی بیماران به جز دو بیمار کاهش MVD و بعداز درمان قابل مشاهده بود (در ۸۵٪ بیماران کاهش MVD نسبت به قبل از درمان مشاهده شد). همچنین میانگین کاهش میزان MVD در بیمارانی که کاهش MVD

اینکه داروهای متداول شیمی درمانی قادر به کاهش آنژیوژنر در بیماران غیر APL نبوده‌اند را بدین ترتیب میتوان توجیه نمود که اثر ضد رگزایی داروهای شیمی درمانی در بیماران لوسومی در صورتی قابل توجه خواهد بود که تاثیر بر روی زنده بودن سلولهای آندوتلیوم وجود داشته باشد و در صورتی که صرفاً دارو از طریق کاهش تعداد بلاست عمل کند، ممکن است کاهش رگزایی در مغز استخوان مشاهده نگردد.

ما همچنین نشان دادکه میزان کاهش MVD متعاقب درمان با آرسنیک مناسب است با میزان اولیه MVD. لذا محتمل به نظر می‌رسد که اثر آنتی آنژیوژنر آرسنیک در ایجاد پاسخ موثر باشد چون اگر قرار بود که کاهش آنژیوژنر در بیمارانی که به رمیسیون کامل رسیده‌اند ناشی از خواص آنتی لوسومیک دارو باشد می‌باید همه بیماران به سطح ثابتی از MVD می‌رسیدند ولی اینکه میزان کاهش با یک ضریب همسنگی ثابت با میزان اولیه آنژیوژنر ارتباط دارد بیشتر مؤید خواص آنتی آنژیوژنردارو برای کاهش MVD می‌باشد.

منابع

1. Folkman J,Watson k, Ingber D, Hanahan D .Induction of angiogenesis during the transition from hyperplasia to neoplasm.Nature,1989;339-58.
2. Nicosia RF,Tchao R, Leighton J .Interaction between newly formed endothelial channels and carcinoma cells in plasma clot culture.Clin Exp Metastasis.1986;4:91.
3. Hamad J ,Cavanaugh PG,Lotan O,Nicholson G.Separable growth and migration factors for large-cell lymphoma cells secreted by microvascular endothelial cells driven from target organs for metastasis.Br J Cancer. 1992: 66-349.
4. Rak JW,Filmus J,Kerbel RS .Reciprocal paracrine interactions between tumor cells and endothelial cells:the angiogenesis progression hypothesis.Eur J Cancer.1996;2432-2438.
5. Folkman J Tumor angiogenesis. In: Holland JR ,Frei E,Bast R, Kute D.Weichselbaum R, eds. Cancer Medicine.4th ed .Baltimore: Williams & Wilkins:1996:181;204.
6. Vacca A,Ribatti D,Roncali I. et al.Bone marrow angiogenesis and progression in multiple myeloma .Br J haematol.1994;87:503.
7. Vacca A, Ribatti D ,Presta M, et al. Bone marrow neovascularization , plasma cell angiogenic potential , and matrix metalloproteinase-2 secretion parallel progression of human multiple myeloma.Blood. 1999: 93: 309-64.
8. Ribatti D, Vacca A,Nico B, Fanelli M, Roncali L, Dammacco F.Angiogenesis spectrum in the stroma of b-ceel non hodgkins lymphomas .An immunohistochemical and structural study.Eur J Haemato.1996;56-45.
9. Pardo.T, et al. Increased angiogenesis in the bone marrow of patients with acute myeloid leukemia Blood.2000: 95; 2637-2644.
10. Perez -Atayde AR ,Sallan SE ,Tedrow U, Connors S, Allred E ,Folkman J.Spectrum of tumor angiogenesis in the bone marrow of children with acute lymphoblastic leukemia. Am J Pathol.1997: 150-815.
11. Shami PJ Husson JW ,Roogers GM .Evidence of increased angiogenesis in the bone marrow of patients with acute nonlymphocytic leukemia(abstract). Blood. 1998: 92(suppl 1): 512a.
12. Aguayo A,Kantarjian H,Talpaz M, et al. Increased angiogenesis in chronic myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome (abstract) Blood.1998;92(suppl 1):607 a.
13. Tallman.M,Nahban.C, Feasner.J et al. Acute promyelocytic leukemiaEvolving therapeutic strageics. Blood.2002; 99:759-767.
14. Aguayo ,A ,Kantarjian. H,et al. Angiogenesis in acute and chronic leukemias and myelodysplastic syndromes. Blood 2000: 98; 2240-2245.
15. Hussong. Z,Rodgers, G,et al. Evidence of increased angiogenesis in patients with acute myeloid leukemia. Blood 2000: 15; 309-313.