

ارتباط پلیمورفیسم (rs1028181-513T/C) با پره‌اکلامپسی در زنان باردار

چکیده

دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ آنلاین: ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

زمینه و هدف: با وجود سال‌ها پژوهش مداوم، هنوز هم مرگ مادران در اثر پره‌اکلامپسی به عنوان یک تهدید جدی مطرح می‌باشد. محققین بر این باورند که پره‌اکلامپسی یک بیماری چند عاملی است و عوامل خطر متعددی از جمله عوامل ایمونولوژیکی را برای آن پیشنهاد نموده‌اند. بنابراین بررسی رابطه پره‌اکلامپسی با تغییرات ایمونولوژیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نقش عوامل ایمونولوژیک و التهابی در اتیولوژی پره‌اکلامپسی، در تحقیق حاضر ارتباط پلیمورفیسم (rs1028181-513T/C) با بیماری پره‌اکلامپسی مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: این مطالعه مورد-شاهدی از دی ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام شد. ۱۵۰ زن مبتلا به بیماری پره‌اکلامپسی به عنوان مورد و ۱۵۰ زن سالم باردار فاقد هر گونه بیماری، مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر کازرون به عنوان شاهد انتخاب شدند. پس از نمونه‌گیری و استخراج DNA، ژنوتیپ‌های مربوط به پلیمورفیسم اشاره شده با روش Tetra Primer ARMS PCR مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Chi-square test و SPSS software, version 16 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: اختلاف معناداری در فراوانی همه ژنوتیپ‌ها (CC, CT و TT) ($P=0.001$) و هر دو آلل (C و T) ($P=0.002$) در موقعیت پلیمورفیسم (rs1028181-513T/C) بین زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی و زنان باردار سالم مشاهده شد. میان سایر پارامترهای پاراکلینیکی مورد نظر تحقیق با پلیمورفیسم مذکور ارتباط معناداری در گروه بیمار و کنترل دیده نشد.

نتیجه‌گیری: حضور پلیمورفیسم (rs1028181-513T/C) را می‌توان به عنوان عامل پیش‌بینی کننده‌ی ایجاد پره‌اکلامپسی در نظر گرفت.

کلمات کلیدی: ایتلرولوکین، پلیمورفیسم، پره‌اکلامپسی، زنان باردار.

زنب محمودیان، سیروس نعیمی^{*}،
محمد مهدی مغنی باشی، خلیل
خاشعی و رنامخواستی، مرضیه علیپور
گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد
اسلامی، واحد کازرون، کازرون، ایران.

*نویسنده مسئول: کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد
کازرون، دانشکده علوم پایه، گروه ژنتیک.

تلفن: ۰۹۱-۰۹۱۴۲۰۷۱۳۹۱
E-mail: Naeimi801@yahoo.com

مقدمه

فشارخون و دفع پروتئین در ادرار بعد از هفت‌هی بیست بارداری با میزان شیوع متغیر در سرتاسر جهان مشخص می‌شود که این میزان با توجه به مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه بین ۱۶/۷-۱۶/۸٪ در ایران ۷ تا ۱۴٪ گزارش شده است.^{۱-۵} از لحاظ شدت، پره‌اکلامپسی به دو شکل خفیف و شدید تقسیم می‌گردد.

پره‌اکلامپسی (Preeclampsia)، اختلال چندسیستمی مخصوص دوران بارداری و جدی‌ترین مورد مخاطره آمیز بارداری‌های پرخطر، تهدید کننده سلامت زنان باردار است.^{۶-۹} این عارضه با افزایش

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.^{۲۱} بسیاری از محققین معتقدند که بروز پاسخ ایمنی TH₁ طی بارداری از سطح سرمی کاهش یافته‌ی ایترلوکین‌های ضدالتهابی خصوصاً ایترلوکین ۱۹ که قادر است سلول‌های TH₂ را فعال نماید، ناشی می‌شود. تعدادی از مطالعات با توجه به تاثیر چند شکلی‌های ژنتیکی بر فنوتیپ و عملکرد محصول ژن، علت نقص عملکردی یا تغییر سطح سرمی سیتوکاین‌های ضدالتهاب را حضور برخی از پلی‌مورفیسم‌ها در ژن های رمزکننده‌ی آنها بیان کرده‌اند.^{۲۲ و ۲۱}

به عنوان مثال مطالعه‌ای نشان داد که پلی‌مورفیسم پرومومتر ژن ایترلوکین ۱۰ می‌تواند از تنظیم کننده‌های اصلی ژنتیکی اتیولوژی پره‌اکلامپسی باشد.^{۲۳} مطالعه‌ی دیگری نیز ارتباط سطح سرمی افزایش یافته‌ی ایترلوکین هشت به عنوان فاکتور پیش‌التهابی در مبتلایان به -353A/T, -251T/A, -251T/C, +678T/C نشان داد.^{۲۴} همچنین تغییر سطح سرمی ایترلوکین ۱۹ در حضور پلی‌مورفیسم rs2243188 در مبتلایان به بیماری خودایمنی لوپوس اثبات گردیده است.^{۲۵} در این راستا در مطالعه‌ی حاضر نیز ارتباط بین پلی‌مورفیسم (rs1028181) ۵13T/C- ژن رمزکننده‌ی ایترلوکین ۱۹ با بیماری پره‌اکلامپسی در دو گروه بیمار و کنترل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه مورد- شاهدی ۱۵۰ زن باردار مبتلا به بیماری پره‌اکلامپسی که دارای فشارخون سیستولی بیشتر از ۹۰ mmHg یا فشارخون دیاستولی بیشتر از ۶۰ mmHg با دو بار تکرار و حداقل شش ساعت فاصله‌ی زمانی و همچنین پروتئینوری بیشتر از ۰/۳ g در ادرار ۲۴ ساعته یا بیشتر از +۱ در تست نواری ادرار بودند، از بین مراجعین به بیمارستان ولی‌عصر (عج) کازرون برای بررسی‌های ملکولی بیشتر در فاصله‌ی زمانی دی ۱۳۹۵ تا خرداد ۹۶ انتخاب شدند. به منظور انتخاب زنان گروه مورد، ابتدا تمام مراجعین تشخیص داده شده با بیماری پره‌اکلامپسی به عنوان کاندید شرکت در مطالعه انتخاب شدند و پس از بررسی سوابق بالینی، زنانی که سابقه‌ی هرگونه بیماری‌های داخلی داشتند از مطالعه خارج شدند. زنان گروه شاهد (۱۵۰ زن) از بین زنان باردار سالمی که برای انجام معاینات

موارد شدید با علائم بالینی جدی‌تر، پیامدهای مادری و جنینی شدیدتر، احتمال بیشتر تبدیل به اکلامپسی و خطر عود مجدد همراه است.^۶ در حال حاضر آزمایش‌های کلینیکی، بیوفیزیکی و بیوشیمیایی متعددی برای شناسایی زنان در معرض خطر ابتلا به پره‌اکلامپسی وجود دارد که نتایج مطالعات حاکی از ناچیز بودن ارزش پیش‌گویی کنندگی آنها در تشخیص زودرس پره‌اکلامپسی می‌باشد. بنابراین هنوز معیار قابل اعتمادی برای تشخیص زودرس این عارضه وجود ندارد.^۷

محققین بر این باورند که پره‌اکلامپسی یک بیماری چندعاملی است و عوامل خطر متعددی نظری سن پایین یا بالای مادر، دیابت، فشارخون مزمن، فاصله‌ی بین تولد، سابقه‌ی سقط جنین، سابقه ابتلا به پره‌اکلامپسی، افزایش شاخص توده بدنی و عوامل ایمونولوژیکی را برای آن پیشنهاد نموده‌اند.^{۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳} با توجه به توصیف پره‌اکلامپسی به عنوان پاسخ بیش از حد سیستم ایمنی، علی‌رغم بارداری طبیعی که یک حالت پیش‌التهابی است، بررسی رابطه‌ی پره‌اکلامپسی با تغییرات ایمونولوژیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.^{۱۴ و ۱۳}

یکی از تغییرات ایمونولوژیکی که به صورت بالقوه با پره‌اکلامپسی در ارتباط است، بروز پاسخ ایمنی TH₁ به واسطه‌ی برخی از سیتوکاین‌ها (Cytokines) می‌باشد.^{۱۵} سیتوکاین‌ها فاکتورهای مشتق شده از جفت می‌باشند که بر روی عملکرد ایمنی سیستمیک مادر تاثیر می‌گذارند و به دو دسته‌ی سیتوکاین‌های پیش‌التهابی و ضدالتهابی تقسیم می‌شوند. سیتوکاین‌های پیش‌التهابی همچون TNF-α و γ-IFN، از مهم‌ترین آغازکننده‌ها و میانجیگرهای پاسخ ایمنی TH₁ و واکنش‌های التهابی طی بارداری هستند که باعث فعال‌سازی نوتروفیل‌ها شده و متعاقباً آسیب عروقی را به دنبال خواهد داشت.^{۱۶ و ۱۷}


در مقابل، انحراف پاسخ ایمنی از سمت TH₂ به سمت TH₂ برای یک بارداری نرمال و موفق حائز اهمیت شناخته شده است.^{۱۵} در پیشروی به سمت پاسخ ایمنی TH₂، سایتوکاین‌های سرکوبگر التهاب تولید شده توسط جفت نظری ابر خانواده ایترلوکین ۱۰ نقش ایفا می‌کنند.^{۲۰ و ۲۱} اعضای این خانواده عبارتند از ۲۹/۲۰/۲۰/۲۲/۲۶/۲۸/۲۹ IL10/19/20/22/26/28/29 تاکتون نقش آنها به عنوان عوامل ضدالتهابی در بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری‌های پوستی، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های تنفسی

جدول ۲: مشخصات پرایمرهای مورد مطالعه

ژن	نام آغازگر	توالی آغازگر ۵'-۳'	طول
IL-19-513T/C (rs1028181)	Inner Forward primer-102-C	5'-CGT TTA ATC ATA GCT CCT TAC AGC -3'	۲۴
	Inner Reverse primer-102-T	5'-CGT TTA ATC GCT CCT TAC AGT -3'	۲۱
	Outer Forward	5'-ATA TGG ATG CTT CAC ACA GAC C -3'	۲۲
	Outer Reverse	5'- TTC CCT GTA GTC AGG AAG -3'	۱۸

جدول ۳: برنامه دمایی-زمانی PCR جهت تکثیر قطعه -513T/C (rs1028181)

	ردیف			
First denaturation		۹۴°C	۵ min	۱
				سیکل ۱۰
Denaturation		۹۴°C	۴ sec	۲
Annealing		۵۸/۵°C	۳۰ sec	۳
Extension		۷۲°C	۴ sec	۴
				سیکل ۲۰
denaturation		۹۴°C	۴ sec	۵
Annealing		۶۲°C	۳۰ sec	۶
Extension		۷۲°C	۴ sec	۷
Final Extension		۷۲°C	۵ sec	۸



شکل ۱: محصول ARMS-PCR حاصل از تکثیر ژن IL-19-513T/C (rs1028181) (اندازه قطعات تکثیر یافته برای افراد هموژیگوت CC، ۶۳۳ bp، برای افراد هترزیگوت CT، ۶۰۰ bp و برای افراد هموژیگوت TT، ۹۹۰ bp) می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل شده با کمک نرم‌افزار SPSS و Chi-square test گرفت.

جدول ۱: خصوصیات دموگرافیک زنان سالم و بیمار مبتلا به پرهاکلامپسی

خصوصیات	میانگین سن (سال)	میانگین ± انحراف معیار (n=۱۵۰)	کنترل (n=۱۵۰)	بیمار (n=۱۵۰)
شاخص توده	-	۴۸-۱۶	۳۸-۱۶	دامتنه سنی (سال)
بدنی (kg/m ²)	۰/۲۱۴	۲۵/۸۳±۳/۴۷	۲۶/۱۹±۳/۶۰	فشارخون
سیستولی (mmhg)	<۰/۰۰۱	۱۵۱/۸۴±۱۰/۷۸	۱۰۹/۳۷±۱۱/۰۷	فشارخون
دیاستولی (mmhg)	<۰/۰۰۱	۹۴/۹۵±۶/۸۸	۶۴/۸۵±۹/۰۲	دیاستولی (mmhg)

خصوصیات دموگرافیک با مقایسه گروه بیمار و کنترل گزارش شده‌اند (P<۰/۰۵).

معمول به آن بیمارستان مراجعه کرده بودند و از نظر سن بارداری و محل زندگی با گروه بیمار همسان بودند، انتخاب شدند. خصوصیات دموگرافیک جمعیتی زنان بررسی شده در جدول ۱ ارایه شده است. پس از اخذ رضایت‌نامه از افراد مورد مطالعه و پر کردن پرسشنامه، ۵ ml خون محيطی در لوله‌های حاوی EDTA جمع‌آوری گردید. پس از جمع‌آوری کلیه نمونه‌ها، DNA به روش Salting out توسط کیت شرکت GeNet Bio, Korea استخراج گردید. تعیین پلیمورفیسم rs1028181-513T/C با استفاده از روش ARMS-PCR و در حضور چهار آغازگر زیر که براساس توالی ژن مربوطه توسط نرم‌افزارهای ملکولی IBM Oligo, Armonk, BLAST software, version X (IBM Blast, Armonk, NY, USA) و پایگاهداده Oligo NY, USA طراحی و سپس توسط شرکت Macrogen (Macrogen, South Korea) سنتز شد، انجام گرفت.

مخلوط واکنش PCR در حجم نهایی ۲۱/۴۵ μl شامل: ۴/۴۵ μl H₂O (آب مقطر استریل)، ۰/۵ μl (۰/۳۹ pmol) از پرایم کنترل رفت، ۱ μl (۰/۳۹ pmol) از پرایم برگشت و ۱ μl (۰/۳۹ pmol) از هر پرایمر آل C و T، ۱۲/۵ μl Ampliqon, Odense, (۲x PCR Master Mix Red, Mg c12

کنترل و بیمار در فراوانی هر دو آلل C و T در موقعیت پلی مورفیسمی (rs1028181) 513T/C نشان داد ($P=0.002$). نتایج نیز تایید کننده افزایش استعداد ابتلا به پره‌اکلامپسی در نتیجه‌ی حضور آلل T می‌باشدند (جدول ۵).

نتایج بررسی ارتباط پلی مورفیسم (rs1028181) 513T/C با فاکتورهای پاراکلینیکی مورد نظر تحقیق از جمله تشنج، میزان دفع پروتئین در ادرار، ورم بیمار، فشارخون، سن شروع، کم کاری تیروئید، دیابت، سابقه سقط، سابقه ابتلا پیشین، چندقلویی، نخست‌زایی و چند‌زایی نشان داد که رابطه معناداری بین واریانت (rs1028181) 513T/C با پارامتر چند‌زایی بین گروه بیمار و کنترل وجود دارد ($P=0.002$).

این درحالی است که میان سایر پارامترهای دیگر مورد بررسی همچون تشنج ($P=0.062$)، میزان دفع پروتئین در ادرار ($P=0.239$)، ورم بیمار ($P=0.931$)، فشارخون ($P=0.136$)، سن بیمار

(Denmark Denmark زمانی زیر قرار گرفت: محصول PCR، برای آلل C و بر روی ژل آگارز ۲٪ در ولتاژ ۷۸۵ به مدت ۱۰ دقیقه الکتروفوروز UV Transilluminator گردید و باندهای ظاهر شده با استفاده از مشاهده گردیدند (شکل ۱).

یافته‌ها

نتایج حاصل از Chi-square test ارتباط معناداری را بین گروه کنترل و بیمار در فراوانی ژنوتیپ‌های CC، CT و TT در موقعیت پلی مورفیسمی (rs1028181) 513T/C نشان داد ($P=0.001$). نتایج نشان می‌دهد که ژنوتیپ CT استعداد ابتلا به پره‌اکلامپسی را افزایش می‌دهد. (جدول ۴)

نتایج حاصل از Chi-square test ارتباط معناداری را بین گروه

جدول ۴: مقایسه فراوانی ژنوتیپ‌های CC، CT و TT در موقعیت پلی مورفیسم (rs1028181) 513T/C در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی و گروه کنترل.

P	ها	جمع کل نمونه‌ها		IL19rs1028181.513			گروه
		TT	CT	CC			
0.001	کنترل	۱۰۰%-۱۵۰	۶۶%/-۹۹	۶۶%/۳۱-۲۰	۳۳%/۲۰-۱۳		
	بیمار	۱۰۰%-۱۵۰	۳۳%/-۶۸-۴۵	۳۳%/۵۹-۳۹	۳۳%/۲۳-۱۵		
	تعداد کل نمونه‌ها	۱۰۰%-۳۰۰	۳۳%/-۴۳-۱۴	۳۰%/-۹۰	۳۳%/۴۳-۱۴		
		مقایسه TT با		مقایسه CT با		گروه	
		P		P		P	
		0/۱۳۲		0/۰۰۰۱۴۵		OR	
		1/۶۷۴		۲/۷۷۱		CI ۹۵٪	
		۳%/-۸۵۳-۲۸۵		۱/۴-۶۲۶/۷۲۳		مقایسه گروه بیمار و کنترل با	

confidence interval (CI) و Odds Ratio (OR). Chi-square test مقایسه گروه بیمار و کنترل با

جدول ۵: مقایسه فراوانی آلل‌های C و T در موقعیت پلی مورفیسم (rs1028181) 513T/C در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی و گروه کنترل.

CI 95٪	OR	P	ها	IL19rs1028181.513			گروه
				T	C		
کنترل	بیمار	0.002	۱۰۰%-۳۰۰	۳۳%/-۲۲۹-۷۶	۶۶%/-۷۱-۲۳		
			۲۱۶/۱-۴۸۱/۲	۱/۷۷۷	۶۵%/-۱۹۵	۳۵%/-۱۰۵	
			۱۰۰%-۳۰۰	۶۶%/-۴۲۴-۷۰	۳۳%/-۱۷۶-۲۹		
تعداد کل نمونه‌ها		مقایسه گروه بیمار و کنترل با		مقایسه CI 95٪			

confidence interval (CI) و Odds Ratio (OR). Chi-square test مقایسه گروه بیمار و کنترل با

جدول ۶: بررسی ارتباط پلیمورفیسم (rs1028181) با فاکتورهای پاراکلینیکی تشنج، میزان دفع پروتئین در ادرار، ورم بیمار، فشارخون، سن شروع، کم کاری تیروئید در بیماران مبتلا به پرده‌اکلامپسی و گروه کنترل.

P	ژنتیپ‌ها			جمع کل نمونه‌ها	ویژگی‌ها
	(تعداد-درصد)	(تعداد-درصد)	(تعداد-درصد)		
	TT	CT	CC		
0.062	۱-۱۰۰٪	۰-۰٪	۰-۰٪	۱-۱۰۰٪	تشنج
	۱۴۹-۱۰۰٪	۶٪/۶۸-۴۵	۶٪/۵۹-۳۹	۸٪/۲۲-۱۴	دارد
	۱۵۰-۱۰۰٪	۶٪/۶۸-۴۵	۳٪/۵۹-۳۹	۳٪/۲۳-۱۵	ندارد
تعداد کل نمونه‌ها					دفع پروتئین در ادرار
0.239	۵۳-۱۰۰٪	۳٪/۲۴-۴۵	۷٪/۲۰-۳۷	۹-۱۷٪	دارد
	۱۸-۱۰۰٪	۹-۵٪	۹٪/۷-۳۸	۱٪/۲-۱۱	تریس
	۴۶-۱۰۰٪	۲٪/۲۴-۵۲	۶٪/۱۵-۳۲	۲٪/۷-۱۵	+۱
0.931	۱۵-۱۰۰٪	۳٪/۸-۵۳	۶-۴٪	۷٪/۱-۶	+۲
	۱۴-۱۰۰٪	۳٪/۲-۱۴	۴٪/۱۰-۷۱	۳٪/۲-۱۴	+۳
	۴-۱۰۰٪	۱-۲۵٪	۱-۲۵٪	۲-۵۰٪	+۴
تعداد کل نمونه‌ها					میزان ورم بیمار
0.136	۲۳-۱۰۰٪	۱٪/۹-۳۹	۸٪/۱۱-۴۷	۳-۱۳٪	دارد
	۹۱-۱۰۰٪	۲٪/۴۲-۴۶	۴٪/۳۴-۳۷	۵٪/۱۵-۱۶	+۱
	۲۵-۱۰۰٪	۱۱-۴٪	۱۱-۴٪	۳-۱۲٪	+۲
0.157	۱۱-۱۰۰٪	۵٪/۶-۵۴	۳٪/۳-۲۷	۲٪/۲-۱۸	+۳
	۱۵۰-۱۰۰٪	۳٪/۶۸-۴۵	۳٪/۵۹-۳۹	۳٪/۲۳-۱۵	تعداد کل نمونه‌ها
	فشارخون				
0.207	۱۱۶-۱۰۰٪	۹٪/۵۹-۵۰	۳٪/۴۱-۳۵	۸٪/۱۶-۱۳	فشارخون خفیف
	۲۶-۱۰۰٪	۹٪/۷-۲۶	۱۳-۵۰٪	۱٪/۶-۲۳	فشارخون متوسط
	۸-۱۰۰٪	۲-۲۵٪	۵٪/۵-۶۲	۵٪/۱-۱۲	فشارخون شدید
تعداد کل نمونه‌ها					سن شروع بیماری
0.157	۱۰-۱۰۰٪	۵-۵۰٪	۳-۳۰٪	۲-۲۰٪	>۲۰ سال
	۱۰۹-۱۰۰٪	۹٪/۵۰-۴۵	۶٪/۴۱-۳۷	۱۸٪/۱۶-۵	۳۵-۲۰ سال
	۳۱-۱۰۰٪	۹٪/۱۳-۴۱	۴٪/۱۵-۴۸	۷٪/۳-۹	۳۵ سال
تعداد کل نمونه‌ها					کم کاری تیروئید
0.157	۱۷-۱۰۰٪	۱٪/۸-۴۷	۵٪/۴-۲۳	۴٪/۵-۲۹	دارد
	۱۳۳-۱۰۰٪	۱٪/۶۰-۴۵	۴٪/۵۵-۴۱	۵٪/۱۸-۱۳	ندارد
	۱۵۰-۱۰۰٪	۳٪/۶۸-۴۵	۳٪/۵۹-۳۹	۳٪/۲۳-۱۵	تعداد کل نمونه‌ها

مقایسه‌ی گروه بیمار و کنترل با $(P<0.05)$ Chi-square test

جدول ۷: بررسی ارتباط پلی مورفیسم (rs1028181 ۵۱۳T/C) با فاکتورهای پاراکلینیکی دیابت، سابقه سقط، سابقه ابتلای پیشین، چندقلوبی، نخست‌زایی و چندزایی در بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی و گروه کنترل.

P	ژنتیپ‌ها			جمع کل نمونه‌ها	ویژگی‌ها
	(تعداد-درصد)	(تعداد-درصد)	(تعداد-درصد)		
۰/۵۴۱	TT ۹-۱۰۰٪	۶%/۵-۵۵	۲%/۲-۲۲	۲%/۲-۲۲	دیابت
	CT ۱۰۰-۱۴۱٪	۷%/۶۳-۴۴	۴%/۵۷-۴۰	۹%/۲۱-۱۴	دارد
	CC ۱۰۰-۱۵۰٪	۳%/۶۸-۴۵	۳%/۵۹-۳۹	۳%/۲۳-۱۵	ندارد
تعداد کل نمونه‌ها					تعداد کل نمونه‌ها
سابقه سقط					
۰/۷۲۹	۳۰-۱۰۰٪	۳%/۱۳-۴۳	۷%/۱۱-۳۶	۶-۲۰٪	دارد
	۱۲۰-۱۰۰٪	۸%/۵۵-۴۵	۴۸-۴۰٪	۲%/۱۷-۱۴	ندارد
	۱۵۰-۱۰۰٪	۳%/۶۸-۴۵	۳%/۵۹-۳۹	۳%/۲۳-۱۵	تعداد کل نمونه‌ها
سابقه پیشین ابتلا					تعداد کل نمونه‌ها
۰/۶۶۲	۱۳-۱۰۰٪	۲%/۶-۴۶	۸%/۴-۳۰	۱٪/۳-۲۳	دارد
	۱۳۷-۱۰۰٪۱	۳%/۶۲-۴۵	۱٪/۵۵-۴۰	۶٪/۲۰-۱۴	ندارد
	۱۵۰-۱۰۰٪	۳%/۶۸-۴۵	۳%/۵۹-۳۹	۳%/۲۳-۱۵	تعداد کل نمونه‌ها
چندقلوبی					تعداد کل نمونه‌ها
۰/۳۳۸	۱۴۴-۱۰۰٪	۱٪/۶۵-۴۵	۳٪/۵۸-۴۰	۶٪/۲۱-۱۴	ندارد
	۶-۱۰۰٪	۳-۵۰٪	۷٪/۱-۱۶	۳٪/۲-۳۳	دارد
	۱۵۰-۱۰۰٪	۳%/۶۸-۴۵	۳%/۵۹-۳۹	۳%/۲۳-۱۵	تعداد کل نمونه‌ها
نخست‌زایی					تعداد کل نمونه‌ها
۰/۱۵۳	۷۴-۱۰۰٪	۸۱٪/۴۵-۶۰	۳۲٪/۱۸-۲۴	۸۶٪/۱۱-۱۴	زن نخست‌زایی کنترل
	۶۳-۱۰۰٪	۴۴٪/۲۸-۴۴	۵٪/۲۲-۳۶	۴٪/۱۲-۱۹	زن نخست‌زایی بیمار
	۱۳۷-۱۰۰٪	۲۸٪/۷۳-۵۳	۹۲٪/۴۱-۲۹	۷۸٪/۲۳-۱۶	تعداد کل نمونه‌ها
چندزایی					تعداد کل نمونه‌ها
۰/۰۰۲	۷۶-۱۰۰٪	۵٪/۵۴-۷۱	۱۰٪/۱۳-۱۷	۸۴٪/۹-۱۱	زن چندزایی کنترل
	۸۷-۱۰۰٪	۹٪/۴۰-۴۵	۲٪/۳۶-۴۱	۶٪/۱۱-۱۲	زن چندزایی بیمار
	۱۶۳-۱۰۰٪	۶۶٪/۹۴-۵۷	۶٪/۴۹-۳۰	۲۶٪/۲۰-۱۲	تعداد کل نمونه‌ها

مقایسه‌ی گروه بیمار و کنترل با ($P<0.05$) Chi-square test.

همیت است، کاملاً پذیرفته شده است و همانکون محققین معتقدند بروز پره‌اکلامپسی با پاسخ ایمنی TH_1 مرتبط می‌باشد.^{۲۸} اعضای ابر خانواده ایترولوکین ۱۰، به عنوان سیتوکاین‌های ایفاکننده‌ی نقش در بارداری موفق دارای اثر بازدارندگی بر پاسخ ایمنی TH_1 می‌باشند، طوری که محققین اعلام داشته‌اند، سطح سرمی این سیتوکاین‌ها در مبتلایان به پره‌اکلامپسی کاهش می‌یابد.^{۲۹} برخی مطالعات علت این کاهش را حضور پلی مورفیسم‌هایی در ژن رمزکننده‌ی سیتوکاین‌ها دانسته‌اند. برای مثال تغییرات پلی مورفیسمی سه موقعیت $\text{A}^{+0.82}$ ،

$\text{B}^{+0.73}$ و $\text{C}^{+0.73}$ در گروه بیمار و کنترل دیده نشد. (جدول ۶ و ۷).

بحث

براساس تحقیقات صورت گرفته، فرضیه‌ای که بیان می‌دارد انحراف به سمت پاسخ ایمنی TH_2 برای یک بارداری موفق حاصل

چندقلویی، نخست‌زایی و چندزایی بررسی شد که میان هیچکدام از پارامترهای مورد نظر تحقیق با پلی‌مورفیسم مذکور ارتباط معناداری در گروه بیمار و کنترل دیده نشد. به طور مشابه ارتباط معناداری بین ژنتیپ پرومومتر ژن ایترولوکین ۱۰ با فاکتورهای خطر پره‌اکلامپسی در مطالعه دیگری نیز مشاهده نشده است.^{۲۵}

اما از آنجایی که بروز پره‌اکلامپسی به احتمال زیاد نتیجه‌ی تداخل عمل چندین ژن پلی‌مورفیک می‌باشد، عدم وجود ارتباط معنادار بین یک پلی‌مورفیسم ژنی با فاکتورهای خطر بیماری دور از انتظار نخواهد بود، بنابراین بهتر است جهت دستیابی به ارزیابی مطمئن‌تر وضعیت پلی‌مورفیسم در ژن‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.^{۳۶}

- با توجه به معنادار بودن ارتباط بین پلی‌مورفیسم 513T/C و بروز پره‌اکلامپسی که تاکید‌کننده نقش زمینه‌ی ژنتیکی در بروز این بیماری است، می‌توان حضور این پلی‌مورفیسم را به عنوان عامل پیش‌بینی کننده‌ی ایجاد پره‌اکلامپسی در نظر گرفت و نتیجه گرفت که مارکر ژنتیکی چندشکلی، استراتژی‌های پیشگویی کننده‌ی مناسبی برای تشخیص زودرس پره‌اکلامپسی در هفت‌های پیش از هفته بیست بارداری می‌باشد.

سپاسگزاری: این مقاله حاصل پایان‌نامه تحت عنوان ارتباط پلی‌مورفیسم 513T/C (rs1028181- ژن IL-19) با پره‌اکلامپسی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر کازرون در سال ۱۳۹۶ در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۶ و کد IR.IAU.KAU.REC.1398.004 می‌باشد که با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون انجام شده است.

۸۱۹-۵۹۲- و شناسایی شده در پرومومتر ژن IL-10 با تولید نامنظم IL-10 و شروع و شدت پره‌اکلامپسی مرتبط داشته شده‌اند.^{۳۷} در این مطالعه نیز ارتباط حضور پلی‌مورفیسم (rs1028181) در ژن 513T/C با بیماری پره‌اکلامپسی در دو گروه بیمار و کنترل مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج اختلاف معناداری را در فراوانی ژنوتیپ‌های CC و TT و فراوانی هر دو آلل C و T در موقعیت پلی‌مورفیسم (rs1028181)- ژن رمزکننده IL-19 بین زنان باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی و زنان باردار سالم نشان داد.

طی این پژوهش مشخص شد که داشتن ژنوتیپ CT و حضور آلل T در این موقعیت، استعداد ابتلا به پره‌اکلامپسی را افزایش می‌دهد. در مطالعه‌ای نشان داده شده است که حضور نوکلئوتید G در موقعیت ۱۰۸۲- ژن ایترولوکین ۱۰ مبتلایان به پره‌اکلامپسی باعث کاهش سطح سرمی آن می‌شود.^{۳۸}

به طور مشابه ارتباط بین چندشکلی‌های ژن‌های رمزکننده‌ی ابر خانواده‌ی ایترولوکین ۱۰ با سطح سرمی کاهش یافته‌ی این سیتوکاین ها در مبتلایان به آلرژی اثبات گردیده است.^{۳۹}

همچنین نشان داده شده است که حضور پلی‌مورفیسم‌های rs153109 و rs17855750 در ژن رمزکننده IL-27 استعداد ابتلا به پره‌اکلامپسی را افزایش می‌دهند.^{۴۰}

در مطالعه‌ی حاضر نیز ارتباط این پلی‌مورفیسم با فاکتورهای نظیر تشنج، میزان دفع پرتوین در ادرار، ورم بیمار، فشارخون، سن شروع، کم کاری تیرویید، دیابت، سابقه‌ی سقط، سابقه‌ی ابتلای پیشین،

References

- Muchemi OM, Gichogo AW. Maternal mortality in central province, Kenya, 2009-2010. *Pan Afr Med J* 2014;17(1):201
- Sharemi SH, Milani F, Zahiri Z, Zendedel M, Salamat F, Rafipour B, et al. Comparison of pre-eclampsia risk factors regarding to its severity in pregnant women referred to Alzahra Hospital of Rasht, Iran, 2012. *Iran J Obstet Gynecol Infertil* 2013;16(69):1-8. (Persian)
- Duley L, Meher S, Abalos E. Management of pre-eclampsia. *BMJ* 2006;332(7539):463-8.
- Reyes LM, García RG, Ruiz SL, Camacho PA, Ospina MB, Aroca G, et al. Risk factors for preeclampsia in women from Colombia: a case-control study. *PLoS one* 2012;7(7):e41622.
- Alahyari E, Rahimi Foroushani A, Zeraati H, Mohammad K, Taghizadeh Z. A. Predictive Model for the Diagnosis of Preeclampsia. *J Reprod Infertil* 2010; 10(4): 329.
- Lawlor D.A, Morton S. M, Nitsch D, Leon D. A. Association between childhood and adulthood socioeconomic position and pregnancy induced hypertension: Results from the Aberdeen children of the 1950s cohort study . *J Epidemiol Community Health* 2005; 59(1): 49-55.
- Taghizadeh Z, Rezaei Pour A, Kazemnejad A, Golboni F. Effect of Positive Predictive Value of Serum Hematocrit Levels on Early Detection of Preeclampsia. *Hayat* 2009;15(2):39-45.

8. Trogstad L, Magnus P, Stoltenberg C. Pre-eclampsia: Risk factors and causal models. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2011;25(3):329-42.
9. Shen M, Smith GN, Rodger M, White RR, Walker MC, Wen SW. Comparison of risk factors and outcomes of gestational hypertension and pre-eclampsia. *PloS one* 2017;12(4):e0175914.
10. Khalil MM, Alzahra E. Fetal gender and pregnancy outcomes in Libya: a retrospective study. *Libyan J Med* 2013;8(1).
11. Negro A, Delaruelle Z, Ivanova T, Khan S, Ornello R, Raffaelli B, et al. Headache and pregnancy: a systematic review. *J Headache Pain* 2017;18(1):1-20.
12. Burgess A, Johnson TS, Simanek A, Bell T, Founds S. Maternal ABO blood type and factors associated with preeclampsia subtype. *Biol Res Nurs* 2019;21(3):264-71.
13. Amaral LM, Wallace K, Owens M, LaMarca B. Pathophysiology and current clinical management of preeclampsia. *Curr Hypertens Rep* 2017;19(8):1-6.
14. Regal JF, Burwick RM, Fleming SD. The complement system and preeclampsia. *Curr Hypertens Rep* 2017;19(11):1-12.
15. Moore KW, de Waal Malefyt R, Coffman RL, O'Garra A. Interleukin-10 and the interleukin-10 receptor. *Annu Rev Immunol* 2001;19(1):683-765.
16. Mahnam K, Payab N. Proactive cytokines and their containment methods. *J Biosaf* 2016;9(2):74-87.
17. Ragupathy R, Al-Azemi M, Azizieh F. Intrauterine growth restriction: cytokine profiles of trophoblast antigen-stimulated maternal lymphocytes. *Clin Develop Immunol* 2012;2012.
18. Conti P, Kempuraj D, Frydas S, Kandere K, Boucher W, Letourneau R, et al. IL-10 subfamily members: IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 and IL-26. *Immunol Lett* 2003;88(3):171-4.
19. Fickenscher H, Hör S, Küpers H, Knappe A, Wittmann S, Sticht H. The interleukin-10 family of cytokines. *Trends Immunol* 2002;23(2):89-96.
20. Morel F, Boniface K, Guignouard E, Pedretti N, Garcia M, Delwail A, et al. 104 A role for Th17-Derived IL-22 in Psoriatic Skin Inflammation. *Cytokine* 2007;1(39):28-9.
21. Commins S, Steinke JW, Borish L. The Extended IL-10 Superfamily: IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, IL-28, and IL-29. *J Allergy Clin Immunol* 2008;121(5):1108-11.
22. Hsing C-H, Hsieh M-Y, Chen W-Y, So EC, Cheng B-C, Chang M-S. Induction of interleukin-19 and interleukin-22 after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass. *Ann Thorac Surg* 2006;81(6):2196-201.
23. Huang F, Wachi S, Thai P, Loukoianov A, Tan KH, Forteza RM, et al. Potentiation of IL-19 expression in airway epithelia by IL-17A and IL-4/IL-13: important implications in asthma. *J Allergy Clin Immunol* 2008;121(6):1415-21. e3.
24. Yilmaz V, Yentür SP, Saruhan-Direskeneli G. IL-12 and IL-10 polymorphisms and their effects on cytokine production. *Cytokine* 2005;30(4):188-94.
25. Sowmya S, Ramaiah A, Sunitha T, Nallari P, Jyothi A, Venkateshwari A. Role of IL-10-819 (t/c) promoter polymorphism in preeclampsia. *Inflammation* 2014;37(4):1022-7.
26. Sun L, Mao D, Cai Y, Tan W, Hao Y, Li L, et al. Association between higher expression of interleukin-8 (IL-8) and haplotype-353A/- 251A/+ 678T of IL-8 gene with preeclampsia: A case-control study. *Medicine* 2016;95(52).
27. Lin J, Qin H, Wang Y, Liang J, Xu J, Jh X. Analysis of interleukin 19 serum levels and single nucleotide polymorphisms in systemic lupus erythematosus. *Genet Mol Res* 2016;15(2).
28. Moore KW, de Waal Malefyt R, Coffman RL, O'Garra A. Interleukin-10 and the interleukin-10 receptor. *Ann Rev Immunol* 2001;19(1):683-765.
29. Howell WM, Rose-Zerilli MJ. Cytokine gene polymorphisms, cancer susceptibility, and prognosis. *J Nutr* 2007;137(1):194S-9S.
30. Schneider BG, Camargo MC, Ryckman KK, Sicinschi LA, Piazuelo MB, Zabaleta J, et al. Cytokine polymorphisms and gastric cancer risk: an evolving view. *Cancer Biol Ther* 2008;7(2):157-62.
31. Westendorp RG, Langermans JA, Huizinga TW, Elouali AH, Verweij CL, Boomsma DI, et al. Genetic influence on cytokine production and fatal meningococcal disease. *Lancet* 1997;349(9046):170-3.
32. Kamali-Sarvestani E, Kiani S, Gharezi-Fard B, Robati M. Association study of IL-10 and IFN-γ gene polymorphisms in Iranian women with preeclampsia. *J Reprod Immunol* 2006;72(1-2):118-26.
33. Chen T-K, Lee J-H, Yu H-H, Yang Y-H, Wang L-C, Lin Y-T, et al. Association between human IL-10 gene polymorphisms and serum IL-10 level in patients with food allergy. *J Formos Med Assoc* 2012;111(12):686-92.
34. Chen P, Gong Y, Pu Y, Wang Y, Zhou B, Song Y, et al. Association between polymorphisms in IL-27 gene and pre-eclampsia. *Placenta* 2016;37:61-4.
35. De Groot C, Jansen M, Bertina R, Schonkeren J, Helmerhorst F, Huizinga T. Interleukin 10-2849AA genotype protects against pre-eclampsia. *Genes Immun* 2004;5(4):313-4.
36. Redman C, Jacobson S, Russell R. Hypertension in pregnancy. de Swiet's Medical Disorders in Obstetric Practice. 2010:153-81.

Association between IL-19 gene (-513T/C (rs1028181)) polymorphism with preeclampsia in pregnant women

Abstract

Received: 11 Dec. 2020 Revised: 18 Dec. 2020 Accepted: 13 Mar. 2021 Available online: 21 Mar. 2021

Zeynab Mahmoodian M.Sc.
Siro Naeimi Ph.D.*
Mohammad Mahdi Moghanibashi
Ph.D.
Khalil Khashei Varnamkhasti
Ph.D.
Marzieh Alipour Ph.D.

Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences, Kazerun branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.

Background: Despite years of continuous research, maternal mortality due to preeclampsia is still a serious threat. Researchers believe that preeclampsia is a multifactorial disease and proposed many risk factors including immunological factors for it. Given the description of preeclampsia as an excessive response of the immune system, the relationship between preeclampsia and immunological changes is of particular importance. Genetic polymorphisms are considered to be one of the causes of immunological defects. Due to the role of immunologic and inflammatory factors in the etiology of preeclampsia, in the present study, the association of rs1028181-513T/C polymorphism of interleukin 19 gene with preeclampsia in the patient and control groups who were referred to Valiasr hospital in Kazerun, was compared.

Methods: The present case-control study was conducted at Islamic Azad University of Kazerun from December 2016 to May 2017. 150 preeclampsia patients and 150 healthy pregnant women who were referred to Valiasr hospital in Kazerun, were enrolled. Genotypes of participants for the -513T/C (rs1028181) variant were determined by the Tetra Primer ARMS-PCR method. SPSS software and Chi-square statistical test were used for data analysis.

Results: In the position of the -513T/C (rs1028181) polymorphism, a significant difference in frequency of all genotypes (CC, CT and TT) ($P=0.001$) and both alleles (C and T) ($P=0.002$) between preeclampsia pregnant women and healthy pregnant women was observed. There was no significant relationship between the other parameters of the study with the mentioned polymorphism in the patient and control groups.

Conclusion: Due to the significant relationship between (rs1028181) -513T/C polymorphism and the occurrence of preeclampsia, which emphasizes the role of genetic predisposition in the development of preeclampsia disease, the presence of this polymorphism can be considered as a predictor of preeclampsia and concluded that polymorphic genetic markers are good predictive strategies for early detection of preeclampsia before the twentieth week of pregnancy.

Keywords: interleukin 19, polymorphism, preeclampsia, pregnant women.

*Corresponding author: Department of Genetics, Faculty of Basic Sciences, Kazerun branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
Tel: +98-91-71391420
E-mail: Naeimi801@yahoo.com