

بررسی صحت علایم بالینی در تشخیص ضایعات کترالندیکه پونکسیون لومبر در بیماران مشکوک به منزیت حاد

دکتر مهرناز رسولی نژاد، دکتر بهزاد محسن پور، دکتر محبوه حاجی عبدالباقي
گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: تشخیص منزیت حاد باکتریال براساس آزمایش مایع مغزی نخاعی است که با پونکسیون لومبر بدست می‌آید. قبل از انجام پونکسیون لومبر باید ضایعات مغزی که اثر فشاری دارند رد شوند. برای نیل به این مقصود معاینات نوروولوژیک و سی‌تی اسکن مغز روش‌های مطرح هستند. این مطالعه جهت بررسی ارزشمندی معاینات بالینی و نوروولوژیک در تشخیص ضایعات مغزی در بیماران مشکوک به منزیت حاد که منع برای پونکسیون لومبر محسوب می‌گردد طراحی شده است.

مواد و روشها: ۱۰۰ بیمار مشکوک به منزیت حاد تحت معاینات بالینی و نوروولوژیک قرار گرفته و سی‌تی اسکن مغز برای آنها صورت گرفت. سپس یافته‌های بالینی بیماران با یافته‌های سی‌تی اسکن مورد مقایسه قرار گرفت و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت علایم بالینی محاسبه گردید.

یافته‌ها: ۷۳٪ بیماران مرد و ۲۷٪ زن بودند. بیشترین بیماران در سنین ۲۲-۳۱ سال (۲۵٪) قرار داشتند. از کل بیماران ۳۴٪ منزیت داشتند. ۲۲٪ از بیماران دچار ضایعه مغزی با اثر فشاری بودند. از کل بیماران ۶۹٪ حداقل یک علامت نوروولوژیک داشتند. بطور کلی حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت علایم بالینی در تشخیص ضایعات کترالندیکه پونکسیون لومبر به ترتیب ۹۰/۹٪، ۷۳/۱٪، ۲۸/۹٪ و ۴۹٪ می‌باشد.

نتیجه گیری و توصیه‌ها: با توجه به یافته‌های این مطالعه با استفاده از معاینات بالینی، علایم و معاینه فوندوسکوپی (در بیماران مشکوک به منزیت حاد) می‌توان بدون استفاده از سی‌تی اسکن مغز پونکسیون لومبر انجام داد.

هدف این مطالعه بررسی صحت علایم بالینی در تشخیص ضایعات کترالندریکه پونکسیون لومبر در بیماران مشکوک به منژیت حاد می‌باشد تا بدین وسیله مشخص نماییم که حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی علایم بالینی و معاینات نورولوژیک در این مورد چه میزان می‌باشد.

مواد و روش‌ها

بیماران:

در این مطالعه ۱۰۰ بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. سن بیماران شرکت داده شده در مطالعه بالای ۱۲ سال بود. تمام بیماران با شک به منژیت حاد در بیمارستان بستری و مورد مطالعه قرار گرفتند. مکان مطالعه مجتمع بیمارستانی امام خمینی و زمان آن بین سال‌های ۱۳۸۱-۸۲ بود. برای هر ۱۰۰ مورد بیمار با تشخیص پزشک معالج وی قبل از انجام پونکسیون لومبر سی‌تی اسکن از مغز انجام شده بود. معیارهای ورود بیماران سن بالای ۱۲ سال، انجام سی‌تی اسکن مغز و شک به منژیت حاد بود. معیار exclusion بیماران، گذشت بیش از ۴۸ ساعت از شروع علایم، سن زیر ۱۲ سال.

جمع آوری داده‌ها:

شرح حال و معاینه نورولوژیک تمام بیماران در پرسشنامه‌ای که قبلاً تهیه شده بود ثبت گردید. پرسشنامه فوق حاوی سن بیمار، جنس و وجود علایم ذیل بود: سردرد، تب، ردور، کرینگ، بروزدینسکی، نوع منژیت (باکتریال و یا آسپیتیک) که براساس اسپیر و آنالیز مایع مغزی- نخاعی تقسیم‌بندی شده بود، سطح هوشیاری (+0 - alert، -1 - obtundation or not alert)، -2 partial gaze (unresponsive)، پاسخ به سوالات (-0 - پاسخ به دو سوال صحیح، -1 - پاسخ به یک سوال صحیح، -2 - هیچ پاسخ صحیح)، اجرای دستورات (-0 - انجام ۲ دستور، -1 - انجام یک دستور، -2 - انجام هیچ دستور)، gaze normal -1 - partial gaze -2 pulsy)، میدان بینایی (-0 - نرمال، -1

مقدمه

منژیت حاد از بیماری‌های خطربناک و یکی از مهم‌ترین اورژانس‌های طب عقونی می‌باشد. مهم‌ترین عوامل در بروز نتیجه درمانی مناسب عبارتند از: تشخیص و درمان صحیح و سریع. بهترین روش تشخیصی برای این بیماری انجام پونکسیون لومبر و آنالیز، اسپیر و کشت مایع مغزی- نخاعی است (۱،۲،۳).

مدت کوتاهی پس از معرفی پونکسیون لومبر در سال ۱۸۹۱، عوارض آن نظری هرنیاسیون مغزی مشخص گردید. با اختراع سی‌تی اسکن این امید مطرح گردید که بتوان با استفاده از این ابزار احتمال بروز هرنیاسیون بدنبال پونکسیون لومبر را پیشگویی کرد. در دسترس بودن سی‌تی اسکن باعث شد که قبل از انجام هر پونکسیون لومبر برای بیماران سی‌تی اسکن مغز انجام گیرد و حتی بعضی از مؤلفین اظهار کردند که پونکسیون لومبر در بیماران مشکوک به منژیت بدون سی‌تی اسکن نباید صورت گیرد. بدنبال این ایده موارد بسیار زیادی از سی‌تی اسکن نرمال در بیماران مشابه دیده شد و این سؤال مطرح گردید که آیا انجام سی‌تی اسکن قبل از پونکسیون لومبر در تمام بیماران مشکوک به منژیت لازم است یا خیر؟ (۴). در صورتی که در مغز بیمار ضایعاتی وجود داشته باشد که باعث اثر فشاری شده و فشار داخل جمجمه را بالا ببرد انجام این اقدام می‌تواند با عوارض خطربناک و کشنده از جمله هرنیاسیون مغزی همراه باشد (۵). بروز هرنیاسیون مغزی با لیک مداوم مایع مغزی- نخاعی تشدید شده که برای درمان آن می‌توان از blood patch استفاده کرد (۶). هرنیاسیون خود را با دیلاتاسیون مردمک بدلیل فشار بر روی عصب ۳، اختلال هوشیاری، آزیتابیون، اختلال تست کالریک نشان می‌دهد (۵). بنابراین وجود یا عدم وجود ضایعات فوق را باستی قبل از انجام پونکسیون لومبر مشخص نمود. برای نیل به این هدف دو راه وجود دارد:

- (۱) انجام معاینات بالینی و نورولوژیک
- (۲) انجام مطالعه تصویربرداری نظری سی‌تی اسکن (۷).

۴۰۰۵ و حداقل سن ۱۳ سال و حداقل آن ۹۹ سال با انحراف معیار ۲۰/۹۶ بود.

جدول شماره ۲- شیوع سنی در بیماران مشکوک به

منزیت در مجتمع بیمارستانی امام

درصد	تعداد	گروه سنی
%۲۰	۲۰	۱۲-۲۱
%۲۵	۲۵	۲۲-۳۱
%۱۹	۱۹	۳۲-۴۱
%۷	۷	۴۲-۵۱
%۷	۷	۵۲-۶۱
%۱۱	۱۱	۶۲-۷۱
%۹	۹	۷۲-۸۱
%۲	۲	>۸۱
%۱۰۰	۱۰۰	جمع کل

۳۴ مورد منزیت کشف شد که از این تعداد ۲۶ مورد غیرچرکی و ۸ مورد آن چرکی بود.
۶۷٪ موارد سی‌تی‌اسکن نرمال (۱) بود. ۱۱٪ ضایعه فوکال با اثر فشاری (۲)، ۵٪ ضایعه فوکال بدون اثر فشاری (۳)، ۹٪ ضایعه غیرفوکال بدون اثر فشاری غیرفوکال با اثر فشاری (۴)، ۵٪ ضایعه غیرفوکال با اثر فشاری (۵) و ۱٪ ضایعه فوکال و غیرفوکال با اثر فشاری (۶) داشتند که در جدول شماره ۳ خلاصه شده است.

جدول شماره ۳- شیوع پاقتهای در سی‌تی‌اسکن در بیماران مشکوک به

منزیت در مجتمع بیمارستانی امام

سی‌تی‌اسکن	تعداد	درصد
۱	۷	%۷
۲	۱۱	%۱۱
۳	۰	%۰
۴	۹	%۹
۵	۰	%۰
۶	۲	%۲
۷	۱	%۱

همی‌آنوبی پارشیال، ۲- همی‌آنوبی کامل، ۳- همی‌آنوبی دو طرفه، فلچ فاشیال (۰- بدون فلچ، ۱- فلچ مختصر، ۲- فلچ پارشیال، ۳- فلچ کامل)، حرکت شانه (۰- بدون افتادگی، ۱- فلچ قبل از ۵ ثانیه، ۲- falling قبل از ۱۰ ثانیه، ۳- عدم توانایی drift حرکت علیه جاذبه، ۴- بدون حرکت)، حرکت پاها (۰- بدون فلچ، ۱- drift قبل از ۵ ثانیه، ۲- falling قبل از ۱۰ ثانیه، ۳- عدم توانایی حرکت علیه جاذبه، ۴- بدون حرکت)، آفازی (۰- بدون آفازی، ۱- فرم خفیف آفازی، ۲- فرم شدید آفازی، ۳- mute)، دیس‌آرتی (۰- فقدان، ۱- خفیف، ۲- شدید)، (۰- extinction، ۱- نرمال، ۲- ضایعه فوکال با اثر فشاری، ۳- ضایعه فوکال بدون اثر فشاری، ۴- ضایعه غیرفوکال با اثر فشاری، ۵- ضایعه غیرفوکال بدون اثر فشاری، ۶- ضایعه فوکال و غیرفوکال با اثر فشاری، ۷- ضایعه فوکال و غیرفوکال بدون اثر فشاری) (۸,۱۰).

پس از جمع‌آوری، اطلاعات فوق بوسیله برنامه آماری epi info آنالیز شد و حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت تکنک یافته‌های نورولوژیک و کل آنها محاسبه گردید.

یافته‌ها

از کل بیماران مورد مطالعه ۷۳٪ مرد و ۲۳٪ زن بودند.

جدول شماره ۱- شیوع فراوانی جنسی در بیماران مشکوک به

منزیت در مجتمع بیمارستانی امام

درصد	تعداد	جنس
%۷۳	۷۳	مرد
%۲۷	۲۷	زن
%۱۰۰	۱۰۰	جمع کل

شیوع سنی بیماران به ترتیب عبارتند بودند از: (۱۰-۲۱)٪ (۲۲-۳۱)٪ (۲۵-۲۶)٪ (۳۲-۴۱)٪ (۴۲-۵۱)٪ (۵۲-۶۱)٪ (۷۲-۸۱)٪ (۷۲-۷۱)٪ (۱۱-۱۲)٪ و بالاتر از ۸۱ سال ۲٪. متوسط سن

۸۴٪ سی‌تی اسکن نرمال بود و ۲۷٪ ضایعه کترالندیکه پونکسیون لومبر داشتند.

شیوع بیشتر مردان (۷۳ در مقابل ۲۷) تا حدودی مربوط به ارجاع بیماران از زندان‌ها بود. شیوع بیشتر بیماران در سنین زیر ۴۱ سال انعکاسی از بافت جمعیتی کشور می‌باشد. شیوع منزیت در بیماران ما ۳۴٪ بود که در مطالعه رودریگو و همکاران این میزان ۲۷٪ بود. یافته‌های مربوط به اختلال نورولوژیک در مطالعه ما ۶۹٪ و در مطالعه رودریگو ۲۵٪ بود (۱۰). این اختلاف مربوط به بیمارانی است که از زندان‌ها به این مرکز ارجاع شده بودند و تعداد زیادی از آنها دارای اختلال هوشیاری بودند، به نحوی که ۵۹٪ از بیماران ما چهار درجه ای از اختلال هوشیاری بودند و یافته فوق علت افزایش شیوع یافته‌های نورولوژیک در بیماران دچار منزیت (۷۰/۶٪ در مقابل ۶۲٪) قابل انتظار است زیرا در منزیت به هر حال با گرفتاری سیستم عصبی مرکزی روبرو هستیم.

حساسیت و ویژگی بدست آمده در مطالعه ما در خصوص ادم پابی به ترتیب ۵۰٪ و ۹۷/۱٪ و در مطالعه گوبال ۱۸٪ و ۷۸٪ بود (۴).

حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت علایم نورولوژیک در تشخیص ضایعات کترالندیکه پونکسیون لومبر ۹۰/۹٪، ۲۸/۹٪، ۳۷/۱٪، ۹۳/۵٪ بود. در مطالعه رودریگو و همکاران ارزش اخباری منفی ۹۷٪ ذکر شده بود (۱۰). در مطالعه آقای گوبال برای یافتن بیش از یک علامت نورولوژیک فوکال حساسیت ۱۰۰٪ و ویژگی ۳۷۵ ذکر شده است (۴). در مورد عارضه خطرناکی مانند هرنیاسیون مغزی لازم است که از آزمونی برای مشخصکردن ضایعات کترالندیکه پونکسیون لومبر استفاده کرد که از حساسیت و ویژگی بالایی برخوردار باشد تا موارد منفی کاذب تست کم باشد. که در مطالعه ما این مقادیر به ترتیب ۹۰/۹٪ و ۹۳/۵٪ بدست آمد که با توجه به اختلاف حجم نمونه ما با مطالعه رودریگو این اختلاف معنی‌دار نبوده و بنابراین می‌توان توصیه کرد در صورتی که بیمار قادر ادم پابی در معاینه فوندوسکوپی باشد و همچنین قادر

۲۲٪ از بیماران در سی‌تی اسکن خود اثرفشاری داشتند و ۷۸٪ قادر اثر فشاری در سی‌تی اسکن بودند.

۶۹٪ از بیماران واجد حداقل یک علامت نورولوژیک بوده و ۳۱٪ قادر هرگونه علامت نورولوژیک بودند. از بیمارانی که در سی‌تی اسکن آنها اثر فشاری دیده شده بود ۹۰/۹٪ واجد علایم نورولوژیک و ۹/۱٪ قادر علایم بودند.

حساسیت ادم پابی ۵۰٪، ویژگی ادم پابی ۹۷/۱٪، حساسیت علایم نورولوژیک در تشخیص ضایعات فضا گیر ۹۰/۹٪، ویژگی آن ۳۷/۱٪، ارزش اخباری مثبت آن ۲۸/۹٪ و ارزش اخباری منفی آن ۹۳/۵٪ بدست آمد.

بحث

تشخیص منزیت نیازمند انجام پونکسیون لومبر برای تأیید وجود سلول‌های التهابی در مایع مغزی-نخاعی دارد تا با کمک آن درمان آنتی‌میکروبیال مناسب تجویز گردد. به هر حال به دلیل ریسک خطر پونکسیون لومبر سی‌تی اسکن مغز بطور گسترده برای تشخیص بیمارانی که در آنها نایاب از پونکسیون لومبر استفاده کرد بکار می‌رود.

انجام سی‌تی اسکن قبل از انجام پونکسیون لومبر در بیماران مشکوک به منزیت حاد علاوه بر صرف هزینه سبب تأخیر در شروع درمان و احتمالاً انجام درمان تجربی و طولانی مدت می‌گردد. بنابراین کافی بودن معاینات بالینی در رد ضایعات کترالندیکه پونکسیون لومبر در جلوگیری از مشکلات فوق‌الذکر کمک کننده است. در این مطالعه ۱۰۰ بیمار مشکوک به منزیت حاد سی‌تی اسکن شدند که ۶۷٪ موارد سی‌تی اسکن نرمال بود. ۱۱٪ ضایعه فوکال با اثر فشاری، ۵٪ ضایعه فوکال بدون اثر فشاری، ۹٪ ضایعه غیرفوکال با اثر فشاری، ۵٪ ضایعه غیرفوکال با اثر فشاری، ۲٪ ضایعه فوکال و غیرفوکال با اثر فشاری و ۱٪ ضایعه فوکال و غیرفوکال بدون اثرفشاری داشتند. در مطالعه رودریگو (۱۰) ۷۶٪ سی‌تی اسکن‌ها نرمال بود، ۲۴٪ غیرنرمال بود که ۵٪ اثرفشاری وجود داشت. در مطالعه گوبال (۴) و همکاران

معاینه فوندوسکوپی برای تشخیص ضایعات کترالندیکه پونکسیون لومبراز حساسیت و ویژگی کافی برخوردار است و نیاز به انجام سی تی اسکن مغز بطور روتین در این بیماران وجود ندارد.

یافته های نورولوژیک فوکال در معاینه نورولوژیک باشد می توان وی را بدون انجام سی تی اسکن مغز پونکسیون لومبر نمود. با توجه به یافته های فوق در این مطالعه توصیه می گردد که در بیماران مشکوک به منزیت حاد انجام معاینات نورولوژیک و

منابع

1. Thomas P. Bleck, approach to patient with central nervous system infection. Mandell, Douglas and Benet. Principle and practice of infectious disease. Fifth edition. Churchill livingstone 2000; 951-997.
2. Joseph B. Martin, Approach to the patient with neurologic disease. Brawnwald et al. Principle of internal medicine. 15th edition. Philadelphia. Mc Grawhill. 2001; 2326-2331.
3. Dieter R. Enzmann, Central nervous system infection. Charles E Putman, Carl e ravin. Text book of diagnostic imaging. Second edition. Philadelphia. WB Saunders 1994; 227-228.
4. Ajay K, Gopal et al. Cranial computed tomography before lumbar puncture. Arch Internal Medicine 1999; 159(13): 2681-2685.
5. Adams. Infection of the central nervous system. Adams and Victor. Principle of neurology 7th edition. Philadelphia. Mc Graw Hill 2000; 740-743.
6. Gray A. Rosenberg. Brain edema and CSF circulation. Ealter G Daroff, Gerald M Fenichel edition. Neurology in clinical practice. Third. Butterworth- Heinemann 2000; 1549-1552.
7. DJ Gower, Albaker et al. Contraindication to lumbar puncture as defined by computed cranial tomography. Journal of Neurology, Neurrosurgery and Psychiatry 1987; 50(10): 1071-1074.
8. Nancy D Baker et al. Head computed tomography prior to lumbar puncture in the emergency department. The Journal of Medicine 1994; 12(5): 597-601.
9. Robert A. Fishman. Lumbar puncture and CSF examination. Lewis P Rowland. Merritts neurology. 10 th edition. Philadelphia Lippincott William and Wilkins 2000; 89-92.
10. Rodrigo Hasbun et al. Computed tomography of the head before lumbar puncture in adult with suspected meningitis. 2001; 345(24): 1727-1733.
11. Robert H. Haslam et al. Role of the computed tomography in the early managemtn of bacterial meningitis. The Journal of Pediatric 1991; 119(1): 157-159.
12. Minns RA, Engleman et al. Cerebrospinal fluid pressure in pyogenic meningitis. Arch Disease of child 1989; 64: 814-820.