

# ابهام جنسی در کودکان

## بخش جراحی مرکز طبی کودکان (۱۳۶۲-۷۸)

دکتر جواد احمدی (دانشیار)، دکتر مهدی کلانتری (استادیار)، دکتر عبدالمحبد کجبافزاده (دانشیار)، دکتر سید محمد حسن صمدی (پژوهش عمومی)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

### چکیده

**مقدمه:** ابهام جنسی به مفهوم اختلاف میان مورفولوژی گنادها و دستگاه تناسلی خارجی می‌باشد. نوزاد مبتلا به ابهام جنسی باید هرچه سریعتر تعیین جنسیت شود تا بین والدین و کودک ارتباط مبهم برقرار نگردد. هدف از این مطالعه ارزیابی ابهام جنسی در یک مرکز ارجاعی جراحی کودکان بوده است.

**مواد و روشها:** در یک مطالعه گذشته‌نگر در عرض ۱۶ سال پرونده ۲۰۰ کودک را که به عنوان ابهام جنسی در بیمارستان مرکز طبی کودکان بستری شده بودند، بازبینی نمودیم. داده‌های کلینیکی و آزمایشگاهی جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های ۷۰/۵ درصد ابهام جنسی کاذب زنانه، ۲۰/۵ درصد ابهام جنسی کاذب مردانه، ۵ درصد ابهام جنسی حقیقی و ۴ درصد دیسڑنری ترکیبی گنادها داشتند. ۷۶/۵ درصد به جنسیت مؤنث و ۲۲/۵ درصد به جنسیت مذکر تبدیل شدند. ۲۹ درصد هیپرپلازی مادرزادی آدرنال داشتند که از این تعداد ۸۷/۵ درصد کمبود آنزیم ۲۱-هیدروکسیلاز، ۱۰/۵ درصد  $\beta$ HSD و ۳ $\beta$ HSD داشتند. ۷۰/۵ درصد کاربوتیپ ۴۶XX، ۲۱/۵ درصد کاربوتیپ ۴۶XY و بقیه موزائیسم بودند. ۵۲/۵ درصد این کودکان والدین منسوب داشتند. اعمال جراحی واژینوپلاستی (۱۰۵ مورد) و clitoral resection (۵۱ مورد) انجام شد. طیفی از آنومالیها دیده شد. سن تشخیص طیفی از یک روز تا ۱۳ سال بود. ۱۰۱ بیمار در دوران نوزادی تشخیص داده شدند اما فقط ۴۳ نفر توسط والدین در دوران نوزادی برای درمان به این مرکز مراجعه کردند.

**نتیجه گیری و توصیه ها:** پزشکان مخصوصاً پزشکان عمومی در معاینات کودکان حتماً ناحیه ژنیتالیا را معاینه و در صورت شک به ابهام جنسی کودک را به مراکز مربوطه ارجاع دهند.

۴۷ نفر (۲۳/۵ درصد) به جنس مذکر و ۱۵۳ نفر (۷۷/۵ درصد) به جنس مؤنث تبدیل شدند. ۱۴۲ نفر هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) داشتند (۷۱ درصد). از ۵۸ نفر هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) (داشتند ۲۹ درصد) از ۵۸ نفر فوق. ۵۰ نفر نقص 21-OH Hydroxylase (نمودارهای ۵ و ۶ ضمیمه). ۶ نفر نقص 11-B hydroxylae، ۱۱، ۲ نفر نقص 3-

BHSD

از نظر توزیع کاریوتیپ:

۱۴۱ نفر ژنوتیپ XX (۷۰/۵ درصد)، ۴۳ نفر ژنوتیپ XY (۲۱/۵ درصد)

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی و فراوانی نسبی بیماران تحت

مطالعه بر اساس تشخیص

درصد	تعداد	گروه سنی
۶۷/۰	۱۳۵	بدونولد
۸	۱۶	۰-۱ ماه
۷	۱۴	۱-۲ ماه
۲	۴	۲-۳ ماه
۳/۰	۵	۳-۶ ماه
۴/۰	۹	۶-۱۲ ماه
۷/۰	۵	۱-۲ سال
۳/۰	۷	۲-۵ سال
۱/۰	۳	۵-۱۰ سال
۱	۲	> ۱۰ سال
۱۰۰	۲۰۰	جمع

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس

سن مراجعه

۱-۲ سال	۳۷ نفر	بدونولد	۲ نفر
۲-۵ سال	۲۴ نفر	۰-۱ ماه	۴۱ نفر
۵-۱۰ سال	۱۵ نفر	۱-۲ ماه	۳۱ نفر
> ۱۰ سال	۸ نفر	۲-۳ ماه	۸ نفر
		۳-۶ ماه	۱۰ نفر
		۶-۱۲ ماه	۲۴ نفر

## مقدمه

ابهام جنسی به مفهوم اختلاف میان مورفوЛОژی گنادها و دستگاه تناسلی خارجی می‌باشد (۱،۲) اغلب اولین سوالی که از والدین جدید پرسیده می‌شود این است که نوزاد پسر است یا دختر؟ والدین باید قادر باشند تا جواب مناسبی متناسب با وضعیت نوزاد بیان کنند. نوزاد مبتلا به ابهام جنسی باید هر چه زودتر از لحظه تعیین چنیست متناسب با آناتومی خود مورد رسیدگی قرار گیرد و تشخیص چنیست و تصحیح جراحی هر چه ممکن است زودتر انجام شود تا بین والدین و کودک ارتباط میهم برقرار نگردد و کودک تصور از بدن خود را که به اعتماد به نفس او خواهد انجامید تکامل بخشد (۱).

در این مطالعه فراوانی و فراوانی نسبی انواع ابهام جنسی، سن تشخیص، سن مراجعه، بررسی ژنتیکی (کاریوتیپ)، آنومالیهای همراه، فراوانی هیپرپلازی مادرزادی آدرنال و انواع نقایص آنربیمی آن و نوع اعمال جراحی انجام شده در ۲۰۰ کودک مبتلا به ابهام جنسی در بخش جراحی بیمارستان مرکزی طبی کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.

## مواد و روشها

در این بررسی تمام بیماران مبتلا به ابهام جنسی از سال ۱۳۶۶ تا سال ۱۳۷۸ که به بیمارستان مرکز طبی کودکان مراجعه کرده و پرونده آنها در بایگانی موجود بود مطالعه قرار گرفت و پروندهای ناقص حذف شد. با مراجعه به بایگانی بیمارستان مرکز طبی کودکان اطلاعات مورد نیاز از پروندهای استخراج شد و کلیه محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل این بررسی یا استفاده از نرم افزار SPSS for windows انجام گرفت.

## یافته‌ها

با بررسی داده‌ها و آنالیز آنها نتایج زیر بدست آمد که در جداول یک تا چهار ارایه شده است.

کودکان مبتلا به ابهام جنسی که به دختر تبدیل شدند به ترتیب:

۸۶/۹ درصد کاربوبتیپ XX/9XX کاربوبتیپ موزائیسم و ۵/۲ درصد کاربوبتیپ XY داشتند. (به جدول ضمیمه مراجعه شود). آنومالی‌های همراه به نمودار ۴ مراجعه شود. اعمال جراحی انجام شده به نمودار ۵ ضمیمه شود.

جدول شماره ۴ - جدول تعیین نتایج کاربوبتیپ در بیماران تحت مطالعه به تفکیک فنوتایپ

Mosaic	نتایج کاربوبتیپ					فنوتایپ	جمع
	XO	XY	XX	XY	XX		
تعداد (درصد)							
۲۵ (۷۴/۵)	-	-	+	-	-	۱	
۷ (۱۴/۱)	-	-	-	-	+		
۵ (۱۰/۶)	+	-	-	-	-		
۴۷ (۱۰۰)						جمع	
۱۳۳ (۸۶/۹)	-	-	-	+	+	۱۰۰	
۱۲ (۷/۹)	+	-	-	-	-		
۸ (۵/۲)	-	-	+	-	-		
۱۰۲ (۱۰۰)						جمع	


جدول شماره ۳ - توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس مدت پیگیری از سن تشخیص تا مراجعت به صورت زیر بود

بدون وقفه	۳۲ نفر
۰-۱ ماه	۳۸ نفر
۱-۲ ماه	۱۷ نفر
۲-۳ ماه	۷ نفر
۳-۶ ماه	۱۴ نفر
۶-۱۲ ماه	۲۱ نفر
۱-۲ سال	۳۳ نفر
۲-۵ سال	۲۱ نفر
۵-۱۰ سال	۱۲ نفر
> ۱۰ سال	۰ نفر
جمع	۲۰۰ نفر


#### ۱۶ نفر (۸ درصد) Mosaicism

توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس نوع ابهام جنسی به صورت زیر است:


- 1) female pseudohermaphrodisim- ۷۰/۰ -n=۱۴۱
- 2) male pseudohermaphrodisim- ۲۰/۰ -n=۴۱
- 3) true hermaphrodis- ۵۵ درصد -n =۱۰
- 4) mixed gonadal dysgenesis - ۴ درصد -n =۸




نمودار ۱ - توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس تشخیص



نمودار ۳- توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس سن مراجعه



نمودار ۴- توزیع فراوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس آنومالی همراه



نمودار ۵- توزیع فرآوانی بیماران تحت مطالعه بر اساس نوع عمل جراحتی

یکی از شایعترین علل ابهام جنسی کاذب زنانه هیپرپلازی مادرزادی آدرنال بود که شایعترین علت آن در تمام متون خارجی کمبود آنزیم ۲۱ هیدروکسیلаз و بعد از آن به ترتیب کمبود آنزیم ۲۱ هیدروکسیلاز و ۳BHD است. در مطالعه ما هم همین ترتیب رعایت شده است و به ترتیب ۸۷/۵ درصد کمبود اولین آنزیم و ۱۰/۵ درصد دومین آنزیم و ۳ درصد سومین آنزیم بدست آمد.

در کتاب نلسون ۹۰ درصد نقص آنزیمی ۲۱ هیدروکسیلاز و ۸۰/۵ درصد نقص ۱۱B هیدروکسیلاز و کمتر از ۵ درصد نقص ۳BHD گزارش شده است (۳). اعمال چراغی انجام شده مشابه اعمال چراغی ذکر شده در متون و مقالات بود. بیشترین عمل چراغی انجام شده در مطالعه ما واژینوپلاستی و پس از آن clitoral resection بود که در مطالعه جنوب هند شایعترین عمل کلیتوروپلاستی بود (۵). ۷۰/۵ درصد بیماران در مطالعه ما در دوره نوزادی تشخیص داده شدند که در مقاله‌ای که در سال ۱۹۹۵ منتشر شده این رقم ۷۴ درصد است (۷). بالاترین سن تشخیص در مطالعه ما ۱۳ سال بوده است. در مطالعات خارجی سن بالا را به صورت case report بیان می‌کنند (۹،۸).

## بحث

با بررسی ۲۰۰ پرونده بیماران مبتلا به ابهام جنسی در بیمارستان مرکز طبی کودکان در سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸ شایعترین نوع ابهام جنسی، ابهام جنسی کاذب زنانه بود که ۱۴۱ بیمار را شامل شد. پس از آن ابهام جنسی کاذب مردانه بود که ۴۱ نفر به آن مبتلا بودند در مطالعه‌ای که در جنوب هند انجام شده بود ۵۱ درصد بیماران ابهام جنسی کاذب زنانه داشتند (۴). اما در مطالعه‌ای دیگر، از ۸۹ بیمار ۵۷ درصد ابهام جنسی کاذب مردانه و ۳۱ درصد ابهام جنسی کاذب زنانه داشتند (۶). در مطالعه ما ۴ درصد بیماران مبتلا به MGD بودند در یک مطالعه ۷/۶ درصد بیماران به این نوع ابهام جنسی، مبتلا بودند (۵). تعامل تبدیل بیماران به جنسیت مؤنث در مطالعه ما نیز دیده شد و ۷۷/۵ درصد بیماران به جنسیت مؤنث و ۲۲/۵ درصد به جنسیت مذکر تبدیل شدند. در مطالعه جنوب هند ۱۸ مورد از ۳۱ مورد به جنسیت مؤنث تبدیل شدند (۹ درصد) (۴).

### پیشنهادات

۱) پزشکان مخصوصاً پزشکان عمومی در معاینات کودکان حتماً ناحیه زنیتالیا را معاینه و در صورت شک به ابهام جنسی کودک را به مراکز مربوطه ارجاع دهند.

۲) یکی از مهمترین و جالبترین موضوعات برای تحقیق بررسی نتایج اعمال جراحی در بیماران مبتلا به ابهام جنسی در این مطالعه است که در این با توجه به نبود امکانات دسترسی به بیماران و نرسیدن بیماران به سن ازدواج امکان پذیر نبود.

پیشنهاد می‌شود مطالعه‌ای با این عنوان در سالهای آینده تدوین شود که همکاران جراح اطفال از نتایج اعمال جراحی خویش آگاه شوند و در ارتقاء دانش جراحی خویش گام بردارند.

مثلاً در مقایسه‌ای دختر ۱۴ ساله‌ای گزارش شد که تا این سن خود را پسر می‌دانست (۸). شایعترین آنومالیها در مطالعه ما هیپوسپادیاس و کریپتوکیدیسم بود. آنومالیهای صورت در مطالعه ما مانند متون خارجی دیده شد. درصد بیماران حداقل ۶ ماه از زمان تشخیص تا مراجعه داشتند که این یا به علت عدم توجه والدین (با نوجه به وضعیت فرهنگی کشور ما) و یا عدم تشخیص و ارجاع سریع پزشکان است که می‌تواند نتایج چیران ناپذیری برای طفل به بار آورد.

### منابع

- Patricia K. Donahahoe, John D. Crawford, Ambiguous genitalia in the newborn Ravitch, Pediatric surgery 1986 4 th edition. 1363-1380.
- Jean D. Wilson/James E. Griffin Disorder of sexual Differentiation, Harrson's Principles of internal Medicine 1998. 14 edition. 2119-2131.
- Anglam. Drgeorge-Lenores. Levine, Disorder of the Adrenal Glands, Nelson Test book of pediatric London saunders 1996.
- Rajendran-R; Hariharan -S: Progfile of Interest children in south India, Indian. Pediatr. 1995 Jun; 32(6): 666-71.

5. Blanco-JA; Martinez-Mora-J; Granada-M; Toran-N; Isnard-RM; castellvi-A; Casasa-JM: [the mixed gonadal dysgenesis. Diagnostic criteria and surgical treatment] Cir-pediatr 1997 Jan; 10(1): 34-7.

6. Krstic-Z, Perovic S., Radmanovic S., Necic S., Smoljahinic S., Jevtic P., Surgical treatment of intersex disorders. J-Pediatr-Surg. 1995 Sep; 30(9): 1273-81.

7. Lim YJ., Warne GL., Adrenal 21 hydroxylase deficiency in childhood, 25 years experience J-Pediatr child-health. 1995 Jun; 31(3): 222-7.

8. Reiner WG., Case study: sex reassignment in a teenage girl. J Am Acad child Adolesc Psychiatry. 1996 Jun; 35(6): 799-803.

9. Smith YR., Stetten G., Charity L., Isacson C., Gearhart JP., Namnoum AB Ambiguous genitalia in an elderly woman with a mosaic 45, 2/46x, dix (Y) Q11.2 Karyotype. Urologe 1996 Feb; 47: 259-62.