

منتزیت آسینتوباکتر بیمارستانی گزارش یک مورد مقاوم و عودکننده

دکتر علی عطربی* (استادیار جراحی پلاستیک)، دکتر محمدجواد تاج** (استادیار رشته عفونی)، دکتر علیرضا یلدای* (استاد رشته عفونی)

*دانشگاه علوم پزشکی تهران

**دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

آسینتوباکتر از باسیل‌های گرم منفی روده‌ای (GNB)، کپسول‌دار، غیر متحرک و هوازی است. عوامل خطرزا در عفونت‌های بیمارستانی توسط این میکروب عبارتند از: طول مدت بستری، جراحی، عفونت قبلی، کلونیزاسیون مدفعی، درمان با آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف، تغذیه وریدی، کاتر ادراری، بستری در بخش سوختگی و مراقبت‌های ویژه (ICU) و تهویه مکانیکی. شیوع عفونت با این میکروب و نیز مقاومت آن به درمان آنتی‌بیوتیکی در دو دهه گذشته رو به تزايد می‌باشد. وقوع عفونت به حالت منتزیت پدیده‌ای ناشایع بوده و در صورت بروز اغلب متعاقب اقدامات جراحی اعصاب رخ می‌دهد.

در این مقاله ما یک مورد منتزیت آسینتوباکتر بیمارستانی را معرفی می‌نماییم. بیمار مورد نظر بعلت اختلال اکلوزیون دندانی ناشی از ترومای دوران کودکی مورد عمل جراحی ترمیمی در ناحیه استخوان ماگزیلا قرار گرفت. منتزیت پس از عمل توسط این میکروب با مقاومت چند دارویی (MDR) بود. درمان با مجموعه ایمی‌بنم/سیلاستاتین و آمیکاسین با پاسخ مناسبی همراه بود اما متأسفانه با عارضه سمیت گوشی آمیکاسین توأم گردید.

هوفیلوس آنفلوآنزا اشتباه می‌شود. شایع ترین انواع آن (A. calcoaceticus) و (A. baumannii) می‌باشند. در طبیعت

در آب و خاک و اشیاء مانند موارد زیر یافت می‌شود: گرد و غبار بیمارستانی، غذای پخته، آب انبار، محلول دیالیز صفاتی، لگن‌های ادرار بیماران، ونتیلاتور، دستکش آلوه و ... (۱).

این میکروب می‌تواند جزء فلور نرم‌الروه بزرگ انسان و حیوان باشد. در خلط، ادرار و ترشحات واژن نیز پیدا می‌شود. بیماران بستری مورد کلونیزاسیون پوستی و اروفارنکس وافع

مقدمه

آسینتوباکتر جزء باسیل‌های گرم منفی روده‌ای (GNB) است. اینها شامل دو خانواده انتروباکتریاسه‌ها و نیسریاسه‌ها می‌باشند. کپسول‌دار، غیر متحرک، هوازی اندول منفی و کاتالاز مثبت است. در محیط کشت می‌تواند میله‌ای شکل (rod) و یا به شکل کوکوباسیل باشد. گاهی با نیسریامنتگوکوک، موراکسلا و

شدن وضعیت هوشیاری بیمار به ICU منتقل شد. لوله گذاری تراشه با معده انجام نگرفت. پاسخ ۲۴ ساعته کشتهای خون و ادرار منفی بود ولی کشت CSF آسیتوباکتر گزارش گردید. قابل ذکر است که آنتی بیوگرام به روش broth or agar dilution minimal inhibitory concentration (MIC) جهت ارزیابی (۱،۲) انجام مقدور و در دسترس نبود. بلکه روش disk diffusion گرفت که به کلیه آنتی بیوتیک های مورد آزمایش شامل آمپی سیلین، کلیندامایسین، سفالکسین، سپروفلوکسازین، سفنی زوکسین، کلیستین، توپرامایسین، جنتامایسین، کانامایسین، تریمتوبیرم، سفترباکسون و سفتاریدیم مقاوم بود. سفتازیدیم قطع شد و رژیم آیمی پنم/سیلاستاتین + آمیکاسین شروع گردید. در مشاروه جراحی مغز و اعصاب درمان محافظتی و مدیکال (افزودن دگراماتازون + فنوباریستال و بعد تبدیل به فنی توئین + استازولامید + مانیتول) توصیه شد. مبنی پلیت ها و پیچ های استوستز فک فوکانی باقی ماند هر چند که بعنوان جسم خارجی مطرح بودند اما خارج ساختن آنها صلاح نبود. در روز چهارم درمان وضعیت هوشیاری رو به بهبود نهاد و بیمار با پزشک ارتباط کلامی برقرار نمود. در روز ۷۹/۹/۲۹ (یازدهمین روز درمان) تپ بیمار قطع شد در هفدهمین روز درمان بیمار با حال عمومی خوب به بخش منتقل شد. در روز ۲۵ درمان پاسخ CSF به شرح زیر بود: شفاف، فشار نرمال، سلول ۴۰ و (۶۰٪ نوتروفیل)، قند ۶۶، پروتئین ۷۴، اسپیر منفی و کشت متعاقب آن منفی. در روز بیست و هفتم درمان (۱۳۷۹/۱۰/۱۴) با توجه به معاینه عصبی نرمال و نداشتن تپ و پاسخ منفی برای CSF، آنتی بیوتیک های بیمار قطع گردید، اما متأسفانه دو روز بعد بیمار مجدداً دچار تپ، نهوع و سر درد می شود. در معاینه اخیر هوشیار، درجه حرارت ۳۸/۳ و ردود گردنی هوشیاری می گردد. در معاینه تپ دار، تاکیکارد، لتاژیک و دارای رdro گردنی و علائم کرنیگ و برد زنسکی مثبت بود. بطور اورژانس سی تی اسکن مغزی بدون کتراست انجام گرفت که نشان دهنده پنوموسفالوس بود و ضایعه فضایگر نداشت (تصویر شماره ۱). در LP انجام شده CSF نمای چرکی و فشار بالاتر از حد طبیعی داشت، گلوکز: ۳، پروتئین: ۲۵۰، گلبول سفید: ۸۰۰۰ (نوتروفیل ۹۰٪) و در اسپیر CSF باسیل های گرم منفی کوتاه مشاهده شد.

پاسخ CSF: شفاف، فشار نرمال، قند ۴۵، پروتئین ۹۵، سلول ۱۶۰ (۴۰٪ نوتروفیل)، اسپیر منفی، کشت ۴۸ ساعته منفی، کشت های خون و ادرار منفی گزارش گردید. مجدداً آنتی بیوتیک های قبلی تجویز شد که علت آن را در قسمت بحث

منی شوند. شایع ترین GNB است که پرسنل بیمارستان ناقل پوستی مداوم و پایدار برای آن قرار می گیرند (۱).

عوامل خطرزای دخیل در عفونت بیمارستانی عبارتند از: مدت بستری، جراحی، کلوبیزایسیون مدفعی، زخم، درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، تغذیه وریدی، کاتتر ورید مرکزی، کاتتر ادراری، بستری در بخش سوختگی و ICU و تهوره مکانیکی (۱،۲).

انواع عفونت با این میکروب عبارتند از: عفونت مجرای تنفسی (بیشتر در افراد لوله گذاری شده)، باکتریمی، آندوکاردیت، عفونت داخل جمجمه ای، استئومیلیت، عفونت ادراری تناسلی (۱).

منتزیت آسیتوباکتر برای اولین بار در سال ۱۹۳۸ توسط آقای Cowan گزارش شد (۳). این بیماری به ندرت رخ می دهد و در صورت وقوع اغلب متعاقب اقدامات جراحی اعصاب می باشد (۴،۵). یک مورد گزارش ابتلاء در یک فرد سالم ارائه شده است (۶). این بیماری می تواند با شروع حاد و یا با سیر آرام ظاهر نماید. نکات مربوط به درمان و مقاومت دارونی را در قسمت بحث ذکر می نمائیم.

معرفی بیمار:

خانم س.س. مجرد، ۱۹ ساله، ساکن تهران، در تاریخ ۷۹/۹/۱۴ بعلت اختلال کلوریون دندانی و دفرمیتی فک بالا، صورت و بینی ناشی از ترومای دوران کودکی، در بیمارستان امام خمینی مورد جراحی استوتومی ماجنیلا قرار می گیرد. در سابقه وی بیماری خاصی وجود نداشت. از روز چهارم پس از عمل دچار سر درد و تپ (۳۸/۵) و بذریغ دچار نهوع و استفراغ و کاهش سطح هوشیاری می گردد. در معاینه تپ دار، تاکیکارد، لتاژیک و دارای رdro گردنی و علائم کرنیگ و برد زنسکی مثبت بود. بطور اورژانس سی تی اسکن مغزی بدون کتراست انجام گرفت که نشان دهنده پنوموسفالوس بود و ضایعه فضایگر نداشت (تصویر شماره ۱). در LP انجام شده CSF نمای چرکی و فشار بالاتر از حد طبیعی داشت، گلوکز: ۳، پروتئین: ۲۵۰، گلبول سفید: ۸۰۰۰ (نوتروفیل ۹۰٪) و در اسپیر CSF باسیل های گرم منفی کوتاه مشاهده شد.

بلافاصله پس از LP و اخذ نمونه کشت خون و ادرار، سفتازیدیم + آمیکاسین تجویز شد. روز بعد بعلت هیپوکسی و بدتر

در بیشتر از ۹۵٪ موارد مؤثر بوده است ترکیب آینمی پنم به همراه آمینوگلیکوزید، ترکیب بتا لاکتام، مهار کننده بتا لاکتاماز BL/BLI به همراه آمینوگلیکوزید هر کدام اثرات سینزرسیم خوبی داشته‌اند (۱،۲). در یک مطالعه آینمی پنم درمان انتخابی برای منزیت آسیتووباکتر گزارش شده است (۷). در مطالعه دیگر، پنج مورد از هفت مورد منزیت آسیتووباکتر متعاقب جراحی اعصاب به مجموعه آینمی پنم + آمیکاسین حساس بودند (۸). در مطالعه سوم، ۶ نفر از ۸ نفر بیمار دچار منزیت با آینمی پنم مورد درمان واقع شدند که ۵ نفر از آنان بهبود و یک نفر فوت نمود (۹).

در متابع، دوره درمانی برای GNB‌ها بطور کلی سه هفته ذکر شده است، و درمان کمتر از این مدت را با خطر عود همراه می‌دانند. در بیمار ما بعد از گذشت ۲۷ روز (حتی زمانی بیش از ۳ هفته معمول) با توجه به رفع تب و معاینه عصبی نرمال و کشت منفی CSF آنتی‌بیوتیک قطع گردید اما در روز سوم بعد از قطع درمان مجدد بیمار دچار تب گردید. هیچ شکایتی بجز تهوع و سر درد و در معاینه بجز تب و ردود گردنی یافته مثبت دیگر نداشت. کشت‌های خون و ادرار منفی گزارش گردید برای بررسی از لحاظ عوارض احتمالی ایترکرانیال، سی‌تی اسکن مغزی بطور اورژانس انجام گرفت و نکته جدیدی نداشت، هیچ محل مشخصی (مثل فلیبت ناحیه کاتترهای وریدی و ...) برای توجیه تب یافت نشد. با توجه به بروز ردود گردنی بهمراه تب و اینکه هنوز بیمار دارای جسم خارجی در استخوان مانگریلا و در مجاورت قاعده جمجمه بود بیشترین احتمال تشخیصی، درمان با مدت ناکافی برای منزیت قبلی (با توجه به جسم خارجی) و عود آن بود و لذا طولانی‌تر نمودن درمان را به مدت ۵ هفته منظور نمودیم و پوشش آنتی‌بیوتیکی قبلی باعث منفی ماندن کشت CSF گشته بود. اما اینکه چرا دوباره آینمی پنم و آمیکاسین تجویز شد، دلیلش اینست که در طی درمان قبلی پاسخ بالینی و آزمایشگاهی مناسبی ظاهر شده بود و ضمناً متابع و مقالات تأکید بر آینمی پنم و آمیکاسین دارند. باید متذکر شویم که در طی درمان دارویی، انجام جراحی مجدد جهت خارج ساختن جسم خارجی و یا برای ترمیم نقص سخت شامه (دفکت در باریس دورامتر قاعده جمجمه که باعث پنوموسفالوس شده بود) منطقی و مقدور نبود. از روز دوازدهم درمان مجدد بعلت عارضه اتونوکسیسیتی (سمیت گوشی) آمیکاسین قطع و بقیه دوره درمانی با همان دوز قبلی آینمی پنم

خواهیم آورد. در تاریخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۷ (بازده روز پس از شروع درمان مجدد و ۳۸ روز دریافت آمینوگلیکوزید) بعلت کاهش شنوایی، آمیکاسین قطع و مشاوره ENT انجام گرفت. کاهش شنوایی حسی عصبی دو طرفه به میزان ۶۰-۷۰ دسی بل تقریباً در تمام فرکانس‌ها وجود داشت. آزمایشات عملکرد کلیوی نرمال بودند.

در تاریخ ۱/۱۱/۷۹ (پانزده روز پس از شروع درمان مجدد) تب بیمار قطع و حال عمومی وی بهتر شد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۷۹ (۴ روز پس از شروع درمان مجدد) آنتی‌بیوتیک قطع و تا ۴ روز پس از آن در بخش بستری و تحت نظارت دقیق قرار گرفت.


تب، سردرد و نهوع وجود نداشت. سی‌تی اسکن مغزی انجام گرفت قسمت اعظم پنوموسفالوس جذب شده بود (تصویر ۲). سرانجام پس از ۷۰ روز بستری بیمار مرخص و تا یکسال چند بار مورد ویزیت سرپایی قرار گرفت که تیاز به وسیله کمکی برای شنوایی پیدا نمود. عمل جراحی تکمیلی بیمار برای اصلاح دفرمیتی بینی در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۰ انجام گرفت و در ضمن این عمل مینی‌پلیت‌ها و پیچ‌های اوستوستتر فک فوقانی خارج گردید. در کنار یکی از پلیت‌ها کیست کوچکی به قطر حدود یک سانتی‌متر حاوی مایع نسبتاً شفاف وجود داشت که کشت آن منفی گزارش شد. بیمار پس از عمل جراحی مجدد هیچ مشکلی نداشت و تا زمان تهیه مقاله (حدود ۲ سال از تکمیل درمان منزیت) کاملاً سالم و بدون علامت می‌باشد و کاهش شنوایی بیمار با سمعک اصلاح شده است.

بحث

در تشخیص عفونت‌های آسیتووباکتر، علاوه بر در نظر داشتن عوامل خطرزا (که در مقدمه آمده است) توجه به مورفوЛОژی میکروبی نیز اهمیت دارد چون که آسیتووباکتر می‌تواند به اشکال کوکوپلیل و یا با سیل‌های کوتاه باشد لذا گاهی با دیپلوکوک‌ها (منگوکوک، موراکسلا) و هموفیلوس آفلوآنزا اشتباه می‌شود. مسئله مهم دیگر در عفونت‌های آسیتووباکتر بروز مقاومت دارویی می‌باشد که رو به تزايد است. داروهایی چون آمپیسیلین، آتررونام، سفالوسپورین‌های نسل اول و دوم، کلارامفنیکل و جنتامایسین کم اثر و یا بی‌اثرند. مزوسیلین، پیراسیلین، برخی کینولونها، آمیکاسین، سفتازیدیم، تری‌متوریم و آینمی پنم اثرات متغیری داشته‌اند. آینمی پنم



تصویر شماره ۱- سی تی اسکن مغز، نشان دهنده پنوموسفالوس



تصویر شماره ۲- کاهش پنوموسفالوس نسبت به سی تی اسکن قبلی

مراقبت از ونتیلاتور و ...) و عادت نسخه‌نیسی تجدید نظر بعمل آید و یک مطالعه (case control) صورت گیرد (۱).

در پایان ما پیشنهاد می‌کنیم در مواردی که برداشتن جسم خارجی مقدور نبوده و به صلاح بیمار نباشد (با وجود اینکه در منابع تأکید فراوان بر خارج نمودن آن شده است)، بیمار با منتظر آسیتوباکتر بمدت حدود ۵ هفته یعنی طولانی‌تر از سه هفته معمول مورد مداوا قرار گیرد که در ۳ هفته مجموعه ایمپنم + آمیکاسین (بخاطر اثر سینزرویسم) و در بقیه مدت ایمپنم به تنها ایده باید و ضمناً کنترل دقیق از لحاظ سمتی گوشی و کلیوی آمینوگلیکوزیدها اعمال گردد.

میلی‌گرم وریدی ۴ بار در روز ادامه یافته. باید در طی درمان با آمینوگلیکوزیدها مواطن نفووتوكسیستی (سمیت کلیوی) و اتونکسیستی آنها باشیم. تست‌های سریال بررسی عملکرد کلیوی ضروری است. تست‌های شناوری سنجه در فرکانس‌های بالا از روز نهم درمان توصیه شده است (۱). بیمار مورد نظر در دوره اول درمانی اکثراً در ICU بستری بود و در یک هفته اول درمان مجدد بعلت تهوع و سر درد قادر به انجام تست‌های شناوری نبود.

توصیه شده است که اگر در بیمارستانی out break عفونت آسیتوباکتر MDR با آنتی‌بیوگرام‌های مشابه رخ دهد باید در روش‌های کنترل عفونت (مانند شستن دست، ایزولاسیون بیمار،

منابع

1. Mandle Douglas and Bennett S. Principles and practice of infection diseases fifth edition. 2000, 2339-42.
2. Harrison's principles of internal medicine 14 th edition. 2001; 968.
3. Cowan St. Unusual infections following cerebral operations: with a description of diplococcus mucosus (Von Lingelsheim). Lancet. 1938; 2: 1052-54.
4. Berk SI, Mc Cabe WR. Meningitis caused by acinetobacter calcoaceticus var anitratus: a specific hazard in neurosurgical patients. Arch Neurol. 1981; 38: 95-8.

5. Allen DM, Wong Sy. Acinetobacter: a perspective. Singapore Med J. 1990; 31: 511-14.
6. Olafsson M, Lee Yc, Abernethy Tj. Mima polymorpha meningitis: report of a case and review of the literature. N engl J Med. 1958; 258: 465-70.
7. Chang WN, Chuang Yc, LU-Ch acinetobacter meningitis: four nosocomial cases. J Formos Med Assoc. 1999 Mar; 98(3): 214-7.
8. M. Hong Nguyen M.D, Stervn P. Harris, M.D. Neurosurgical patient. Neursurgery 1994; 35: 851-55.
9. Lv-Ch, Chang WN, Chuang Yc. Resistance to third generation cephalosporins in adult gram negative bacillary meningitis infection. 1999 May-Jun; 27(3): 208-11.