

رابطه بین تغییرات آینه‌ای (reciprocal changes) الکتروکاردیوگرام بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد و تنگی عروق کرونر تغذیه‌کننده نواحی مربوط به تغییرات

دکتر ابراهیم نعمتی پور* (دانشیار)، دکتر زهرا اصغری (متخصص)*

* بخش قلب و عروق، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: تغییرات آینه‌ای بصورت سقوط قطعه ST مساوی یا بیشتر از یک میلی‌متر ($\geq 1 \text{ mm}$) در لیدهای آینه‌ای الکتروکاردیوگرام بیماران دچار انفارکتوس حاد میوکارد تعریف می‌شود. این سؤال که آیا این تغییرات ثانویه به بالا رفتن قطعه ST در ناحیه دچار انفارکتوس بوده، یا حقیقتاً دلالت بر ایسکمی ساباندوکاردیال ثانویه به انسداد کرونر مشروب کننده ناحیه دچار تغییرات آینه‌ای دارد، هنوز به درستی مشخص نشده است.

مواد و روشها: در این مطالعه، ۳۳ بیمار دچار انفارکتوس حاد میوکارد و تغییرات آینه‌ای در ECG زمان بستره، حدود یک هفته پس از وقوع انفارکتوس مورد آنژیوگرافی کرونر قرار گرفتند و ارتباط بین تغییرات آینه‌ای در ECG و کرونر آینه‌ای (کرونر مشروب کننده ناحیه دچار تغییرات آینه‌ای در ECG) مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: ۳۲-۶۳ درصد (یک سوم تا دو سوم) بیماران با تغییرات آینه‌ای، تنگی قابل توجه ($\geq 70 \text{ درصد} >$) کرونر آینه‌ای را در آنژیوگرافی نشان می‌دادند (۹۵ درصد CI: Multivessel disease). شیوع درگیری چند رگ، (CABGS) حدود ۶۶/۶ درصد بود، پس از آنژیوگرافی کرونر ۳۳/۳ درصد بیماران برای عمل جراحی با پس عروق کرونر (PTCA) و ۲۷/۳ درصد برای آنژیوپلاستی (PTCA) معرفی شدند. به عبارت دیگر حدود ۶۰/۶ درصد از بیماران جهت رواسکولاریزاسیون (CABG) با معرفی گردیدند.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: بنابراین با توجه به نیاز به اقدامات درمانی تهاجمی برای حدود ۶۰ درصد از بیماران، انجام آنژیوگرافی کرونر در همه بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد و تغییرات آینه‌ای در الکتروکاردیوگرام می‌تواند توصیه شود.

مقدمه

شدند، فیلم‌های آنژیوگرافی بدون اطلاع قبلی از سطح انفارکتوس و تغییرات آینه‌ای با دقت مورد مطالعه و تفسیر واقع گردید و تنگی شاخه‌های مختلف عروق کرونر تعیین و نیاز به اقدامات بعدی مداخله‌ای مورد توجه واقع شد. این یافته‌ها متعاقباً با تغییرات آینه‌ای مشاهده شده در ECG و رابطه آن با درگیری کرونر مربوط به سطح آینه‌ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. فاصله زمانی تهیه الکتروکاردیوگرام از شروع درد سینه و شدت تغییرات ST نیز مورد بررسی واقع شد.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: اطلاعات بدست آمده

پس از ورود به کامپیوتر با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در آنالیز آماری اطلاعات مربوطه از تست‌های Regression، آنالیز واریانس و t-test استفاده به عمل آمد.

نتایج

از ۳۳ بیمار مطالعه شده ۵۷/۶ درصد مردان و ۴۲/۴ درصد را زنان تشکیل می‌دادند. میانگین سنی بیماران $۵۸/۷ \pm ۱۱/۱$ و حدود سنی بیماران بین ۳۷ تا ۷۵ سال متغیر بوده است. از کل ۹۰ بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد، ۳۳ نفر (۳۹/۶ درصد) دچار تغییرات آینه‌ای بودند.

حدود سه چهارم بیماران در عرض ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه اول شروع درد سینه و تمام بیماران در عرض ۷ ساعت و ۳۰ دقیقه به بیمارستان مراجعه نموده بودند.

بین میزان سقوط قطعه ST و درگیری کرونر آینه‌ای از نظر آماری ارتباط معنی‌دار وجود نداشت ($p=0/۰۸۴$). همچنین بین میزان سقوط قطعه ST و فاصله زمانی از شروع درد تا زمان تهیه ECG از نظر آماری ارتباط معنی‌داری دیده نشد ($p=0/۲۶$). از میان بیماران با تغییرات آینه‌ای در سطح قدامی (۱۸ نفر)، ۸ بیمار (۴۴ درصد) درگیری شریان کرونر قدامی، نزولی چسب (LAD) را نشان می‌دادند.

از میان بیماران با تغییرات آینه‌ای در سطح تحتانی و بطن راست (۱۳ بیمار)، ۵ بیمار (۲۸ درصد) درگیری شریان کرونر راست (RCA) را نشان می‌دادند. از ۱۸ بیمار با تغییرات آینه‌ای در سطوح خلفی جانسی، ۸ بیمار (۴۴ درصد) درگیری شریان

علیرغم تشخیص تغییرات آینه‌ای سقوط قطعه ST در ECG بیماران دچار انفارکتوس حاد از چند ده قبیل تاکتون، اتیلوژی و اهمیت پرتوگنوستیک آن همواره مورد بحث و اظهارات متناقض بوده است. توافق عمده عموماً بر این مسئله است که بیماران با سقوط قطعه ST در ECG اولیه در طی انفارکتوس حاد، آسیب گسترده‌تری از میوکارد را نسبت به افراد بدون تغییرات فوق‌الذکر متحمل می‌شوند.

به نظر می‌رسد پیش‌آگهی طولانی مدت در این بیماران چندان مطلوب نبوده، اگر چه شواهد تأیید کننده این مسئله محدود و بر اساس مطالعه در گروه‌های کوچک بوده است (۱).

جهت توجیه تغییرات آینه‌ای در ECG دو نظر عمده وجود دارد. اولین نظر، سقوط قطعه ST در ناحیه دور از انفارکتوس را بک پدیده صرفاً الکتریکی مرتبط با میزان بالا رفتن قطعه ST در لیدهای دچار انفارکتوس می‌داند. دوین عقیده، تغییرات آینه‌ای را ناشی از ایسکمی و کاهش پرفیوژن آن مناطق، به عنوان علت اصلی در نظر گرفته است (۱). برخی مطالعات مؤید گرفتاری رگ مربوط به نواحی تغییرات آینه‌ای بوده (۲، ۳، ۴) و برخی هم چنین رابطه‌ای را منکر شده‌اند (۵، ۶، ۷) و نتیجه یکسانی از این مطالعات حاصل نشده است لذا این مطالعه جهت بررسی رابطه این تغییرات با گرفتاری عروق تغذیه کننده سطوح آینه‌ای و اهمیت این تغییرات در یک گروه از بیماران کشور، صورت گرفته است.

مواد و روشها

جمعیت مورد مطالعه: بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از خرداد ۱۳۷۸ تا شهریور ۱۳۷۹ که در الکتروکاردیوگرام علاوه بر تغییرات به صورت بالا رفتن قطعه ST، سقوط قطعه ST را در ناحیه دور از انفارکتوس شناس می‌دادند. بیمارانی که سابقه قبلی انفارکتوس میوکارد با سابقه عمل جراحی با پس کرونر (CABGS) داشتند، بیماران با کمپلکس غیر طبیعی QRS، شامل بلوک‌های شاخه‌ای و بیماران مبتلا به سایر بیماری‌های مهم قلبی، از مطالعه کنار گذاشته شدند. بیماران پس از گذراندن مرحله حاد انفارکتوس و در فاصله حدود یک هفته از زمان وقوع انفارکتوس، مورد آنژیوگرافی واقع

در مطالعه ما در ۳۲-۶۳ درصد (یک سوم تا دو سوم) بیماران با تغییرات آینه‌ای در الکتروکاردیوگرام در گیری همزمان کرونر آینه‌ای ملاحظه شد (۹۵ درصد $CI=$). در مطالعه Norvell روی ۲۷ بیمار با در گیری شریان نزولی قدامی چپ که سقوط قطعه ST در لیدهای تحتانی را نشان می‌دادند در گیری سایر عروق مشاهده نشده و لذا این تغییرات را صرفاً تغییرات الکتریکی محض ارزیابی نمودند (۲) لکن در مطالعه H. Yousif (۴) تکنی کرونر آینه‌ای در دو سوم بیماران مشاهده گردید (۵).

Tendera and Cambel با انفارکتوس تحتانی و سقوط قطعه ST به مدت بیشتر از ۶ ساعت در لیدهای جلوی قلبی (پره کوردیال)، در گیری شریان نزولی قدامی چپ وجود داشته است (۳).

شیوع در گیری چند رگ (multivessel disease) در مطالعه ما ۶۶/۶ درصد و در مطالعه H. Yousif حدود ۷۹ درصد بوده است (۶). Gibson تفاوت معنی داری بین شدت بیماری کرونر در گیر بین دو گروه با و بدون تغییرات آینه‌ای مشاهده ننموده است (۶).

در مطالعه ما بین شدت سقوط قطعه ST و در گیری عروق کرونر آینه‌ای ارتباط معنی داری مشاهده نشد لکن در مطالعه Kiriakidis سقوط عمیق قطعه ST در لیدهای قدامی در طی انفارکتوس تحتانی و مدت طولانی پابرجا بودن آن با تنگی شدید ابتدای شریان نزولی قدامی چپ و ایسکمی دیواره قدامی هم خوانی داشته است (۵). یافته‌های فوق الذکر توسط Salcedo و همکارانش تأیید شده است (۲).

پس از انجام آنژیوگرافی کرونر ۲۷/۳ درصد از بیماران ما کاندید PTCA و ۳۳/۳ درصد آنها کاندید CABGS و بطور کلی ۶۰/۶ درصد بیماران کاندید revascularization شدند.

با توجه به درصد نسبتاً زیاد نیاز به انجام اقدامات درمانی تهاجمی در این بیماران، توصیه انجام آنژیوگرافی کرونر در کلیه بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد همراه با تغییرات آینه‌ای در الکتروکاردیوگرام، منطقی به نظر می‌رسد.

سیرکومفلکس (OM) و (LCX) را نشان می‌دادند.

بطور کلی در ۳۲-۶۳ درصد افرادی که تغییرات آینه‌ای در ECG اولیه را نشان می‌دادند در گیری همزمان کرونر آینه‌ای ملاحظه شد (۹۵ درصد $CI=$).

وجود در گیری چند رگ (multivessel disease) در ۶۶/۶ درصد بیماران دیده شد. ۲۷/۳ درصد بیماران جهت PTCA و ۳۳/۳ درصد بیماران جهت CABGS معرفی شدند. بطور کلی ۶۰/۶ درصد بیماران کاندید انجام revascularization و ۳۹/۴ درصد در مرحله اول تحت درمان دارویی فوار گرفتند.

بحث

از کل بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی با تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد واجد شرایط مطالعه ۳۳ نفر آنان ۳۶/۶ درصد (در ECG اولیه تغییرات آینه‌ای را نشان می‌دادند). میزان شیوع تغییرات آینه‌ای در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد، در مطالعه H. Yousif (۵) ۶۱ درصد بوده است.

تعداد مبتلایان مرد (۷۵/۶ درصد) و تعداد زنان (۲۴/۴ درصد) بوده که با توجه به شیوع بیشتر در گیری کرونر در مردان، منطقی به نظر می‌رسد. میانگین سنی بیماران $58/1 \pm 11/1$ بوده است. حدود سه چهارم بیماران در عرض ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه اول شروع سمتپوم به بیمارستان مراجعه داشته‌اند که از لحاظ زمان لازم جهت دریافت ترومبوولیتیک مطلوب بوده است.

از محدودیت‌های این مطالعه عدم امکان استفاده از گروه شاهد بوده است زیرا با توجه به اینکه انجام آنژیوگرافی کرونر اقدامی تهاجمی است بسیاری از بیماران تمایل به انجام آن ندارند و انجام آنژیوگرافی کرونر در کلیه بیماران به دنبال اولین انفارکتوس حاد میوکارد با و بدون وجود تغییرات آینه‌ای نیز امر پذیرفته شده‌ای نبوده و از نظر اخلاقی پزشکی مجوز کافی ندارد. محدودیت مورد اشاره در دیگر مطالعات انجام شده هم دیده می‌شود.

منابع

1. J.C, Forfar et al. Reciprocal ST Segment changes in acute myocardial infarction; informative or incidental? Quarterly Journal of medicine. 1989; 269: 763-5.
2. Salcedo et al. Significans of reciprocal ST segment depression in anterior precordial leads in acute myocardial infarction: concomitant left anterior descending coronary artery disease AMJ cardiol 1981; 48: 1003-8.
3. Tendera et al. Significance of early and late anterior precordial ST segment depression in inferior myocardial infarction. AMJ cardiol 1984; 45: 215-30.
4. Kyriakidis M et al. Correlation of reciprocal ST segment depression after acute myocardial infarction with coronary angiographic finding International journal of cardiology 1992; 36: 163-8.
5. H, Yousif et al. The diagnostic significance of reciprocal ST segment depression in acute myocardial infarction. Quarterly journal of medicine 1989; 269: 849-55.
6. Gibson RS et al. Precordial ST segment depression during acute inferior myocardial infarction: clinical, significance, and angiographic correlation. Circulation. 1982; 66: 732-41.
7. Shag PK, et al. Non-invasive identification of a highrisk subset of patients with acute inferior myocardial infarction. AMJ cardiol. 1980; 46: 915-21.
8. Thomas R et al. Reciprocal ECG changes in acute myocardial infarction and angiographic correlation. Catheterization and cardiovascular diagnosis 1990; 21: 41-4.
9. Norrel MS et al. Significance of reciprocal ST segment depression: Left ventriculographic observations during left anterior descending coronary angioplasty. JAM coll cardiol 1989; 13: 1220.
10. Quyyumi AA et al. Importance of reciprocal electro cardiographic chages during occlusion of left anterior descending coronary artery studies. Lancet, 1986; 1: 347-50.