

بررسی ارتباط بین نمایه توده بدنی و سرنوشت نهایی در بخش مراقبتها ویژه کودکان مرکز طبی کودکان

دکتر ملیحه کدیبور، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین محمدی نسب، پزشک عمومی

دکتر عباس شاه محمدی، پزشک عمومی

A Survey on Relationship of Body Mass Index to Subsequent Mortality Among Hospitalized Children (In PICU of Children's Hospital Medical Center)

ABSTRACT

This study was designed to determine if body mass Index was predictive of mortality in a sample of seriously ill hospitalized patients in intensive care unit (ICU) of Children's Hospital Medical Center.

There were 160 children from 1 month to 14 years in this prospective study for a period of 3 months in 1377. For all of the patients after calculation of BMI, the relation between age, sex, duration of illness, underlying diseases, positive family history of serious diseases, duration of admission in ICU, history of previous hospitalization, mechanical ventilation, albumin and PRISM score with mortality risk and outcome were determined. The percentile rank of BMI between 15 to 85 accepted as normal according to previous studies.

In this survey the relation between BMI and outcome of the children in ICU were significant ($P=0.0001$). Also this relation was significant with the children in ages of 1 to 6 months, duration of hospitalization less than one or more than seven days, no surgery, mechanically ventilated patients.

BMI, a simple anthropometric measurement of nutrition employed in community epidemiologic studies, has now been demonstrated to be a predictor of mortality in acutely ill children in ICU. Future studies examining variables predictive of mortality should include BMI.

Key Words: Body mass index (BMI); Outcome; Prediction of mortality; Pediatric intensive care unit (PICU)

چکیده

خانوادگی، سابقه بستری در بخش و طول مدت بستری در PICU و تعداد بستری قبلی در بیمارستان، سابقه تهویه مکانیکی، جراحی، میزان آلبومین خون و معیار PRISM بیماران بستری شده در بخش مراقبتها ویژه بیمارستان مرکز طبی اطفال تهران در یک مطالعه مقطعی با انتخاب نمونه‌ها به شکل نمونه‌گیری متوالی غیرتصادفی در طی ۳ ماه در سال ۱۳۷۷ بررسی شود. هدف از این پژوهش مشخص کردن ارتباط بین BMI و میزان مرگ و میر اطفال بستری در

میزان نمایه توده بدنی (BMI) که از رابطه وزن/قد محاسبه می‌شود و میزان طبیعی آن که با توجه به گروه سنی و جنسی بیمار تعیین می‌گردد، در ابتلا به بیماری‌های مختلف و پیش‌بینی مرگ و میر آنها اهمیت دارد. در این مطالعه سعی شده که ارتباط بین نمایه توده بدنی و سرنوشت نهایی در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، در ارتباط با ازمان بیماری، نوع بیماری زمینه‌ای، وجود سابقه بیماری

از معیارهای مختلفی برای ارزیابی کیفیت کار و سرنوشت نهایی بیماران بستره در بخش‌های مراقبت ویژه استفاده می‌شود، از جمله شدت بیماری، نوع و کیفیت مراقبت و نحوه سرویس‌دهی به بیمار(۱). در طی سالهای اخیر به BMI هم به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین سرنوشت نهایی بیماران توجه شده است (۲ و ۳).

موضوع جدید در طب اطفال به شمار می‌رود. این واژه یا معادل فارسی «نمایه توده بدنش» در پیش‌بینی سرنوشت نهایی بیماران مهم می‌باشد.

BMI که از رابطه وزن/قد بدست می‌آید شاخصی است که با سن، جنس، قد و وزن مرتبط می‌باشد. جهت تعیین ترکیب بدنش و میزان چاقی روش‌های مختلفی وجود دارد، شامل یکسری روش‌های کلینیکی (مثل برسی وزن و BMI) و تعدادی روش‌های پاراکلینیکی (چون هیدرودنسیوتومتری، آسکن، CT و...) از بین روش‌های فوق BMI یک معیار معتبر، ساده و ارزان می‌باشد و در عین حال روش بالینی است، که علاوه بر اینکه جهت تعیین میزان ترکیب نامناسب بدن می‌توان از آن استفاده کرد یک وسیله غربالگری خوب در مطالعات ابیدمیولوژی می‌باشد. هرچند که عملی ترین روش همیشه دقیق‌ترین روش نیست اما می‌تواند بهترین روش باشد و این موضوع در ارتباط با BMI دقیقاً صدق می‌کند. آنچه که اهمیت BMI را دوچندان می‌کند قابلیت پیش‌بینی سرنوشت نهایی بیماران می‌باشد(۴). در مطالعات متعدد بخصوص در بزرگسالان BMI به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده مرگ و میر مطرح شده است، به طوری که در بالغین بیماران با نمایه توده بدنش بالاتر و پایین‌تر از حد طبیعی از میزان مرگ و میر بالاتر برخوردارند. یعنی یک رابطه "U" شکل بین BMI و مرگ و میر وجود دارد.(۴ و ۵)

از طرفی BMI شاخص و نشانگر ویژه‌ای است از وضعیت تغذیه‌ای فرد، بخصوص که اهمیت تغذیه صحیح در کودکان به مراتب بیش از بالغین می‌باشد. چراکه وضعیت نامناسب تغذیه می‌تواند روی سلامت مانند بیماری‌های مختلف تأثیر بگذارد. آنچه که بطور رایج تر به عنوان شاخص تغذیه‌ای اطفال مطرح می‌شود وزن کودک است که صحت یا عدم صحت وضعیت تغذیه‌ای فرد را نشان می‌دهد. از طرفی قد منعکس کننده تاریخچه بهداشتی فرد است اما به تنها یک شاخص خوبی جهت پیش‌بینی نیست، چراکه عوامل ارثی هم روی آن تأثیر داشته، اما می‌تواند نشانگر وضعیت تغذیه‌ای فرد در طولانی مدت باشد. لذا از BMI می‌توان به عنوان شاخصی که منعکس کننده تغییرات وزن و قد (هر

PICU) با توجه به متغیرهای فوق الذکر می‌باشد.

در یک مطالعه مقطعی، تعداد ۱۶۰ کودک مشتمل بر ۹۰ نفر پسر (۷۰٪) و ۷۰ نفر دختر (۳۰٪) بستره در U PICU مورد بررسی قرار گرفتند.

براساس این مطالعه به طور کلی، میزان مرگ و میر در بیماران با BMI غیرطبیعی (۷۱ نفر) نسبت به افراد با BMI طبیعی (۸۹ نفر) بررسی شده در PICU مرکز طبی کودکان تهران به طور معنی‌داری بالاتر می‌باشد (۱۵٪ P=۰.۰۰۰۰۱)، کمتر از ۸۵٪ بالاتر از BMI می‌باشد.

براساس منابع معتبر و جداول خاص سن و جنس مختلف غیرطبیعی تلقی شد. نتیجه فوق در گروه سنی یک تا شش ماه در بیمارانی با طول مدت بستره در PICU کمتر از یک روز و یا بیشتر از ۷ روز، در کودکان با معیار PRISM مساوی یا بالاتر از ۱۰، در بیماران بدون سابقه جراحی و سابقه مثبت از نظر نهایی مکانیکی معنی‌دار شد (P<۰.۰۵).

از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که میزان BMI می‌تواند به عنوان یکی از معیارها جهت تعیین سرنوشت نهایی بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات مخفف مورد استفاده در متن

درجه‌بندی آپاچی

1. APACHE: Acute Physiology Chronic Health Evaluation
2. BMI:Body Mass Index
3. ICU: Intensive Care Unit
4. MOIDS: Multiple Organ Dysfunction Syndrome

بخش مراقبتها ویژه

اختلال عملکرد چند عضو

نمایه توده بدنش

بخش مراقبتها ویژه

5. PICU: Pediatric Intensive Care Unit

درجه خطر مرگ و میر کودکان

6. PRISM: Pediatric Risk of Mortality Scoring System

سیستم درجه‌بندی مداخلات درمانی

7. TISS: Therapeutic Intervention Scoring System

مقدمه

با توجه به روند گسترش و پیشرفت طب در مراقبتها ویژه و نگهداری از بیماران بدحال که هزینه زیادی را معطوف خود می‌کند

(PRISM) سیستم تمرددی است که براساس فرم مربوطه برای بیمار پر شده و نشانگر و خامت بیماری است، طول مدت بستره در PICU، سابقه قبلی بستره در این بخش، تعداد بستره قبلی در بیمارستان، سابقه تهیه مکانیکی، سابقه جراحی، میزان آلبومین خون بررسی یا محاسبه گردید (جدول شماره ۱). لازم به ذکر است که بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان دارای ۷ تخت با توانایی مراقبت از بیماران بسیار بدخل داخلی و جراحی به عنوان یک مرکز ارجاعی در سطح سوم مراقبتی محسوب می‌شود.

در این مطالعه برای محاسبه BMI هر بیمار از جدول موجود BMI بر حسب سن و جنس استفاده به عمل آمده و میزان طبیعی در محدوده ۱۵-۸۰٪ در نظر گرفته شده است.

یافته‌ها

در مجموع از ۱۶۰ بیمار بررسی شده در طول سه ماه /۲/۵۶٪ پسر و /۴۳/۸٪ دختر بودند که /۴/۴٪ BMI غیرطبیعی داشتند و از این تعداد /۷/۰۵٪ زنده و /۳/۴٪ فوت کردند. /۶/۵۶٪ BMI طبیعی داشتند که از این تعداد /۸/۸۸٪ زنده و /۲/۱۱٪ فوت نمودند. (P=۰/۰۰۰۱) (جدول شماره ۲).

در گروههای مختلف سنی هم بررسی انجام شد، اما فقط در گروه سنی یک ماه تا شش ماه نتیجه فوق معنی دار بود (P=۰/۰۰۰۹۱). در جنس مذکور از بین کسانی که BMI طبیعی داشتند /۳/۵۸٪ زنده و /۷/۴۱٪ فوت کردند. در گروه جنسی مؤنث از کسانی که BMI طبیعی داشتند /۳/۵۸٪ فوت کردند و از کسانی که BMI طبیعی داشتند /۶/۵۶٪ زنده و /۵/۴۳٪ فوت کردند.

در خصوص بیماری‌های زمینه‌ای ارتباط بین BMI و سرنوشت نهایی معنی دار نبود. ۸۲ بیمار دچار بیماری حاد بود که ۴۸ نفر (۲/۵۸٪) آنها BMI طبیعی داشته که از این تعداد ۴۱ نفر زنده (۰/۸۵٪) و ۷ نفر (۰/۱۴٪) فوت کردند و از ۳۴ نفر با BMI غیرطبیعی (۸/۵۸٪) زنده و (۲/۴۱٪) فوت کردند. در زمینه بیماری حاد و مزمن نتیجه فوق ارتباط BMI و سرنوشت نهایی معنی دار بود (P=۰/۰۶).

دو) می‌باشد استفاده کرد، از اینرو با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته شاید از BMI نیز بتوان به عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده مرگ و میر کوکان بیمار استفاده کرد. (۷و۶). در بالغین افزایش BMI همراه با افزایش مرگ و میر می‌باشد (۵و۴). در کوکان ارتباط بین BMI و فشار خون، تغییرات لیپوپروتئین، دیابت و آترواسکلروز ثابت شده است (۶و۹و۸).

در یک بررسی هم گروهی آینده‌نگر BMI در جوانان پسر با وزن بالا ($> 75^{\text{th}}$) خطر مرگ ناشی از علل مختلف از جمله بیماری عروق کرز، آترواسکلروز، بیماری عروق مغزی و بدخیمی کولورکتال را افزایش می‌دهد (۷). در مطالعه‌ای در بیماران بستره در بیمارستان ارتباط "U" شکل بین BMI و سرنوشت نهایی بدست نیامده، بطوريکه در برخی بیماریها نظیر نارسایی احتقانی قلب، بیماری مزمن تنفسی، سیروز و سرطان BMI بالا حتی اثر محافظتی روی بیمار داشته، اما در بیماری حاد تنفسی و اختلال عملکرد چند عضو (MODS) BMI بالا با افزایش خطر مرگ و میر همراه بوده است. اما در همین مطالعه و دیگر بررسی‌ها کمتر از ۱۵٪ به عنوان یک عامل مستقل و قابل توجه در پیش‌بینی میزان مرگ و میر کلیه بیماران بستره به دست آمده است (۱۱و۱۲). لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط سرنوشت نهایی بیماران بستره در PICU با BMI صورت پذیرفته، البته عوامل دیگری هم که ممکن بوده در این بررسی تأثیر بگذراند نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

روش و مواد

مطالعه به صورت هم گروهی آینده‌نگر شامل کلیه بیمارانی بود که در طول ۳ ماه در بخش مراقبتهای ویژه کوکان (PICU) مرکز طبی بستره گردیده‌اند. پس از بستره، بیمار معاينه شده، آزمایشات لازم درخواست و فرم‌های مربوطه تکمیل می‌شد. بیماران به دو گروه BMI طبیعی و غیرطبیعی با استفاده از جداول موجود تقسیم شدند. در نهایت در طول ۳ ماه بررسی ۱۶۰ بیمار مطالعه گردید. برای کلیه بیماران علاوه بر BMI، سرنوشت نهایی، سن، جنس، نوع بیماری زمینه‌ای، ازمان بیماری، سابقه بیماری خانوادگی، درجه

جدول شماره ۱- معیار درجه‌بندی پریسم (PRISM)

درجه	دامتة متغیرها و محدودیت سنی		متغیر
۲	کودک ۱۵۰-۲۰۰	شیرخوار ۱۳۰-۱۶۰	فشار خون سیستولیک (mmHg)
۲	۶۵-۷۵	۵۵-۶۵	
۶	> ۲۰۰	> ۱۶۰	
۶	۵۰-۶۴	۴۰-۴۵	
۷	< ۵۰	< ۴۰	
۶	تمام سنین < ۱۱۰		فشار خون دیاستولیک (mmHg)
۴	کودک > ۱۵۰	شیرخوار > ۱۶۰	میزان ضربان قلب (bpm)
۴	< ۹۰	< ۹۰	
۱	کودک ۵۱-۹۰	شیرخوار ۶۱-۹۰	تعداد تنفس
۵	> ۹۰	> ۹۰	
۵	آپنه	آپنه	
۲	تمام سنین ۲۰۰-۳۰۰		فشار اکسیژن به درصد اکسیژن
۳	< ۲۰۰		دربافنی $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$
۱	تمام سنین ۵۱-۶۵		فشار گاز کربنیک
۵	> ۶۵		PaCO_2
۶	تمام سنین < ۸		درجه هوشیاری GCS
۴	نامساوی با دبلاته	تمام سننی	واکنش مردمک
۱۰	ثابت و دبلاته		
۲	تمام سنین ۱/۵ برابر کنترل		PT/PTT
۶	سن بیش از ۱ ماه < ۳/۵		بیلی روبین کل (mg/dl)
۱	تمام سنین ۳-۳/۵		پتاسیم (mEq/L)
۱	۶/۵-۷/۵		
۵	< ۳		
۵	> ۷/۵		
۲	تمام سنین ۷-۸		کلسیم (mg/dl)
۲	۱۲-۱۵		
۶	< ۷		
۶	> ۱۵		
۴	تمام سنین ۴۰-۶۰		گلوکز (mg/dl)
۴	۲۵۰-۴۰۰		
۸	< ۴۰		
۸	> ۴۰۰		
۲	تمام سنین < ۱۶		بیکربنات (mEq/L)
۲	> ۳۲		
جمع‌بندی درجات متغیر (PRISM Score)			

توانسته است نقش خود را از طریق BMI بیشتر نشان دهد. به علاوه ۲۰٪ بیماران مورد مطالعه نیز در این گروه قرار داشتند که بیشترین میزان بیماران را به خود اختصاص داده بودند. در بالغین نیز تا سن ۷۵ سالگی میزان BMI کمتر یا بیشتر از محدوده طبیعی با افزایش مرگ و میر همراه بوده است.(۴).

در ارتباط با بیماری‌های زمینه‌ای هم عمدتاً کسانی که BMI طبیعی داشتند از شناسن زنده ماندن بیشتری برخوردار بودند. ولی از آنجایی که ۱۶۰ بیمار در بین ۱۱ گروه بیماری تقسیم شدند و در هر گروه تعداد محدودی بیمار حضور داشتند از نظر آماری نتایج معنی‌داری بدست نیامد و از طرفی خود بیماری زمینه‌ای شاید به نحوی توانسته است مستقل از BMI روی سرنوشت نهایی تأثیر بگذارد. در یک مطالعه روی بالغین دیده شده است که در بیماران بستری کسانی که BMI کمتر از طبیعی داشتند خطر مرگ و میر افزایش یافته، در حالی که BMI بالاتر از طبیعی با مرگ و میر در بیماران بستری همراه نبوده و از طرفی در برخی بیماریها مثل سرطان و سیروز BMI بالاتر از حد طبیعی می‌تواند نقش محافظت کننده داشته باشد(۱۱).

در مطالعه روی هر دو جنس بین BMI و سرنوشت نهایی رابطه منطقی و معنی‌داری وجود داشت و در هر دو گروه جنسی کسانی که BMI طبیعی داشتند شناسن زنده ماندن بیشتری نیز ملاحظه شد. در مورد سابقه بستری در بیمارستان چه در کسانی که سابقه بستری قبلی در بیمارستان نداشتند و با کسانی که دوبار یا بیشتر بستری شده بودند بین BMI و سرنوشت نهایی ارتباط معنی‌داری وجود داشت. شاید بتوان گفت در این گروهها BMI توanstه است اثر محافظتی خود را اعمال نماید.

در بیمارانی که سابقه تهییه مکانیکی داشتند، با BMI طبیعی شناسن زنده ماندن بیشتر بود، مسأله فوق می‌تواند بیانگر این موضوع باشد که حتی در بیمارانی که به نحوی دچار و خامت حال هستند BMI طبیعی اثر محافظتی خود را اعمال می‌نماید($P=0.01$).(۵). از طرفی و خامت حال بیماران با توجه به درجه PRISM پایین تر یا بالاتر از ۱۰، کسانی بیشتر شناسن زنده ماندن داشتند که BMI آنها در محدوده طبیعی بود ($P=0.02$). لذا همانند مطالعه بر روی بیماران بدهال بزرگسال ICU میزان BMI با سرنوشت نهایی در رابطه بوده است(۱۱).

در بیمارانی که آلبومین خون آنها کمتر از طبیعی بود بین BMI و سرنوشت نهایی ارتباط معنی‌داری وجود نداشت، اما بیمارانی که میزان آلبومین در محدوده طبیعی داشتند این ارتباط معنی‌دار بود. در

در کل بیماران ۵۹ نفر کمتر از ۱ روز و ۲۳ نفر بیش از ۷ روز بستری بودند که کسانیکه طول مدت بستری کمتر از یک روز و مساوی یا بیش از ۷ روز در PICU داشتند نتیجه فوق معنی‌دار بود ($P=0.009$).

بیمارانی که معیار PRISM کمتر از ۱۰ داشتند و BMI طبیعی بود ۹۵٪ زنده و ۴۷٪ فوت کردند واز بین کسانی که BMI غیرطبیعی بود ۷۵٪ زنده و ۲۵٪ فوت کردند ($P=0.02$) واز کسانی که PRISM غیرطبیعی داشتند ۳۵٪ زنده و ۶۴٪ فوت کردند ($P=0.06$). در کسانی که سابقه بستری در PICU داشتند ارتباطی بین BMI و سرنوشت نهایی معنی‌دار بود ($P=0.012$). این مسأله در ارتباط با کسانی که هیچگونه سابقه‌ای از جراحی نداشتند و سابقه تهییه مکانیکی داشتند و میزان آلبومین خون آنها بیش از ۳/۵ mg/dl بود نیز صادق می‌باشد و ارتباط معنی‌دار بود ($P=0.0004$ و $P=0.0003$).

جدول شماره ۲- ارتباط بین BMI و سرنوشت نهایی بیماران بستری در PICU مرکز طی کودکان

BMI	جمع	طبیعی	غيرطبیعی	سرنوشت نهایی
زنده	(۷۵/۱۲۰)	(۵۷/۷۱)	(۲۸/۸)	(۷۹)
فوت	(۲۵/۴۱)	(۴۲/۳۰)	(۱۱/۲)	(۱۱)
جمع	(۱۰۰/۱۶۱)	(۷۱)	(۵۵/۶)	(۸۹)

$P=0.0001$

بحث

به طور کلی در این مطالعه مشاهده شد کسانی که BMI آنها در محدوده طبیعی بود شناسن زنده ماندن بیشتری داشتند. در بالغین نیز نتیجه‌ای مشابه بدست آمده یعنی کسانی که BMI پایین تر یا بالاتر از حد طبیعی دارند مرگ و میر بیشتری از بیمارانی که BMI آنها طبیعی بوده داشته‌اند(۵).

در این بررسی در گروههای مختلف سنی هر چند که در کل بیمارانی که BMI طبیعی داشتند از شناسن زنده ماندن بیشتری برخوردار بودند، اما از نظر دامنه سنی این مسأله از نظر آماری فقط در گروه سنی یک تا شش ماه معنی‌دار بود ($P=0.00091$). شاید به این دلیل که در این گروه سنی عوامل محافظت کننده دیگری از جمله مراقبت بیشتر و تغذیه بهتر و مناسبتر (از جمله شیر مادر)

نگریسته می شود(۱۱ و ۱۲)، چنانچه در این مطالعه هم بین میزان BMI و سرنوشت نهایی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه ارتباط وجود داشت. در آینده نیاز است که در مطالعات گستردۀ تر و طولانی مدت علاوه بر معیارهای معمول بررسی سرنوشت نهایی بیماران و سیستمهای نمره دهنده همانند APACHE در بالغین و یا PRISM و TISS در کودکان به BMI توجه بیشتری معطوف گردد.

تشکر

بدینوسیله از راهنمای جناب آقای دکتر احمد حداداد، همکاری کلیه استادان، دستیاران، برستاران یخیل مراقبتهای ویژه کودکان، جناب آقای دکتر کیانی و سرکار خانم خامنه که در انجام این تحقیق باریگر ما بوده‌اند سپاس گزاری می‌شود.

منابع

- Pollack MM, Ruttimann UE, Getson PR. Accurate prediction of the outcome of pediatric Intensive care. New Eng J Med, 1987; 316: 134-139.
- Moreno R, Apolone G. Impact of different customization startegies in the performance of a general severity score. Crit Care Med, 1997; 25: 2001-2003.
- Hanson CW, Deutschman CS, Anderson HL et al. Effects of an organized critical care service on outcomes and resource utilization. Crit Care Med, 1999; 27: 270-274.
- Stevens J, Cai J, Pamuk ER et al. The effect of age on the association between body mass index and mortality. New Engl J Med, 1997; 338: 1-7.
- Lesser GT. Age, body-mass index and mortality (letter New Engl J Med, 1998; 338: 1158-1159.
- Rosner B, Prineas RB. Percentiles of body mass index in US Children. J Pediatr, 1998; 132: 211-220.
- Dietz WH. Use of BMI. J Pediatr, 1998; 132: 191-192.
- Spiegelaere MDe, Hennart DP. Socioeconomic status and changes in body mass from 3 to 5 years. Arch Dis Child, 1998; 78: 477-478.
- Andersen RW, Crespo CJ, Bartlett SJ et al. Relationship of physical activity and TV watching and body weight. JAMA, 1998; 279: 938-942.
- Cbarney E. Childhood obesity, the measurable and the meaningful. J Pediatr, 1998; 132: 193-195.
- Gallanos AN, Pieper CF, Kussin PS et al. Relationship of body mass index to subsequent mortality among seriously ill hospitalized patients. Crit Care Med, 1997; 25: 1962-1968.
- Oud L. Body mass index and the hospitalized patient: A "mean" outcome for the "lean". Crit care Med, 1997; 25: 1983-1940.

توجهی می‌توان گفت که بیمارانی که آلبومین در محدوده طبیعی دارند و از وضعیت تغذیه‌ای مناسبتری برخوردار بوده، احتمالاً علاوه بر اینکه از سوء تغذیه رنج نبرده از سطوح دیگر مراقبتی نیز بالطبع بهره می‌برند. به علاوه تعداد کودکانی که آلبومین کمتر از حد طبیعی داشته‌اند در کل مطالعه بسیار پایین بود (۶ نفر) که این مسئله هم بروی عدم وجود ارتباط با BMI و سرنوشت نهایی بیماران بستری تاثیر گذاشته است.

اگرچه قبل از BMI در مطالعات ایدمیولوژی بلندمدت جهت بررسی احتمال خطر برخی از بیماریها همچون افزایش فشار خون، دیابت، اتروسکلروز و... استفاده می‌شده، اما امروزه به به عنوان معیاری جهت بررسی سرنوشت نهایی بیماران بستری هم