

بررسی مقایسه‌ای اثر پروستاگلاندین داخل سرویکس و اکسی‌توسین داخل وریدی در القاء زایمان ترم

دکتر رباب بهدانی، عضو هیات علمی گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر رقیه مقیمی، عضو هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شادی خاوری دانشور، متخصص جراحی زنان و زایمان

Comparative Study of Intracervical Prostaglandin E2 and Intravenous Oxytocin for Induction of Term Labor

ABSTRACT

A randomized clinical trial study was undertaken to evaluate the effect of intravenous oxytoxin (50 cases) and intracervical prostaglandin E2 (0.5 mg Tab, 50 cases) on the ripening of the cervix and frequency of successful inductions in patients with low Bishop score (< 5).

Means of maternal age, gestational age, parity, BS at admission didnot show any significant differences between the two groups. Until 6 hrs after begining treatment, 72% of oxytocin group and 74% of PGE2 group were achieved active labor and until 12 hrs, 70% and 76% delivered respectively. It was no statistically significant difference. The mean drug administration to delivery time was 7.3 ± 3.1 hrs in oxytocin group and 7.6 ± 3.1 hrs in PGE2 group (without significant difference). No difference in route of delivery was found between the two groups. Maternal complications were seen in 60% of oxytocin group and 46% of PGE2 group, without significant difference. Between maternal complications, frequency of diarrhea was higher at PGE2 group ($P=0.02$). Fetal Complications were seen 4% in the PGE2 group and 16% in oxytocin group, that was less in the first. ($RR = 0.25$ CI 95% : 0.06-0.97

$P<0.05$).

Key Words: Intracervical prostagland E2; Induction of labor; Cervical ripening

چکیده

میلی‌گرمی) قرار گرفتند. پس از تجویز دارو، در هر ساعت معاينة و ارزیابی از نظر (BS) Bishop score و کنترل انقباضات رحمی از هر دو گروه بعمل می‌آمد و فضمن ثبت علامت حیاتی مادر و ضربان قلب جنبن، هر گونه عوارض احتمالی مادری یا جنینی کنترل می‌شد. بیماران دو گروه از نظر میانگین سن، پاریتی، میانه BS در زمان

طبی یک کارآزمایی بالینی تصادفی، اثر پروستاگلاندین داخل سرویکس و اکسی‌توسین داخل وریدی در القاء زایمان ترم، در ۱۰۰ خانم واجد شرایط در بیمارستان آرش در سال ۱۳۷۸ بررسی و مقایسه شد. پس از معاينة و کسب موافقت آگاهانه، به طور تصادفی ۵۰ نفر در گروه درمانی اکسی‌توسین با انفوژیون داخل وریدی و ۵۰ نفر در گروه درمانی پروستاگلاندین E2 داخل سرویکس (فرص ۵/۰)

ذکر شده است.

طبق گزارشات موجود استفاده از ترکیبات با دوز کم پروستاگلاندین احتمال موفقیت القاء زایمان ترم را افزایش داده، میزان بروز زایمان طولانی را کاهش می‌دهد و نیاز به دوز کلی و خداکثرا اکسی توسین را کم می‌کند. انتظار می‌رود که تقریباً نیمی از زنانی که با این روش تحت درمان قرار می‌گیرند، ظرف ۲۶ ساعت وارد مرحله زایمانی شده وضع حمل تماشند^(۱). برخی از مطالعات حاکی از کاهش میزان سزارین در هنگام استفاده از پروستاگلاندین جهت القاء زایمان می‌باشند^(۹,۸,۶) ولی در اکثر مطالعات کاهش چشمگیری در میزان سزارین ذکر نشده است^(۱۱,۱۰,۴).

عوارض سیستمیک این دارو تب، استفراغ و اسهال ذکر گردیده‌اند که در صورت استفاده از دوز کم دارو قابل چشم‌پوشی هستند^(۱).

پیش‌آگهی نوزادان هنگام استفاده از پروستاگلاندین مشابه استفاده از اکسی توسین برای القاء زایمان ذکر شده است^(۱).

از آنجاکه در زمینه عملی در بسیاری از مراکز درمانی کشور ما بخصوص مراکز غیردانشگاهی، القاء زایمان با اکسی توسین بدليل عدم وجود پرستال کافی و وزیزیه خطروناک محسوب شده و در سرویکس نامناسب القاهای طولانی مدت با اکسی توسین پیش‌بینی می‌شود و از طرفی در زمینه استفاده صحیح و بجای پروستاگلاندین در القاء زایمان در کشور ما کار جدی و خاصی انجام نشده است، لذا بر آن شدیدم تا اثربخشی، فواید و نتایج حاصل از مصرف پروستاگلاندین E2 داخل سرویکس را در امر القاء زایمان ترم، در یک کارآزمایی بالینی تصادفی بررسی کرده و اثر آن را با انفوزیون داخلی وریدی اکسی توسین مقایسه نمایم.

روش و مواد

جامعه مورد مطالعه خانم‌های بارداری بودند که با اندیکاسیون ختم حاملگی در بیمارستان روئین تن آرش در سال ۱۳۷۸ بستره می‌شدند.

شرایط ورود به مطالعه داشتن سن حاملگی بیشتر یا مساوی از ۳۷ هفته، BS > ۵، پاریتی کمتر یا مساوی از ۴ و پرزانتاسیون سفالیک بود که به علت گذشتن از موعد زایمان، پارگی زودرس کیسه آب، عقب‌افتادگی رشد داخل رحمی، کاهش مایع، احساس کاهش حرکت جنین توسط مادر و یا پره‌اکلامپسی کاندید ختم

پذیرش، سن حاملگی و علت ختم حاملگی با یکدیگر اختلاف معنی دار آماری نداشتند، در ۷۷٪ از گروه اکسی توسین و ۷۴٪ از گروه پروستاگلاندین، ۶ ساعت پس از تجویز دارو، زایمان فعال شروع شد و به ترتیب در ۷۰٪ و ۷۶٪ تا ۱۲ ساعت پس از تجویز دارو زایمان انجام گردید. در هیچیک از موارد مذکور بین دو گروه اختلاف آماری معنی دار وجود نداشت. میانگین فاصله زمانی از تجویز دارو تا انجام زایمان در دو گروه به ترتیب $3/1 \pm 7/3$ و $7/6 \pm 3/1$ ساعت و بدون اختلاف معنی دار آماری بود. نحوه انجام زایمان در بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی دار نداشت. ۶۰٪ گروه اکسی توسین و ۴۶٪ گروه پروستاگلاندین دچار عوارض مادری شدند که آزمون آماری اختلاف بین دو گروه را معنی دار نشان نداد. در بین عوارض مادری، میزان بروز اسهال در گروه پروستاگلاندین بطور برجسته بیش از گروه اکسی توسین بود (P=0.02). موارد ابتلاء عارضه جنینی بطور چشمگیر در گروه پروستاگلاندین کمتر از گروه اکسی توسین بود (۴٪ در برابر ۱۶٪) (RR=0.05) P<0.97/0.95 CI: 0.06-0.25.

مقدمه

استفاده از انواع پروستاگلاندین‌ها به عنوان محركی در القاء زایمان در هر یک از سه ماهه‌های حاملگی و نیز جهت شروع زایمان توم ذکر شده است^(۳,۲,۱). پروستاگلاندین‌ها عموماً متقبض کننده رحم محسوب شده و در هر مرحله‌ای از بارهای که تجویز شوند، موجب انتقاضات مؤثر رحمی و ایجاد سقط یا زایمان می‌گردند^(۱).

تجویز خوراکی یا داخل و اریانال پروستاگلاندین حتی در بیمارانی که قبل از سزارین شده‌اند، به اندازه اکسی توسین داخل وریدی مؤثر می‌باشد^(۳).

در مطالعات متعددی ذکر شده است که استفاده از پروستاگلاندین‌ها در مواردی که سرویکس جهت القاء زایمان مناسب نمی‌باشد، اثر واضح‌تر و بهتری از اکسی توسین دارند^(۶,۵,۴).

در مطالعه‌ای میزان موفقیت جهت القاء زایمان هنگام استفاده از پروستاگلاندین ۸۲٪ و با اکسی توسین ۶۵٪ بوده است^(۷). در تحقیقی میانگین فاصله زمانی از استعمال پروستاگلاندین تا انجام زایمان ۹/۵ ساعت (۴) و در تحقیق دیگر ۱۳/۳ ساعت (۸)

امروز شروع شده و هر ۱۵ دقیقه ۲ MIU/min MIU/min تا حصول انتقباضات قابل قبول افزایش داده می‌شد. (حداکثر دوز آن ۴۰ MIU/min تعیین شد). در این گروه نیز معاینه واژینال هر یک ساعت صورت می‌گرفت.

در هر دو گروه ضمن ثبت علایم حیاتی بیمار و خسروان قلب جنین هرگونه عوارض احتمالی بوجود آمده در مادر یا جنین یادداشت و در صورت لزوم کنترل می‌شد.

پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، داده‌پردازی توسط نرم‌افزار SPSS و آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمونهای χ^2 و Fisher's exact test و Mann-Whitney-U-test شد. خطر نسبی (Relative Risk) و CI ۹۵٪ در موارد لزوم محاسبه گشت.

یافته‌ها

در این مطالعه ۵۰ خانم با اکسی‌توسین و ۵۰ خانم با پروستاگلاندین جهت القاء زایمان ترم تحت درمان قرار گرفتند. اکثریت بیماران در هر دو گروه راگروه سنی ۲۱-۲۵ سال تشکیل می‌دادند. ۶۰٪ گروه اکسی‌توسین و ۶۴٪ گروه پروستاگلاندین اول زا بودند.

حامنگی محسوب می‌شند. شرایط خروج از مطالعه عبارت بودند از: حامنگی چندقلوی، داشتن اندیکاسیونی جهت ختم فوری حامنگی (پرولاپس بند ناف، هرگونه زجر جنینی که از قبل موجود باشد، دفع مکونیوم غلیظ و پره‌اکلامپسی شدید، لروم سزارین (به دلیل عدم تناسب سر جنین و لگن مادر)، هرگونه اسکار رحمی قبلی، سابقه نازابی و استفاده از روشاهای کمک‌بازاری) و نیز موارد منع مصرف پروستاگلاندین (بیماری قلبی، آسم، گلوکوم و یا حساسیت دارویی). در طول یکسال ۱۰۰ خانم واجد شرایط برای ورود به مطالعه انتخاب شدند و پس از کسب رضایت آگاهانه از آنها، با استفاده از بلوکهای تصادفی در دو گروه ۵۰ نفری قرار گرفتند. چهار رزیدنت ارشد زنان و زایمان بطور هماهنگ شده مسؤول مصاحبه، معاینه و تجویز دارو و پیگیری آن تا انتهای بودند. پس از بستره و کسب اطلاعات لازم، برای هر یک از اعضاء گروه قرص، ۵۰ میلی‌گرمی پروستاگلاندین E2 در کاتال سرویکس، حدود سوراخ داخلی گذاشته شده و بیمار به مدت نیم ساعت از برخاستن منع گردید. هر یک ساعت معاینه واژینال از نظر BS و کنترل انتقباضات رحمی صورت می‌گرفت. در صورت بهبودی BS (< 6) و شروع انتقباضات فعال زایمانی، فاصله زمانی از استعمال دارو ثبت می‌شد. در صورتی که پس از ۶ ساعت از استعمال دارو تغییر واضحی در BS و انتقباضات رحمی رخ نمی‌داد، القاء زایمان با اکسی‌توسین آغاز می‌شد.

در گروه دیگر اکسی‌توسین به صورت انفузیون داخل وریدی

جدول ۱- توزیع فراوانی ویژگی‌های دمografیک و مامایی در دو گروه اکسی‌توسین و پروستاگلاندین (بیمارستان آرش، سال ۱۳۷۸)

| سطح معنی‌داری* | گروه اکسی‌توسین | | سن |
|----------------|-----------------|----------|----------------|
| | n = ۵۰ | n = ۵۰ | |
| NS | ۲۲/۴ ± ۴/۱ | ۲۴/۲ ± ۵ | |
| NS | ۱/۵ ± ۰/۸ | ۱/۷ ± ۱ | پاریتی |
| | | | زمان پذیرش: BS |
| NS | ۲۵ (٪۶۰) | ۲۷ (٪۵۴) | ۱-۳ |
| NS | ۱۵ (٪۳۰) | ۲۳ (٪۴۶) | ۴-۵ |
| | | | نوع زایمان: |
| NS | ۴۱ (٪۸۲) | ۲۶ (٪۷۲) | واژینال |
| NS | ۹ (٪۱۸) | ۱۴ (٪۲۸) | سزارین |

ارقام بصورت میانگین ± انحراف معیار و یا فراوانی (%) داده شده است.

* بر اساس آزمون χ^2 (NS = Not Significant)

| فواصله زمانی تا شروع گروه اکسی‌توسین | گروه پروستاگلاندین | فواصله زمانی از بستوی تا اتمام مرحله دوم زایمان فعال در دو گروه اکسی‌توسین و پروستاگلاندین (پارستان آرش سال ۱۳۷۸) | جدول ۳- فاصله زمانی از بستوی تا اتمام مرحله دوم زایمان فعال در دو گروه اکسی‌توسین و پروستاگلاندین (پارستان آرش سال ۱۳۷۸) |
|--------------------------------------|--------------------|---|--|
| زایمان (ساعت) | راحتی مرحله دوم | فراآوانی (%) | فراآوانی (%) |
| < ۶ | ۱۴ (۳۷/۸) | ۱۶ (۳۹) | ۱۴ (۳۷/۸) |
| ۷-۱۲ | ۲۱ (۵۶/۷) | ۲۲ (۵۳) | ۲۱ (۵۶/۷) |
| > ۲ | ۱ (۲/۷) | ۳ (۷/۳) | ۱ (۲/۷) |
| جمع | ۲۶ (۱۰۰) | ۴۱ (۱۰۰) | ۲۶ (۱۰۰) |

در بین عوارض مادری، بروز اسهال در دو گروه دارای اختلاف معنی دار آماری بود ($P = 0.02$). فراآوانی آن در گروه پروستاگلاندین ۶ مورد و در گروه دیگر صفر بود.

عوارض جنینی شامل تغییرات پاتولوژیک ضربان قلب جنین بطور معنی دار در گروه پروستاگلاندین کمتر مشاهده شد (۴٪) در مقابله با ۱۶٪ ($P = 0.04$ ، $CI = 0.06 - 0.97$).

موردهی از آپگار زیر ۵ و ۷ در دقایق اول و پنجم، تشنج در ۲۴ ساعت اول و نیاز به مراقبت‌های ویژه در هیچیک از دو گروه دیده نشد.

بحث

در این مطالعه بین دو گروه تحت درمان (اکسی‌توسین و پروستاگلاندین) از نظر سن، سن حاملگی، پاریتی و BS تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.

میزان موفقیت هر دو دارو در القاء زایمان ترم مشابه بود. انجام زایمان در اکثریت موارد هر دو گروه تا ۱۲ ساعت پس از استعمال دارو صورت گرفت (۷۰٪ در گروه اکسی‌توسین و ۷۶٪ در گروه پروستاگلاندین).

در برخی گزارشات اثر پروستاگلاندین در القاء زایمان ترم در مواردی که سرویکس مناسب نمی‌باشد، واضح‌تر و بهتر از اکسی‌توسین ذکر شده است (۱۲,۶,۴).

در مطالعه‌ای، میزان موفقیت، جهت القاء زایمان هنگام استفاده از پروستاگلاندین ۸۲٪ و یا اکسی‌توسین ۶۵٪ بوده است (۷).

میانگین فاصله زمانی از استعمال دارو تا انجام زایمان در مطالعه

میانگین سنی و پاریتی و توزیع آن، میانه BS و نوع زایمان بین دو گروه فاقد اختلاف معنی دار آماری بود (جدول ۱) خطر تسیبی سازارین در گروه پروستاگلاندین نسبت به گروه اکسی‌توسین ۶۴٪ بودست آمد (CI: ۰/۳۷ - ۱/۳۵).

بیشترین علت ختم حاملگی در گروه اکسی‌توسین، پارگی زودرس کیسه آب و در گروه پروستاگلاندین گذشتن از موعد زایمان بود.

میانگین فاصله زمانی از بستوی تا شروع زایمان فعال در گروه اکسی‌توسین $3 \pm 4/7$ ساعت و در گروه پروستاگلاندین $5 \pm 2/8$ ساعت بودست آمد که از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت. در اکثریت موارد هر دو گروه تا ۶ ساعت پس از تجویز دارو زایمان فعال شروع شد. (به ترتیب ۷۲٪ و ۷۴٪) (جدول ۲).

جدول ۲- فاصله زمانی از بستوی تا شروع زایمان فعال دو گروه اکسی‌توسین و پروستاگلاندین (پارستان آرش سال ۱۳۷۸)

| فواصله زمانی تا شروع گروه اکسی‌توسین | گروه پروستاگلاندین | زایمان فعال (ساعت) | تعداد (%) |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| < ۳ | ۱۶ (۳۳/۶) | ۱۶ (۳۸) | ۱۶ (۳۸) |
| ۴-۶ | ۲۰ (۴۴) | ۲۰ (۴۶) | ۱۸ (۳۶) |
| ۷-۹ | ۱۹ (۴۸/۹) | ۱۹ (۱۸/۹) | ۹ (۱۸) |
| > ۱۰ | ۲ (۴/۲) | ۲ (۴/۲) | ۴ (۸) |
| جمع | ۴۷ (۱۰۰) | ۵۰ (۱۰۰) | ۵۰ (۱۰۰) |

۳ نفر در این گروه به دلیل شروع نشدن زایمان فعال با تشخیص عدم پیشرفت سازارین شدند.

میانگین فاصله زمانی از بستوی تا انجام مرحله دوم زایمان در گروه اکسی‌توسین $3/1 \pm 3/2$ ساعت و در گروه پروستاگلاندین $3/1 \pm 6/7$ ساعت و بدون اختلاف معنی دار آماری بود. اکثریت موارد در هر دو گروه تا ۱۲ ساعت پس از مصرف دارو زایمان کردند (به ترتیب ۷۰٪ و ۷۶٪) (جدول ۳).

عارضه مادری (شامل تهوع، استفراغ، اسهال، تاکی‌کاردی، باقیماندن جفت و نیاز به خروج آن با دست، افزایش خونریزی پس از زایمان، تحریک بیش از حد رحم و تب) در ۶۰٪ گروه اکسی‌توسین و ۴۶٪ گروه پروستاگلاندین؛ بدون اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد. خطر نسبی پیدایش عوارض مادری در گروه پروستاگلاندین نسبت به گروه اکسی‌توسین ۷۷٪ برآورد گردید (CI: ۱۲٪ - ۵۳٪).

پروستاگلاندین دیده شد که با نتایج حاصل از دیگر گزارشات مشابه است (۱۱، ۱۰، ۶، ۴).

در برخی گزارشات عوارض سیستمیک این دارو تب، استفراغ و اسهال ذکر شده است که در صورت استفاده از دوز کم دارو قابل چشم پوشی می باشد (۱).

در پژوهش ما، عوارض جنینی در گروه پروستاگلاندین بطور برجسته کمتر از گروه اکسی توسین مشاهده شد. عوارضی مانند آپگار پایین دقایق ۱ و ۵، تشنج نوزادی در ۲۴ ساعت اول و نیاز به مراقبت های ویژه در هیچ موردی ملاحظه نگردید.

تقریباً در همه مطالعات پیش آگهی نوزادان هنگام استفاده از پروستاگلاندین مشابه استفاده از اکسی توسین ذکر شده است.

از آنجاکه امکان سنجش pH خون سر جنین یا بند ناف برای ما عملی نبود و پاتولوژیک بودن ضربان قلب جنین تنها بر مبنای ریتم و تعداد ضربان قلب سنجیده شد، شاید عامل تفاوت مطالعه ما و سایر مطالعات (۴، ۶، ۸، ۱۰) در این زمینه باشد.

در مجموع می توان نتیجه گرفت استفاده از پروستاگلاندین در صورت وجود سرویکس نامناسب در القاء زایمان ترم مؤثر بوده و اثری حداقل مشابه انفوزیون داخل وریدی اکسی توسین - که دقت نظر و تجربه خاصی را می طلبد - دارد.

پیشنهاد

با توجه به نتایج این مطالعه و سایر مطالعاتی که بی ضرر و مؤثر بودن و سهولت استفاده پروستاگلاندین داخل سرویکس را در القاء زایمان ترم نشان داده است، استفاده از این دارو در مراکز زایمانی کشور قابل توصیه است.

ما در گروه پروستاگلاندین ۱/۶ ± ۳/۱ ساعت بدست آمد. در دیگر مطالعات این میانگین بالاتر بوده است. در یک مطالعه ۹/۵ ساعت (۴) و در مطالعه دیگر ۱۳/۵ ساعت (۷) ذکر شده است.

همچنین در مطالعه ما ۷۶٪ موارد گروه پروستاگلاندین تا ۱۲ ساعت پس از استعمال دارو زایمان کردند. ولی در مطالعه ای ذکر شده است که حدود نیمی از موارد درمان با پروستاگلاندین طرف ۲۴ ساعت زایمان می کنند (۱) و در مطالعه دیگر این رقم ۷/۵۳ ذکر شده است (۴).

اختلافات موجود بین مطالعه ما و سایر مطالعات می تواند به این علت باشد که در پژوهش ما، پاریتش > ۴ برای ورود به مطالعه در نظر گرفته شد و موفقیت بهتر نتایج این تحقیق شاید ناشی از اثر پاریتی باشد و چنانچه اگر مطالعه فقط روی خانم های اول زا صورت می گرفت، میزان های حاصل کمتر از ارقام محاسبه شده در این مطالعه بدست می آمد. در تحقیق ما، شروع زایمان فعال در ۳۸٪ موارد دریافت کننده پروستاگلاندین زیر ۳ ساعت و در ۷۴٪ زیر ۶ ساعت بود.

در کتاب ویلیامز (۱) نیز اشاره شده است در صورت استفاده از پروستاگلاندین اگر انقباضات رحمی شروع شوند معمولاً طرف ۴ ساعت به اوج می رسد.

بین دو گروه مورد مطالعه ما، اختلافی از نظر میزان سزارین مشاهده نشد، که مشابه نتایج اکثر گزارشات می باشد (۴، ۱۱، ۱۰، ۶). البته در پژوهشهایی که پروستاگلاندین را با پلاسیو مقایسه کرده اند میزان سزارین در گروه درمان را کمتر ذکر نموده اند (۹، ۸، ۵). میزان عوارض مادری در دو گروه تحت درمان ما، تفاوت آماری معنی دار نداشت. در بین عوارض، موارد بیشتری از اسهال در گروه

منابع

- 1- Cunningham F, MacDonald P, Giant N, et al. Williams obstetrics. 20th Edition USA; Appleton & lange 1997.
- 2- Berek JS., Adashi E, Hillard P. Novak's Gynecology 12th Edition. Williams & Wilkins. 1996.
- 3- Speroff L, Glass R, Kase N. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 6th Edition Williams & Wilkins 1999.
- 4- Ulmisten U, wingerup L, Anderson KE. Comparison of PGE2 and intravenous oxytocin for induction of labor. Obstet Gynecol 1979 Nov;54(5):581-4.
- 5- Bernstein P, leyland N, Gurland P, et al. Cervical ripening and labor induction with PGE2 gel: a placebo-controlled study. Am J obstet Gynecol 1987 Feb;156(2):336-40.
- 6- Goeschken K. Premature rupture of membranes near term: induction of labor with endocervical PGE2 gel or intravenous oxytocin. Am J perinatal. 1989
- 7- Nelson GH, Bryan CL. A comparison of oral PGE2 and intravenous oxytocin for induction of labor in normal and high risk pregnancies. Am J Obstet Gynecol 1976 Nov 1; 126(5):549-54.
- 8- Trofatter KF, Bowers D, Gall SA, et al. Preinduction cervical ripening with PGE2 (prepidil) gel. Am J Obstet Gynecol 1985 Oct 1;153(3):268-71.
- 9- Ferguson JE, Ueland FR, Sterenson DK, et al. Oxytocin-induced labor characteristics and uterine activity after preinduction cervical priming with PGE2 intracervical gel. Obstet Gynecol 1988 Nov; 72(5):739-45.
- 10- Ekman Orderberg G, Uldbjerg N, Ulmsten U. Comparison of intravenous oxytocin and vaginal PGE2 rupture of the membranes. Obstet Gynecol 1985 Sep;66(3):307-10.
- 11- Turner JE, Burke MS, Porreco RP, et al. Prostaglandin E2 in tylose gel for cervical ripening before induction of labor. J Reprod Med 1987 Nov;32(11):815-21.
- 12- Yonekura ML, Songster G, Smith Wallace T. Preinduction cervical priming with PGE2 intracervical gel. Am J Perinatol 1985 Oct; 2(4):305-10.