

# بررسی علایم بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی نوع محدود و منتشر پوستی در سه سال اولیه شروع بیماری و مقایسه آن با شش سال پس از شروع اسکلرودرمی

دکتر سید رضا تحقیق زاده، استاد بار دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روماتولوژی

دکتر فرهاد غریب دوست، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی خلوت، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

## Evaluation of Clinical Symptoms of Patients with Scleroderma According to the Onset Time

### ABSTRACT

Systemic sclerosis is a generalized disorder of connective tissue, in which the pattern of disease extent, progression and outcome is heterogenous. To determine clinical features, disease extent and progression, we studied our patients in two phases of disease; early (the first 3 years) and late phases (after 6 years of disease). 19 patients had diffuse cutaneous and 34 patients had limited cutaneous scleroderma. In patients with diffuse cutaneous scleroderma, disease progression has occurred mostly in the early phase of disease, but in patients with limited cutaneous scleroderma, disease progression was slow and incidious, so disease progression has occurred mostly in the late phase of the disease, thus raynaud's phenomenon, telangiectasia, hyperpigmentation and esophagitis were observed more in the late phase of the disease (statistically significant). In comparison of two groups, early and extensive organ involvement was observed in patients with diffuse cutaneous scleroderma.

**Key Words:** Systemic sclerosis; Diffuse cutaneous scleroderma; Limited cutaneous scleroderma

### چکیده

محدود پوستی، اختلاف آماری معنی دار در بروز فتومن رینو،  
تلانژکتازی، هیپرپیگماتیاسیون پوستی و ازو فاژیت در دوره نهایی  
نسبت به دوره اولیه بیماری مشاهده گردید، که با طبیعت و سرشت  
بیماری تطبیق دارد. در مقایسه علایم بالینی بیماران با درگیری  
محدود و منتشر، درگیری سریعتر و وسیعتر پوست و ارگانهای  
احشایی در فرم منتشر نسبت به فرم محدود مشاهده گردید.

اسکلروز سیستمیک یک بیماری مزمن بافت همبند بوده که  
شروع، سیر و پیشرفت بیماری و وسعت و شدت درگیری ارگانها در  
آن از یک بیمار تا بیمار دیگر تفاوت دارد(۱). جهت تعیین فراوانی  
علایم بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی و نحوه سیر و پیشرفت  
بیماری، ما علایم بالینی بیماران را در دو دوره اولیه (سه سال اول  
بیماری) و نهایی (پس از شش سال از شروع بیماری) مورد بررسی  
قرار دادیم.

### مقدمه

اسکلروز سیستمیک یک بیماری مزمن بافت همبند بوده که  
مشخصه آن التهاب، فیبروز و تغییرات دیلاتاسیو در جدار عروق،  
پوست، سینوفیوم، عضلات اسکلتی و ارگانهای احشایی مثل

توزده نفر مبتلا به فرم منتشر بیماری و ۳۴ بیمار فرم محدود آن  
از نظر پوستی را دارا بودند. در بیماران با درگیری منتشر پوستی،  
گرفتاری ارگانها در طول دوره اول بیماری بیشترین پیشرفت را  
داشتند، به طوری که اختلاف آماری معنی دار بین فراوانی علایم  
بالینی در دوره اولیه و نهایی مشاهده نگردید. در بیماران با درگیری

شروع بیماری مراجعه منظم به درمانگاه نداشته‌اند از مطالعه خارج شدن.

۵۳ بیمار با شرایط فوق وارد مطالعه شدند. ۱۹ بیمار مبتلا به فرم منتشر پوستی بیماری بودند که از این میان ۴ نفر مرد و ۱۵ نفر زن بودند. متوسط طول دوره بیماری در این گروه بیماران در هنگام مطالعه ۱۰/۵ سال بود. ۳۴ بیمار نیز مبتلا به فرم محدود بیماری بودند، که از این میان ۴ بیمار مرد و ۳۰ بیمار زن بودند، متوسط طول دوره بیماری در این گروه هنگام مطالعه ۸/۸ سال بوده است. چک لیست‌هایی مشتمل بر ۶۵ عنوان و متغیر کلینیکی تهیه و علایم سه سال اول از روی پرونده‌ها استخراج گردید. علایم دوره نهایی بیماران در طی سه سال آخر مراجعه بیماران به درمانگاه مورد بررسی قرار گرفت.

اطلاعات بوسیله نرم‌افزار Epi Info و با آزمون آماری Mc-Nemar برای مقایسه فراوانی علایم بالینی دوره اولیه و نهایی در هر گروه از بیماران و آزمون آن برای مقایسه فراوانی علایم بالینی بین گروه‌های بیماران با درگیری محدود و منتشر پوستی در دوره‌های اولیه و نهایی و با در نظر گرفتن سطح معنی داری ۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

## یافته‌ها

در جدول ۱ فراوانی علائم مختلف بالینی در بیماران، بر حسب نوع و مرحله، آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود، اختلاف آماری معنی دار بین فراوانی علایم بالینی بیماران فرم منتشر پوستی در دو دوره بیماری وجود ندارد و تقریباً حداقل در گیری ارگانها در طی دوره اولیه بیماری حداد شده است. لازم به توضیح است که معیار تعیین ازو فازیت در بیماران علامت دار استفاده از آندوسکوپی بوده است و به علایم بالینی به تهایی اکتفا نشده است. همچنین همانطور که می‌دانید سرفه خشک می‌تواند علامتی ناشی از Reflux مری باشد، به همین دلیل سرفه خشک در بیمارانی علامت بالینی درگیری ریوی فرض شده است که همراه آن تنگی نفس کوششی نیز وجود داشته است و سرفه خشک به تهایی علامت بالینی درگیری ریوی قرار نگرفته است.

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، در مبتلایان به فرم محدود اختلاف آماری معنی دار در فراوانی بروز تلائذگاری، فنوم رینود، هیپریگماتناسیون و ازو فازیت در دوره نهایی نسبت به دوره اولیه یافت نشد.

دستگاه گوارش، ریه، قلب و کلیه‌ها می‌باشد<sup>(۲)</sup>. علیرغم شناخت بعضی تظاهرات بیماری، تا قرن نوزدهم طبیعت سیستمیک بیماری شناخته نشده بود به طوری که Wolter در سال ۱۸۹۲ اعلام نمود که به نظر تمی رسید که اسکلروز درما به طور مستقیم می‌تواند تهدیدکننده زندگی باشد<sup>(۳)</sup>. پس از آن در قرن بیستم بود که با شناخت بیشتر از بیماری، گرفتاری ارگانهای مختلف در این بیماری شناخته شد و نام جدید Progressive systemic sclerosis بر آن تهاده شد<sup>(۳)</sup>. برای بررسی سیر و پیشرفت علایم بیماری از نظر زمانی، بیماری را در دو دوره اولیه (سه سال اول) و نهایی (پس از شش سال) مورد بررسی قرار می‌دهند.

در فرم منتشر پوستی در دوره اولیه، بیماری سریعاً گسترش پیدا کرده و باعث درگیری وسیع ارگانهای احساسی خواهد شد و پس از سه سال از شروع بیماری، تقریباً درگیری جدید حادث نشده و عوارض بیماری در حال پیشرفت خواهد بود<sup>(۱)،(۵)،(۶)،(۷)،(۸)،(۹)</sup>.

در حالیکه در بیماران با درگیری محدود پوستی پیشرفت بیماری بسیار آهسته بوده به طوری که ایجاد علایم جدید در طی سالهای اول بیماری باز نخواهد بود. سفتی پوست اغلب محدود به انتهای اندامها و صورت باقی مانده و درگیری‌های احساسی نیز در هنگام عارض خواهد شد<sup>(۱)،(۲)،(۳)،(۴)،(۵)</sup>.

ما از سیر و پیشرفت بیماری و میزان درگیری ارگانها در دو دوره ذکر شده در بیماران خود اطلاع جامعی در دست نداشتم، بنابراین بر آن شدید تا با انجام این مطالعه فراوانی علایم بالینی و سیر بیماری را در بیماران خود تعیین نماییم.

## روش و مواد

بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک، که به درمانگاه کلائز نز بیمارستان شریعتی مراجعه نموده بودند، بررسی شدند. تشخیص این بیماران (أنواع محدود و منتشر پوستی) بر اساس معیارهای American College of Rheumatology مستقر شده در سال ۱۹۸۰<sup>(۱)</sup> گذاشته شده و این افراد حداقل در طی شش سال اول بیماری مراجعه منظم به درمانگاه کلائز نز داشتند. بیماران مبتلا به اسکلروز درمی از انواع Localized، بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک که همراه با سایر بیماریهای کلائز و اسکولار بوده‌اند و بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک که در طی شش سال اول

جدول ۱- فراوانی علایم بالینی ۱۹ بیمار مبتلا به اسکلروز سیستمیک نوع منتشر پوستی در دوره اولیه (کمتر از سه سال) و دوره نهایی بیماری (بعد از ۶ سال)

مقایسه محدود و منتشر اولیه نهایی	مقایسه اولیه و نهایی محدود منتشر	نوع منتشر (۱۹ نفر)		نوع محدود (۳۴ نفر)		علامت بالینی		
		دوره نهایی (در صد) تعداد	دوره اولیه (در صد) تعداد	دوره نهایی (در صد) تعداد	دوره اولیه (در صد) تعداد			
NS	NS	NS	NS	۲(۱۵/۷)	۲(۱۰/۵)	۲(۵/۸)	۱(۲/۴)	Anorexia
NS	NS	NS	NS	۴(۲۱)	۲(۱۵/۷)	۵(۱۴/۷)	۲(۸/۸)	Weight loss
NS	NS	NS	NS	۷(۳۶/۸)	۹(۴۷/۳)	۱۶(۴۷)	۱۵(۴۴/۱)	Arthralgia
NS	NS	NS	NS	۱۹(۱۰۰)	۱۹(۱۰۰)	۲۴(۱۰۰)	۲۱(۹۱/۱)	Upper limb sclerosis
S	S	NS	NS	۱۸(۹۴/۷)	۱۷(۸۹/۴)	۱۵(۴۴/۱)	۱۲(۳۵/۲)	Lower limb sclerosis
NS	NS	NS	NS	۱۹(۱۰۰)	۱۹(۱۰۰)	۳۳(۹۷)	۳۳(۹۷)	Face sclerosis
NS	NS	NS	NS	۱۸(۹۴/۷)	۱۴(۷۳/۶)	N/A	N/A	Trunk sclerosis
NS	NS	NS	S	۱۱(۵۷/۸)	۸(۴۲/۱)	۲۳(۸۷/۶)	۹(۲۵/۴)	Telangiectasia
NS	NS	NS	NS	۵(۲۶/۳)	۲(۱۰/۵)	۱۲(۳۸/۲)	۹(۲۶/۴)	Joint contracture
NS	NS	NS	S	۱۷(۸۹/۴)	۱۴(۷۳/۶)	۲۲(۹۴/۱)	۲۳(۸۷/۶)	Raynaud phenom
NS	NS	NS	S	۱۷(۸۳/۱)	۹(۴۷/۳)	۱۷(۵۰)	۱۱(۳۲/۳)	Hyperpigmentation
S	NS	NS	NS	۱۵(۷۸/۹)	۱۲(۶۳/۱)	۱۶(۴۷)	۱۶(۴۷)	Dysphagia
NS	NS	NS	S	۲(۱۰/۵)	*	۱۰(۲۹/۴)	۳(۸/۸)	Esophagitis
NS	NS	NS	NS	۱۰(۵۲/۶)	۸(۴۲/۱)	۱۷(۵۰)	۱۶(۴۷)	Impaired peristaltism
NS	NS	NS	NS	۴(۲۱)	۲(۱۰/۵)	۲(۸/۸)	۲(۸/۸)	Dry cough
NS	NS	NS	NS	۹(۴۷/۲)	۶(۳۱/۵)	۱۰(۲۹/۴)	۷(۲۰/۵)	Exertional dyspnea
NS	NS	NS	NS	۲(۱۰/۵)	*	۹(۲۶/۴)	۴(۱۱/۶)	Calcinosis
NS	NS	NS	NS	۱۵(۷۸/۹)	۱۳(۶۸/۴)	۲۴(۷۰/۵)	۲۱(۶۱/۷)	Pitting ulcer
NS	NS	NS	NS	۳(۱۵/۷)	۱(۵/۲)	۱(۲/۹)	*	Gangrene

\* درصد ها در هر قسمت ششان دهinde کسر و اعداد آن علامت نسبت به کل بیماران نوع محدود یا منتشر می باشدند. + اختلاف آماری با استفاده از آزمون Mc Nemar و سطح معنی داری ۰/۰۵ بررسی شد. NS: از لحاظ آماری معنی دار نیست، S از لحاظ آماری معنی دار است، N/A: کاربرد ندارد.

در بیماران با درگیری منتشر پوستی، معیار ما برای تعیین گرفتاری پوست، تنها سفتی پوست یک اندام بوده است و شدت سفتی پوست در پیگیری های بعد در این مطالعه لحاظ نشده است. بنابراین اگرچه ممکن است در طی چند سال، وسعت سفتی پوست در یک اندام تغییر نکرده باشد ولی می تواند شدت سفتی آن کم و یا زیاد شده باشد، بنابراین چون score سفتی پوست در بیماران ما تعیین نشده است در مورد سیر درگیری پوست، دقیقاً نمی توان اظهار نظر نمود. اما علیرغم این نکته با مشاهده مجموعه یافته ها چنین می توان نتیجه گرفت که احتمالاً بیماران ما با درگیری منتشر پوستی، در دوره اولیه بیماری، حداقل درگیری و گرفتاری های احساسی و پوستی را پیدا نموده بعد از آن علیرغم آنکه بیماری به سیر خود ادامه خواهد داد ولی پیشرفت علایم بالینی به آهستگی صورت

از نظر مقایسه علایم بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی نوع محدود و منتشر در طول سه سال اول بیماری، مشاهده می شود که تنها سفتی پوست پاها در دوره اولیه بیماری با اختلاف آماری معنی دار در بیماران با درگیری منتشر پوستی بیشتر مشاهده شده است. همچنین مقایسه علایم بالینی بیماران مبتلا به اسکلرودرمی نوع محدود و منتشر در طول دوره نهایی بیماری صورت گرفت و ملاحظه گردید که در دوره نهایی اختلاف آماری قابل قبول بین فراوانی سفتی پوست پاها و دیسقاشی در بیماران با درگیری منتشر نسبت به بیماران با درگیری محدود وجود دارد.

## بحث

خواهد گرفت.

آن دانشگاه دوره زمانی اولیه و نهایی برای بیماران با درگیری محدود پوستی را پنج سال و ده سال اول بیماری فرض کرده است. ما نتایج خود را با انتایج بدست آمده در آن دانشگاه مورد مقایسه قرار دادیم (جدول ۲):

همانطور که مشاهده می شود در هر دو دوره و در تمامی بیماران ما، زخم های توک انگشتان بیش از بیماران دانشگاه Pittsburgh مشاهده شده است که ممکن است این فراوانی بیشتر بدلیل عدم رعایت دستورات بهداشتی مثل پوشیدن دستکش و گرم نکردن داشتن بدن در فصول سرد سال و عدم استفاده از پرس سانگلاترین ها بصورت سیکلیک (در هنگام انجام مطالعه) در بیماران ما باشد.

همچنین کلیپوز زیرجلدی در بیماران دانشگاه Pittsburgh به طور کلی بیش از بیماران ما مشاهده شده است، این افزایش فراوانی نیز احتمالاً بدین دلایل می باشد که برخورد ما با بیماران برای یافتن کلیپوز زیرجلدی بصورت شکایتی بوده است، بتاری این اگر بیمار شکایتی در ارتباط با وجود کلیپوز نداشته است، اقدامی جزو گرفتن رادیوگرافی دستها و معاینه قیزیکی برای یافتن کلیپوز صورت نگرفته است، در حالیکه در دانشگاه Pittsburgh به صورت سریال هر شش ماه رادیوگرافی هایی از نقاط مختلف بدن انجام شده است. در بیماران با درگیری محدود پوستی مشاهده می شود که فتومن رینود و تلائوکتازی در بیماران دانشگاه Pittsburgh در دوره اولیه بیماری بیشتر از بیماران ما بوده است که این فراوانی بیشتر می تواند بدان دلیل باشد که آنها دوره اولیه بیماری را پنج سال و ماسه سال فرض نموده ایم. چنانچه با گذشت زمان اختلاف آماری در بروز فتومن رینود بین بیماران در دوره نهایی از میان رفته و آمار بروز تلائوکتازی در دوره نهایی (بعد از شش سال) در بیماران ما، با دوره اولیه بیماران دانشگاه Pittsburgh که در طول پنج سال پس از شروع بیماری بوده است، تقریباً یکسان شده است.

جدول ۲- مقایسه فراوانی علام بالینی بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک

علام بالینی	شریعتی	پیتربورگ	اسکلروز سیستمیک نوع محدود				اسکلروز سیستمیک نوع منتشر			
			مرحله اولیه	مرحله نهایی	مرحله اولیه	مرحله نهایی	مرحله اولیه	مرحله نهایی	مرحله اولیه	مرحله نهایی
درد مقاصل	%۴۰	%۴۷	%۳۲	%۴۴/۱	%۶۹	%۲۶/۸	%۵۲	%۴۷/۲	بدیده رینو	%۹۸
زخم انگشتان	%۴۳	%۷۰/۵	%۲۴	%۶۱/۷	%۴۷	%۷۸/۹	%۲۲	%۷۳/۶	کلیپوز	%۵۹
تلائوکتازی	%۹۳	%۶۷/۶	%۷۵	%۲۶/۴	%۸۲	%۵۷/۸	%۵۱	%۴۲/۱	رینو	%۹۸

در مطالعه Medsger و همکاران، سفتی پوست در طول سه سال اول بیماری به حد اکثر خود رسیده در دوره نهایی از شدت سفتی پوست کاسته شده است، به طوری که Score سفتی پوست در دوره اولیه بیماری ۴۰ و در دوره نهایی ۲۸ بوده است (۱).

در مورد دستگاه گوارش عمده گرفتاری مری در طول دوره اول بیماری ایجاد شده است و پس از آن عوارض این گرفتاری بصورت بروز ازوفازیت خود را نشان خواهد داد. در مورد گرفتاری ریوی نیز اختلاف آماری معنی دار بین دو دوره وجود نداشته، اگرچه تنگی نفس کوششی احتمالاً به خاطر درگیری های پیتابیمنی ریه و سبر پیشرفت بیماری در حال افزایش بوده است.

در بیماران با درگیری محدود پوستی، اختلاف آماری معنی دار در میزان فراوانی فتومن رینود، تلائوکتازی، ازوفازیت و هیپرپیگماتیاسیون در دوره نهایی نسبت به دوره اولیه مشاهده شده است، که با طبیعت و سیر بیماری تطبیق دارد. مقایسه فراوانی کلیپوز زیرجلدی نیز در دوره نهایی نسبت به دوره اولیه بسیار نزدیک به معنی دار بودن از نظر آماری خواهد بود.

در این بیماران سفتی پوست صورت و دستها، در دوره اولیه بیماری به حد اکثر خود رسیده در حالیکه سفتی پوست پالس به استثنای رو به پیشرفت بوده است و نشان می دهد که جزو سفتی پوست دستها و صورت، که در دوره اول بیماری باز خواهد گردید، با گذشت زمان افزایش فراوانی تلائوکتازی های تورماتند و کلیپوز ایجاد شده و از درگیری های احتسابی نیز درگیری مری باز خواهد گردید.

مقایسه بیماران دو گروه نیز نشان دهنده درگیری های احتسابی و پوستی وسیع نر و سریع تر در بیماران ما با درگیری منتشر پوستی بوده است.

در دانشگاه Pittsburgh نیز مطالعه ای با همین طرح بر روی بیماران مبتلا به اسکلروز درمی صورت گرفته است، اما لازم به ذکر است که

از گذشت چند سال از بیماری علاوه بر سفتی پوست دستها و صورت، تلاآکنایی و فتومن رینود، کلسینوز زیرجلدی و درگیری مری پارز خواهد گردید.

از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که در بیماران ما با درگیری منتشر پوستی، حداقل پیشرفت بیماری در طی سالیان اول بیماری ایجاد شده و پس از آن پیشرفت علایم بالینی نسبت به دوره اولیه کنترل خواهد شد، در حالیکه در بیماران ما با درگیری محدود پوستی گرفتاری ارگانهای احتشایی به آهستگی صورت گرفته و پس

## منابع

- 1- Thomas A, Medsger JR, Virginia DS. Classification and prognosis: Clements PJ, Furst DE. Systemic sclerosis. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996: 51-63.
- 2- Thomas A, Medsger Jr. Systemic sclerosis, clinical aspects. In: Koopman WJ. Arthritis & allied conditions. Baltimore : Williams & Wilkins, 1997: 1433-64.
- 3- Barnet AJ. History of scleroderma. In: Clement PJ, Furst DE. Systemic sclerosis. Baltimore: Williams and Wilkins, 1996: 3-21.
- 4- Seibold JR. Clinical features of systemic sclerosis. In: Klipper JH, Dieppe PA. Practical Rheumatology. London: Mosby, 1995: 329-41.
- 5- Seibold JR. Scleroderma. In: Kelly WN et al. Textbook of Rheumatology, Philadelphia: WB Saunders, 1997: 1133-59.
- 6- Medsger TA Jr. Progressive systemic sclerosis: skeletal muscle involvement. Clin Rheum Dis 1979; 5: 103-13.
- 7- Hamel-Roy J, Devroede G, Ashamp, et al. Comparative esophageal and anorectal motility in scleroderma. Gastroentrology 1985; 88: 1-7.
- 8- Green Wald GI, Tashkin DP, Gong H, et al. Longitudinal changes in lung function and respiratory symptoms in progressive systemic sclerosis. Am J Med 1987; 83: 83-92.
- 9- Ridolfi RL, Bulkley BH, Hutchins GM. The Cardiac conduction system in progressive systemic sclerosis. Clinical and pathologic features of 35 patients. Am J med 1976; 61:361-6.
- 10- Lapenas D, Rodnan GP, Cavallo T. Immunopathology of the renal vascular lesion of progressive systemic sclerosis. Am J Pathol, 1987; 91: 243-58.
- 11- Leroy EC, Black C, Fleischmajer R et al. Scleroderma: classification, subsets, and pathogenesis. J Rheumatol 1980; 152: 202-5.
- 12- Sheiner NM, Small P. Isolated Raynaud's phenomenon: a benign disorder. Ann Allergy 1987; 58: 114-17.
- 13- Yosem SA. The pulmonary pathologic manifestations of the CREST Syndrome. Hum Pathol. 1990; 21: 467-74.