

بررسی سونوگرافیک طحال و درجه‌بندی شاخص طحال در بیماریهای مختلف

دکتر نجمه روحانی، متخصص رادیولوژی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی
دکتر اردلان علیپور، متخصص رادیولوژی، مجتمع بیمارستانی امام خمینی

Sonographic Assessment and Grading of Spleen Index in Various Diseases

ABSTRACT

Ultrasonography is a useful procedure in evaluation of spleen size in different clinical conditions. In this study, we used it to evaluate spleen size in patients with various hepatologic, hematologic and autoimmune diseases. To express spleen size, a spleen index (SI), the product of the transverse diameter and its perpendicular diameter measured on the maximum-sectional image of the spleen, was used.

Splenomegaly was present in high percentages of patients with liver, blood, collagen or autoimmune diseases, even though a majority of these spleens were not large enough to palpate.

By grading the SI, characteristic distributions of SI were obtained for patients with different types of diseases. Obtaining and grading the SI by the use of ultrasound appears to be a significant supplemental aid for evaluating spleen size, especially in patients whose spleen are not palpable.

Key Words: Spleen size; Spleen index; Ultrasonography

چکیده

اندازه‌گیری شاخص طحال و درجه بندی آن با استفاده از اولتراسونوگرافی روش کمکی مفیدی در مشخص کردن اسپلنتومگالی، بخصوص در بیمارانی که طحال آنها قابل لمس نیست، باشد.

مقدمه

در تعدادی از بیماریها، طحال به دلیل پرولیفراسیون لنفوسيتها یا سلولهای رتیکولاندوبلال بزرگ می‌شود. همچنین در تعدادی از بیخیمی‌های سیستم هماتولوژیک و یا هیپرتانسیون پورت، اسپلنتومگالی وجود دارد و بتایراین اسپلنتومگالی یکی از علایم بالینی مهم برای تشخیص و بررسی این بیماری‌هاست^(۱).

اما بررسی اندازه طحال، بخصوص در مواردی که طحال غیرقابل لمس باشد (براساس دق) همیشه دقیق نیست. بتایراین «اسپلنتومگالی» در گزارشات معاینات بالینی اغلب فقط به مواردی محدود می‌شود که طحال قابل لمس باشد و دقت چنین تشخیصی

سونوگرافی ابزار مفیدی در بررسی ابعاد طحال در بیماری‌های مختلف است. مطالعه حاضر از سونوگرافی برای بررسی اندازه طحال بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف کبدی، خونی، کلازن و اسکولر یا اتوایمون استفاده شده است. افراد مورد مطالعه، شامل ۲۰۰ سالم و ۶۴۰ بیمار بودند. گروه شاهد از میان مراجعه کنندگان سرپایی جهت سونوگرافی به دلایل مختلف، و بیماران از بین بیماران پستری در بخش‌های مختلف داخلی انتخاب شدند. برای بیان کردن اندازه طحال، شاخص طحال که حاصلضرب دیامتر عرضی طحال در دیامتر عمود بر آن در بزرگترین مقطع طحال است، محاسبه شد. شاخص طحال در گروه شاهد و برآورد میزان میزان فعال و هیاتیت حاد ویرال به ترتیب $26/\text{cm}^2 \pm 51$ و $26/\text{cm}^2 \pm 51$ بود. شاخص طحال بیماران خونی بطور قابل توجهی بالا بود و بیشترین میزان در این گروه متعلق به CML بود ($49/\text{cm}^2 \pm 163$). طحالهایی با شاخص زیر $26/\text{cm}^2$ غیرقابل لمس و طحالهای با شاخص بالای $26/\text{cm}^2$ قابل لمس بودند. به نظر می‌رسد که

در هر بیماری اغلب ناشناخته است(۲).

پیشرفت‌های اخیر در اولتراسونوگرافی امکان بررسی طحال‌های غیرقابل لمس را بوجود آورده است. گزارشات متعددی وجود دارد که اندازه‌گیری ابعاد طحال بوسیله سونوگرافی با اندازه طحال بعد از اتوپسی کاملاً مطابقت دارد و دقیق و قابل اعتماد می‌باشد.

در مطالعه حاضر ما از سونوگرافی برای اندازه‌گیری اندازه‌های دقیق ابعاد طحال استفاده کرد و وضعیت‌های مختلف بالینی را از این نظر مورد بررسی قرار داده‌ایم (بخصوص در بیمارانی که طحال آنها بوسیله مطالعات بالینی قابل بررسی نمی‌باشد). بدست آوردن اختلاف در شاخص مورد نظر می‌تواند به افتراق این بیماریها از هم کمک کند و به جرأت می‌توان گفت که اولتراسوند مفیدترین، ارزان‌ترین، قابل استفاده‌ترین و بی‌خطرترين روش برای اندازه‌گیری ابعاد طحال‌های غیرقابل لمس می‌باشد.

از آنجایی که در حوادث، سونوگرافی طحال جزوی از مطالعات بالینی و پاراکلینیک می‌باشد، با استفاده از این روش علاوه بر مطالعه پارانشیم، از شاخص طحال Spleen Index(SI) که بیانگر دقیق ابعاد طحال می‌باشد، می‌توان به عنوان یک اقدام تکمیلی در تشخیص بیماریهای فوق‌الذکر استفاده کرد(۳).

روش و مواد

مطالعات سونوگرافیک توسط real-time B-mode scanner با استفاده از Linear transducer با پرتوهای ۳/۵MHz با انجام گرفته و تصاویر بر روی فیلمهای پولاروید ثبت شد.

افراد مورد مطالعه، شامل ۲۰۰ نفر سالم (شاهد) و ۶۴ بیمار بودند. گروه شاهد از میان مراجعه کنندگان سرپایی به مرکز تصویربرداری مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران که به دلایلی جهت سونوگرافی مراجعه کرده بودند، انتخاب شد. این افراد هیچگونه بیماری خاصی نداشته و در دو هفته اخیر حمله تبدیل نداشتند.

محدوده سنی افراد مورد مطالعه چه در گروه شاهد و چه در گروه بیمار ۱۴-۷۴ سال بر اساس مطالعات قبلی، در نظر گرفته شد. بیماران نیز از میان بیماران بستری در بخش‌های مختلف داخلی بیمارستان امام خمینی و بیمارستان ولی‌عصر تهران در سالهای ۷۶ و ۷۷ انتخاب شدند. این بیماران موارد شناخته شده یا مشکوکی که در پیگیری‌های بعدی و بر اساس معیارهای بالینی یا پاراکلینیک تشخیص نهایی در مورد آنها مشخص شده بود شامل می‌شدند.

-روش اندازه‌گیری شاخص طحال

بیماران به صورتی قرار داده می‌شدند که سمت چپ بدن آنها بالا باشد و یک مقطع طولی از طحال را بتوان بدمست آورد. بزرگترین قطر عرضی و طولی عمود بر هم در بزرگترین مقطع طحال اندازه‌گیری می‌شد.

در حالتی که قسمت فوقانی طحال توسط گاز ریه‌ها پوشانیده شده بود، مرز بین ریه و طحال بعنوان حدنهایی فطر عرضی یا طولی در نظر گرفته می‌شد.

اندازه‌گیری در زمان دم عمیق انجام می‌شد تا میزان پوشانده شدن طحال توسط گاز ریه‌ها حداقل باشد.

شاخص طحال با فرمول زیر محاسبه شد(۳):

$$SI \text{ (cm)}^{\frac{1}{2}} = a \text{ (cm)} \times b \text{ (cm)}$$

$$b = \text{دiameter طولی} \quad a = \text{diameter عرضی}$$

و SI به ۵ درجه تقسیم گردید:

Grade O : 0-30 cm ^{1/2}	normal
Grade I: 31-60cm ^{1/2}	mild splenomegaly
Grade II:61-90cm ^{1/2}	moderate
Grade III:91-120cm ^{1/2}	marked
Grade IV: 120cm-150 ^{1/2}	marked-massive
Grade V: >150	massive

نتایج

SI در ۲۰۰ نفر گروه شاهد اندازه‌گیری شد که بطور متوسط $SI \pm 51 \text{ cm}^{\frac{1}{2}} \pm 26/8$ بود. از این تعداد ۷۵٪ در درجه یک، ۱۵٪ در درجه صفر و ۱۰٪ در درجه دو قرار داشتند. در گروه بیماریهای کبدی، SI در سیروز، هپاتیت مزمن فعال و هپاتیت حاد ویرال به ترتیب $\pm 97 \text{ cm}^{\frac{1}{2}} \pm 51/3$ ، $18/8 \text{ cm}^{\frac{1}{2}} \pm 66/8$ و $15/5 \text{ cm}^{\frac{1}{2}} \pm 58/5$ بودند. بدست آمد. در مبتلایان به سیروز تنها ۱۶٪ بیماران در درجه یک قرار داشتند. و بقیه بیماران (۸۳٪) درجه دو به بالا داشتند. میزان درجه چهار و پنج به ترتیب در آنها حدود ۲۵٪ و ۱۴٪ بود. در هپاتیت مزمن فعال ۴۷٪ بیماران متعلق به درجه یک بودند و تنها ۱۷٪ بیماران متعلق به درجه دو و سه بودند و اسپلنو-مگالی درجه چهار در آنها وجود نداشت. در مبتلایان به هپاتیت حاد ویرال تنها ۲۰٪ متعلق به درجه صفر و ۸۰٪ متعلق به درجه یک و دو بودند(جدول ۱).

جدول ۱- توزیع فراوانی درجه‌های مختلف اسپلنوگالی در افراد نرمال و بیماریهای مختلف

نوع بیماری	۰=Normal		I=Mild		II=Moderate		III=Marked		IV=Marked Massive		V=Massive		تعداد کل	
	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
نرمال	۳۰	۱۵	۱۵۰	۷۵	۲۰	۱۰	-	-	-	-	-	-	$51 \pm 26.8 \text{ cm}^2$	۲۰۰
لتروم	۲	۱/۵	۸۸	۵۸	۴۰	۲۶	۱۰	۷	۸	۰	۴	۲/۵	63 ± 18.3	۱۰۲
AML	۷	۱۶	۱۲	۲۷	۱۰	۲۲	۶	۱۴	۵	۱۱	-	-	79.4 ± 34.2	۴۵
ALL	۲	۱۰	۱۰	۵۰	۶	۲۰	۲	۱۰	۲	۱۰	-	-	65 ± 13.4	۳۰
CLL	۲	۱۴	۳	۱۴	۳	۱۴	۶	۲۹	۶	۲۹	-	-	73.4 ± 32.1	۲۱
CML	-	-	-	-	۲	۲۵	۲	۱۶/۵	۵	۴۲	۲	۱۶/۵	165.3 ± 49.2	۱۲
آنمی آپلاستیک	-	-	۱	۱۲/۵	۵	۶۲/۵	۲	۲۰	-	-	-	-	62.7 ± 14.3	۸
آنمی همولیپتیک اتوابمود	-	-	-	-	۶	۶۷	۲	۲۲	-	-	-	-	57.5 ± 14.3	۹
هموفیلی	۵	۸/۴	۲۲	۳۶/۶	۲۲	۰۰	-	-	-	-	-	-	61.6 ± 26.3	۶۰
SLE	۲	۱۰	۱۶	۵۴	۹	۲۰	۲	۶	-	-	-	-	52.2 ± 17.4	۲۰
RA	۰	۲۴	۹	۴۲	۷	۲۲	-	-	-	-	-	-	58.1 ± 28.4	۲۱
اسکلروزدرمی	۴	۲۵	۱۰	۶۲/۵	۲	۱۲/۵	-	-	-	-	-	-	47.5 ± 14.4	۱۶
کریبیتیک	۴	۲۲	۴	۲۲	۱۰	۰۶	-	-	-	-	-	-	51.3 ± 12.2	۱۸
سیبروز	-	-	۲۴	۱۶/۵	۴۰	۲۸	۲۴	۱۶/۵	۳۶	۲۵	۲۰	۱۴	97 ± 51.3	۱۴۴
C.A.H	۶	۳۶	۸	۴۷	۲	۱۱	۱	۶	-	-	-	-	66.8 ± 18.8	۱۷
A.V.H	۴	۲۰	۱۲	۶۰	۴	۲۰	-	-	-	-	-	-	58.5 ± 15.2	۲۰
گریوز	۲	۲۹	۴	۵۷	۱	۱۴	-	-	-	-	-	-	39.6 ± 14.3	۷
لوسومی	-	-	-	-	-	-	۱	۲۰	۲	۶۰	۱	۲۰	125.5 ± 60.4	۵
اندوکارڈیت	-	-	۲	۴۰	۳	۶۰	-	-	-	-	-	-	63 ± 12.5	۵
AS	۱	۱۷	۱	۱۷	۲	۶۶	-	-	-	-	-	-	58.7 ± 12.6	۶
بهجت	۱	۲۵	۲	۵۰	۱	۲۵	-	-	-	-	-	-	42.5 ± 7.7	۴
درماتومیوزیت	۱	۲۵	۲	۵۰	۱	۲۵	-	-	-	-	-	-	45 ± 11.3	۴
کاوازاکی	۱	۲۲	-	-	۲	۷۷	-	-	-	-	-	-	54.6 ± 14.2	۳
L.T.P	-	-	۱	۳۳	۲	۷۷	-	-	-	-	-	-	58.6 ± 11.4	۳

اسپلنوگالی در اکثر بیماریهای روماتولوژیک نیز وجود داشت و اکثر بیماران متعلق به درجه‌های یک و دو یا اسپلنوگالی خنیف تا متوسط بودند و درجه چهار به بالا در آنها یافت نشد. در بین این گروه بیشترین میزان متعلق به بیماران مبتلا به آرتربیت روماتولوژید بود ($49/2 \text{ cm}^2 \pm 58/4 \text{ cm}^2$).

در گروه بیماریهای هماتولوژیک گروههای مختلف لوسومی بررسی شد و مشاهده شد که SI در این گروه بطور قابل توجهی بالاست. بیشترین میزان SI در این گروه متعلق به CML بود که در حدود $163 \pm 49/2 \text{ cm}^2$ بدست آمد. و اکثر بیماران این گروه در درجه چهار و پنج قرار داشتند (جدول ۱).

متلایان به CML بود. تمام این بیماران درجه دو اسپلنومگالی بد بالا داشتند و در این میان بالاترین میزان (۴۲٪) متعلق به درجه چهار اسپلنومگالی بود، لذا اکثر بیماران طحالهای قابل لمس دارند. در سایر گروههای لوسمی بجز Hairy cell leukemia، درجه پنج یافت نشد. در متلایان به AML درجه اسپلنومگالی نسبت به ALL بالاتر بود. در متلایان به CLL نیز بیشترین درصد متعلق به درجه سه یا چهار بود (۵۸٪) اسپلنومگالی در اکثر متلایان به بیماریهای روماتولوژیک نیز یافت شد ولی اکثر بیماران متعلق به درجه های یک و دو بودند و درجه چهار به بالا در آنها یافت نشد.

در بین این گروه بیشترین میزان SI متعلق به بیماران متلایان به آرتربیت روماتوئید بود. چون اندازه گیری دقیق ابعاد طحال بعلت مشکلات آناتومیک امکان پذیر نمی باشد و به علت خطاهاي Inter Intra-Observer یا بیان SI به تنهایی قابل اعتماد نمی باشد، لذا بهتر دانستیم که SI را درجه بندی کنیم. با درجه بندی SI توزیع اختصاصی SI بروای بیماران در گروههای مختلف رسم شده و ما قادر هستیم که درجه اسپلنومگالی را بروای هر گروه از بیماریها بدانیم و بر عکس توسط اندازه گیری SI و درجه بندی آن می توانیم نسبت به بیماری زمینه ای آن نظر دهیم. یعنوان مثال: درجه چهار اسپلنومگالی تنها در لقور، سیروز، CML و HCL یافت می شود و در CML و HCL، درجه دو به پایین یافت نمی شود.

با توجه به محدودیت زمانی مطالعه و عدم امکان بررسی با تعداد کم موارد بعضی بیماری ها، امکان وسعت دادن مطالعه و تعمیم نتایج به این گروهها وجود نداشته و بررسی های آینده در این موارد پیشنهاد می شود.

علاوه بر این، اندازه گیری SI و درجه بندی آن را در پیگیری بیماران نیز می توان به کار گرفت. بنابراین تعیین SI و درجه بندی آن به تشخیص بیماری کمک می کند، پرتوگنوز بیمار را تعیین می نماید و روی تغییر روش درمانی می تواند تأثیر بگذارد.

برای استفاده های عملی، نسبت بین SI و قابل لمس بودن طحال نیز مطالعه شد و مشاهده شد که طحالهایی با SI زیر 60 cm^2 همیشه غیرقابل لمس و طحالهای با SI بالای 120 cm^2 تقریباً همیشه قابل لمس می باشند.

بحث و نتیجه گیری

طحال بوسیله پرولیفراسیون واکنشی لنفوسيتها یا سلولهای رتیکولاندوتیال و یا انقیلتراسیون سلولهای لنفاویک در لقور و یا سایر شوپلازیها و یا توسط ماکروفازهای Lipid-Laden بزرگ می شود.

همچنین خونسازی اکسترامدولری و ازدیاد سلولهای فاگوسیتیک در واکنش به افزایش تخریب سلولهای خونی و یا احتقان عروقی در صورت وجود پروفشاری خون پورت باعث بزرگی طحال می شود. بنابراین بررسی ابعاد طحال جزو مهمی از معایبات کلینیکی می باشد (۴). مطالعات نشان داده است که شاخص طحال با وزن طحالهای گیری شاخص طحال ما مشخص نمودیم که SI در افراد سالم ایرانی بطور متوسط $26/8\text{ cm}^2 \pm 51$ می باشد که در این میان بیشترین میزان (۷۵٪) متعلق به درجه یک بودند که با مطالعه مشابه تحقیق ژاپنی متفاوت بود (در بررسی افراد نرمال ژاپنی بیشترین میزان میزان میانی آن نظر دهیم) و از این نظر لزوم بررسی بیشتر را ایجاب می کند. همچنین مشاهده شد که در درصد بالایی از متلایان به بیماریهای مختلف اسپلنومگالی وجود دارد.

در گروه بیماریهای کبدی بالاترین میزان SI متعلق به متلایان سیروز بود و درجه صفر در آنها یافت نشد و درصد قابل توجهی از بیماران در درجه چهار و پنج قرار داشتند. در حالیکه در CAH و AVH اسپلنومگالی درجه چهار و پنج یافت نشد.

در گروه بیماریهای خونی بیشترین میزان SI در این گروه متعلق به

منابع

- 1- Robbin's pathologic basic of disease.5th ed. 1994.
- 2- Margulis. Alimentary tract radiology. 5th ed. 1994.
- 3- Meschan I.An atlas of anatomy basic to radiology. 1975.
- 4- Sutton D. textbook of radiology & Imaging. 6th ed.1998.
- 5- Saunder S. Clinical sonography. 2th ed.1991 .
- 6- Guyton A. Textbook of medical physiology. 9th ed. 1996.