

# بررسی آینده‌نگر ۳۱۷ بیمار مبتلا به پارکینسون و گزارش آنوسمی در آنها

دکتر اکبر سلطان‌زاده - دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

## A Prospective Study of 137 Patients with Parkinson's Disease and Anosmia

### ABSTRACT

In this research we tried to study frequency of clinical manifestations in Parkinson's disease.

Hence, a prospective study was conducted in 317 patients who were affected by parkinson's disease. In a questionnaire we collected data of patient's age, gender and signs and symptoms and then analyzed them.

The most common features in our patients were tremor and muscular rigidity. Olfactory dysfunction was observed in %61 of our patients. Dysarthria, stooped posture, fixed facial expression, intellectual deterioration and the on-off response had various frequency among the patients.

A new and important point in our research was considerable frequency of Anosmia or Hyposmia in spite of it's low prevalence among the patients of previous studies.

### خلاصه

برجای می‌گذارد، با توجه به شیوع نسبی بالای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

در مراحل اولیه بیماری، ترمور ممکن است موجب محدودیت‌های اجتماعی یا تهدیدات شغلی شود. سپس کاهش مهارت‌ها و حرکات منجر به افزایش وابستگی به دیگران برای مراقبت از خود و محدودیت شغلی می‌شود.

با توجه به اینکه تشخیص بیماری پارکینسون تقریباً بطور کامل بر اساس یافته‌های بالینی صورت گرفته و پاراکلینیک و تکنیک‌های تصویربرداری نقش چندانی در تشخیص بیماری ندارند، لذا شناخت صحیح علائم بالینی و شیوع آنها در جهت تشخیص صحیح و اقدام درمانی به موقع و مناسب موجب کنترل بسیاری از مشکلات مذکور خواهد شد.

چهار علامت اصلی پارکینسون عبارتند از: ترمور، رژیدیتی، آکیزی و عدم ثبات وضعیتی. ترمور شایعترین اختلال حرکتی می‌باشد<sup>(۲)</sup> و در یک مطالعه در ۷۰٪ مبتلایان به PD<sup>(۱)</sup> در زمان تشخیص وجود داشته است<sup>(۱۲)</sup>. ترمور در حال استراحت تشخیص وجود داشته است<sup>(۱۲)</sup>. (Resting tremor) بهترین علامت شناخته شده پارکینسونیسم می‌باشد. در پارکینسون ترمور بیشتر در اندامهای است، ولی ممکن است در چانه نیز دیده شود. حرکت تسبیح انداختن (Pill rolling) در انگشت شست، شایعترین فرم ترمور می‌باشد<sup>(۱)</sup>. انجام حرکات هدفدار موقتاً باعث مهار ترمور می‌شود. از نکات جالبی که نگارنده به آن پی برده است، آشکار شدن ترمور در هنگام راه رفتن و زمانی

در این مطالعه کوشش بر آن بوده است تا علائم بالینی بیماری پارکینسون و میزان شیوع آنها مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در یک مطالعه آینده‌نگر از ۳۱۷ بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب مغاینه بعمل آمده و اطلاعات مربوط به سن، جنس و علائم بالینی بر اساس پرسشنامه از پیش تعیین شده جمع‌آوری گردید و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

شايعترین تابلوی بیماری، ترمور و بعد از آن رژیدیتی عضلانی بوده است. اختلال بولیایی در ۶۱٪ بیماران مشاهده گردید. اختلال تکلم، قامت خمیده، قیafe ماسکه، اختلال قوای ذهنی و هوشی و پدیده On & Off با شیوع متفاوتی مشاهده گردید.

نکته نسبتاً جدید و مهم در این مقاله وجود آنوسمی یا هیپوسمی در بیماران پارکینسونی است که در سایر کتب و مقالات اشاره بسیار کمی به آنها شده است و در بیماران ما بطور قابل ملاحظه‌ای وجود داشت.

واژه‌های کلیدی: پارکینسون، بیماریهای خارج هرمی، آنوسمی.

### مقدمه

بیماری پارکینسون که از مشکلات نوروولژی و از بیماریهای اصلی سیستم حرکتی می‌باشد، از شیوع قابل ملاحظه‌ای در جوامع بروخوردار می‌باشد. بروز آن  $\frac{20}{10000}$  و شیوع آن  $\frac{150}{1000}$  است. ۱٪ افراد بالای ۶۵ سال و ۲٪ افراد بالای ۷۰ سال به این بیماری مبتلا می‌شوند<sup>(۱۲)</sup>. اثرات منفی جسمی و روانی که این بیماری

حرکتی باشد.

### روش تحقیق

مطالعه تحقیقاتی در دو بخش توصیفی و تحلیلی بصورت آینده‌نگر در ۳۱۷ بیمار مبتلا به بیماری پارکینسون، مراجعت کننده به درمانگاه اعصاب انجام شده است.

اهداف اصلی این مطالعه تعیین فراوانی نسبی تظاهرات بالینی بیماری پارکینسون، تعیین فراوانی ترمور و رژیدیتی بر حسب جنس، تعیین فراوانی نسبی تابلوی اصلی بیماری و انواع اختلالات بویاپی بوده است. مجموعه اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسشنامه و معاینه دقیق بالینی جمع‌آوری شده است. بیمارانی که اطلاعات آنها ناقص و یا پارکینسون آنها داروئی بود، از برسی کنار گذاشته شدند و نهایتاً ۳۱۷ بیمار که بطور قطعی از پارکینسون رنج می‌بردند مورد مطالعه قرار گرفتند. از کلیه بیماران CT-Scan انجام شد تا ضایعات عضوی دیگر کنار گذاشته شود.

نکته مهمی که در این مقاله بیشتر مورد نظر قرار گرفت بررسی بویاپی بیماران بود، بدین صورت که ابتدای سوراخ بینی را مسدود کردیم و سوراخ دیگر را با آب (که بدون بو می‌باشد) تست نمودیم، سپس ماده بودار (گلاب و یا صابون) را برای هر بیمار و برای هر سوراخ بینی بطور جداگانه آزمایش کرده و از بیمار خواستیم نتیجه را اعلام نماید. همین آزمایش را در مورد سوراخ دیگر بینی نیز تست نموده و نتایج را در پرسشنامه وارد کردیم. این آزمایش را در بیماران شاهد با همین گروه سنتی نیز انجام دادیم. چنانچه بیماران مورد مطالعه و نیز گروه شاهد سابقه ضربه مغزی، سیتوزیت و یا مصرف زیاد سیگار داشته و یا در پاسخ دادن حالت وسوسی زیاد نشان می‌دادند، مثلاً در پاسخ به تست بویاپی با آب جواب غلط می‌دادند، از مطالعه حذف شدند تا نتایج دقیقتری بدست آید. بیماری که بخوبی بوها را حسن نموده و تشخیص می‌داد، طبیعی تلقی شده و چنانچه بسخنی و با تأمل زیاد بوی کمی حسن می‌نمود، بعنوان هیپوسی و اگر اصلًا بویی درک نمی‌کرد تحت عنوان آنوسی طبقه‌بندی گردید.

### نتایج و تجزیه و تحلیل اطلاعات

از ۳۱۷ بیمار تشخیص داده شده، ۲۴۱ مورد (۷۴٪) مرد و ۷۶ زن (۲۶٪) بوده‌اند (اکثریت بیماران را مردان تشکیل می‌دادند). پایین‌ترین سن شروع بیماری در این مطالعه ۱۶ سالگی و بالاترین سن شروع بیماری ۸۲ سالگی بوده است. نفر (۷٪) بیماری‌شان در سن ۵۰ و یا زودتر شروع شده بود. در صورتی که در ۲۶۵ نفر (۸۲٪) از بیماران، سن شروع بیماری بالای ۵۰ سال بوده است.

در ۲۱۳ مورد (۶٪) لرزش در هنگام استراحت، تابلوی اصلی بیماری بوده است که در ۱۸۴ نفر (۵٪) به تنها و در ۴۸ مورد (۱۵٪) همراه با رژیدیتی، تظاهر اصلی بیماری بوده است. در ۷۳

است که دستان بیمار در کنار تنہ او آویزان می‌باشد. رژیدیتی یا سفتی عضلاتی در بیشتر بیماران پارکینسونی دیده می‌شود که در مراحل اولیه ممکن است خفیف و محدود به گروهی از عضلات باشد، اما بطور متغیر پیشرفت نموده و بیشتر توافقی بدن را درگیر می‌کند. رژیدیتی در ایجاد محدودیت، کندی حرکات و بدشکلی اندامها و تنه که از ویژگیهای PD می‌باشد، دخیل است. رژیدیتی عضلات، فلکسورها را بیش از سایر عضلات درگیر می‌سازد که خود توجیهی برای وضعیت خمیده بیماران پارکینسونی برویه در مراحل پیشرفت‌های تر می‌باشد.

آکیتزی مهمترین و اصلی‌ترین نقص عملکردی اولیه در PD است. آکیتزی عبارتست از ناتوانی در تغییر نحوه فعالیت حرکتی یا انجام سریع و آسان حرکات ارادی روزمره زندگی، به منظور توصیف درجات خفیفتری از اختلالات فوق از واژه‌های برادیکیتیزی و هیپوکیتیزی استفاده می‌شود. آکیتزی عاجزکننده‌ترین ویژگی بیماری پارکینسون است. بیماران آکیتیک، دچار بی‌حرکتی و کاهش شدید فعالیت می‌شوند. احتمالاً آکیتزی علت بسیاری از علائم شایع و آشناهای بیماری پارکینسون نظیر بی‌حالتی صورت، نکلم مونoton، میکروگرافی و اشکال در برخاستن از صندلی و اقدام به راه رفتن است.

قامات خمیده ثابت‌ترین و قابل تشخیص ترین نشانه در پارکینسونیم می‌باشد. در وضعیت ایستاده، دستها انحنای یافته، تنه به جلو خم شده، شانه‌ها پایین افتاده، بازو و آرنج خم شده و دستها در جلوی تنه قرار می‌گیرند. گردن به حالت خمیده است و گاهی شدت این خمیدگی موجب انحراف صورت به سمت بالا می‌شود. دست بیماران به صورتی است که مقاصل متاکارپوفالریال به حالت فلکسیون، مقاصل بین فالنکس‌ها در وضعیت اکستانتیون و انگشت شست در مقابل سایر انگشتان قرار می‌گیرد. بیماران با درگیری محوری یا دوطرفه در معرض سقوط هستند.

درد و علائم حسی می‌تواند در PD رخ دهد. گرچه تشخیص بیماری بر اساس علائم حرکتی است، ولی ۴۰٪ بیماران علائم حسی اولیه مثلاً در اندامها را خصوصاً وقتی مورد پرسش قرار می‌گیرند، بیان می‌کنند. در یک بررسی، علائم اولیه حسی در ۹۰٪ موارد مقدم بر ناتوانی حرکتی بوده که تشخیص اولیه را مشکل کرده بود (۸).

اختلال بویاپی تنها نقص حسی قابل اثبات در PD است. در یک مطالعه شان داده شده است که ۹۰٪ بیماران تسبت به تست بویاپی حساسیت پایین نشان می‌دهند و ۳۸٪ اختلال شدید بویاپی داشته و علامت دار می‌باشند.

درجه اختلال بویاپی با شدت و مدت بیماری و درمان ارتباطی ندارد (۸). اختلالات دیگر از قبیل اختلال تکلم، اختلال عملکرد مثانه، اختلال در حرکات خودکار و نیمه‌خودکار و اختلالات پسیکولوژیک نیز در PD دیده می‌شوند.

افسردگی در ۵۰٪ بیماران دیده شده که می‌تواند پیشناز علائم

قابل ملاحظه‌ای ناپدید یا کمتر شد.  
 ۵۱ بیمار (۱۶٪) از نظر وضعیت ذهنی و هوشی غیرطبیعی بودند.  
 پدیده On & Off در ۴۳ مورد (۱۴٪) دیده شد.  
 ۲۰ نفر (۶۴٪) تابلوی بیماری را بشکل دو طرفه و ۱۱۴ نفر (۳۶٪) بصورت یکطرفه نشان دادند.  
 ۷۰ بیمار (۲۲٪) علیرغم مصرف دارو برای انجام کارهای شخصی بطور کامل به کمک دیگران نیاز داشتند.  
 سابقهٔ فامیلی مثبت در ۷ بیمار (۲٪) و سابقهٔ تروما و استرس در ۱۴ مورد (۴٪) دیده شد.

جدول ۱- فراوانی مطلق و نسبی تظاهرات بالینی در ۳۱۷ بیمار پارکینسونی مورد مطالعه

درصد	تعداد	ویژگی بالینی
%۷۴	۲۳۷	قرمز
%۵۹	۱۸۷	رژیدیتی
%۳۰	۹۴	اختلال تکلم
%۶۱	۱۹۴	اختلال بوبایی
%۱۷	۵۵	خمیدگی قامت
%۲۰	۵۷	چهره ماسکه
%۱۶	۵۱	اختلال قوا عقلی - هوشی
%۲۲	۷۰	وابستگی به دیگران جهت انجام کار شخصی
%۱۴	۴۳	وجود پدیده On & Off
%۳۶	۱۱۴	وجود علائم پارکینسون در یکطرف
%۶۴	۲۰۳	وجود علائم پارکینسون در دو طرف
%۲۹	%۹۲	اختلال شدید راه رفتن

بیمار (۳۵٪) رژیدیتی به تنها یی تابلوی اصلی بوده و در ۱۵ مورد (۸٪) تظاهرات بالینی دیگری از قبل برادیکیزی، اختلال تکلم، اختلال راه رفتن، عدم تعادل و دیستونی تابلوی اصلی بیماری را تشکیل داده است.

ترمور در ۲۳۷ بیمار (۷۴٪) مشاهده گردید که ۵۶ نفر آنها زن و ۱۸۱ نفر مرد بودند. برطبق این نتایج، ترمور در ۷۳٪ زنها و ۷۵٪ مردان وجودداشت، ولی از نظر آماری ارتباط معنی داری بین ترمور و جنسیت یافت نشد.

رژیدیتی در ۱۸۷ بیمار (۵۹٪) ملاحظه گردید که شامل ۴۲ زن و ۱۴۵ مرد بودند و بر این اساس، رژیدیتی در ۵۵٪ زنها و ۶۰٪ مردان وجود داشت.

۱۹۴ بیمار (۶۷٪) به نحوی اختلال بوبایی را نشان دادند. ۹ نفر (۱۰٪ کل بیماران) اختلال بوبایی یکطرفه داشتند که در ۹ نفر (۱٪) بصورت کاهش بوبایی (هیپوسミ) و در ۲۱ نفر (۷٪) بشکل فقدان بوبایی (آنوسی) یکطرفه بود. ۱۶۴ بیمار (۵۱٪) اختلال بوبایی دو طرفه داشتند که ۱۱۲ نفر (۳۵٪) فقدان بوبایی دو طرفه، ۲۹ نفر (۹٪) کاهش بوبایی دو طرفه، ۲۲ نفر (۷٪) کاهش بوبایی در یکطرف و فقدان بوبایی در طرف دیگر را نشان می‌دادند. آزمایش بوبایی بر روی ۱۰۰ نفر گروه شاهد صورت گرفت که فقط ۵٪ آنها اختلال بوبایی را نشان دادند. گروه شاهد هیچکدام سابقهٔ ضربهٔ مغزی و ریخت آرژیک نداشته و سیگاری نیز نبودند. قامت خمیده پارکینسونی در ۵۵ نفر از کل بیماران وجود داشت. ۵۷ نفر (۲۰٪) چهره ماسکه داشتند.

اختلال تکلم تپیک پارکینسونی در ۹۴ بیمار (۳۰٪) مشاهده گردید.

اختلال تفکر مانند توهمندی، حالت رؤیایی زنده و هذیان در ۳۲٪ بیماران ملاحظه شد که بیشتر مربوط به مصرف قرص ال دو پا و تری‌هگزی‌فنیدیل بود. چون با قطع یا کاهش دارو، این علائم بطور

جدول ۲- بررسی انواع اختلالات بوبایی بر حسب جنس در ۳۱۷ بیمار مورد مطالعه

کل		مرد		زن		هیپوسی یکطرفه آنوسی یکطرفه
درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	
%۳	۱۰	%۱۵	۵	%۱۵	۵	کل اختلالات بوبایی یکطرفه
%۷	۲۰	%۶۵	۱۹	%۱۵	۲	هیپوسی دو طرفه
%۱۰	۳۰	%۸	۲۴	%۲	۷	آنوسی دو طرفه
%۹	۲۹	%۶۵	۲۱	%۲۵	۸	هیپوسی + آنوسی
%۳۵	۱۱۲	%۲۷/۵	۸۸	%۷/۵	۲۴	کل اختلالات بوبایی دو طرفه
%۷	۲۲	%۵/۵	۱۷	%۱/۵	۵	کل اختلالات بوبایی
%۵۱	۱۶۳	%۳۹/۵	۱۲۶	%۱۱/۵	۳۷	
%۶۱	۱۹۴	%۴۷/۵	۱۵۰	%۱۳/۵	۴۴	

معلومیت شده و مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر فرد و جامعه تحمیل می‌نماید، تشخیص و درمان

## بحث و نتیجه‌گیری

از آنجا که پارکینسون بیماری شایعی است که در درازمدت باعث

حداقل در مطالعات قابل دسترس ما ملاحظه نگردید. از طرفی بین اختلال بویایی و میزان کارآیی مغزی رابطه‌ای بدست نیامد. به نظر می‌رسد در عده‌ای از بیماران همان دژنرنسانس که در سلولهای تولید کننده دوپامین بروز می‌کند در ساختمنهای اولیه بویایی نیز پدیدار می‌شود و این آسیب برگشت‌پذیر نمی‌باشد. در برخی کتب ذکر شده است که اولین علامت پارکینسون ممکن است کندی حرکات و سفتی باشد، ولی چون این علامت نسبت به ترمور چشمگیر و قابل روئیت نیست کمتر موجب مراجعة بیماران به پزشک می‌شود. ولی چون ترمور علامت مشخصی می‌باشد سبب مراجعة بیمار به پزشک می‌گردد. به همین دلیل در بیماران ما نیز شایع‌ترین نشانه، ترمور بوده است.

البته چنانچه بیماران پارکینسونی در مرحله نهایی بیماری مورد مطالعه قرار گیرند، آمار و ارقام در مورد علامت پیش از اینها خواهد بود، ولی این بررسی بر روی بیمارانی صورت گرفته که پس از انتخاب، با نخستین مراجعة وارد مطالعه گردیده‌اند. بنابراین برخی بیماران در Stage اول و بعضی در Stage چهار بیماری مورد بررسی قرار گرفتند. یکی از مشکلات عمده‌ای که در بیماران ما ملاحظه شد توهمنات بسیار شدیدی بود که حتی با کمک‌کردن یا قطع داروهای ایجاد کننده توهمندی مثل ال‌دوپا، تری‌هگزی‌فنیدیل و آماتادین ادامه داشت و به نظر می‌رسد که آتروفی مغز و دماغی ناشی از پارکینسون، خود یکی از فاکتورهای مهم تظاهرات روانی این بیماری بوده (۸) و یا چنانچه بیماران آتروفی مغز داشته باشند، زودتر دچار این علامت می‌گردند.

در همه بیمارانی که دچار حالات روانی شده بودند، CT-Scan تغییرات آتروفیک مشخصی نشان داد. تنها در ۳ مورد در خونریزی ساب‌دورال یک یا دو طرفه مشاهده شد که توجه کننده علامت روحی و اختلال هوشیاری بیماران بود.

نتیجه مهم اینکه وجود آتوسمی در بیماران پارکینسونی نشان‌دهنده مسئله مهمی تبوده و چنانچه توهمندی و هذیان بروز نمود باید به فکر ضایعات ارگانیک و مصرف داروها باشیم (۳). بالاخره اگر بیماران پارکینسونی دچار اختلالات حافظه و کوحا شدند، بایستی خونریزی ساب‌دورال حاد و مزمن را در نظر داشته باشیم (۱۱).

در پایان خاطرنشان می‌شود که اخیراً روش جراحی جدیدی به طریق پالیدوتومی تحول تازه‌ای در درمان بیماران پارکینسونی بوجود آورده است (۷).

صحیح و بموضع آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تشخیص و درمان بیماری پارکینسون، عمدها بر اساس علائم بالینی بوده و تست‌های آزمایشگاهی هیچ کمکی در اثبات یا رد بیماری پارکینسون در فردی که دارای علائم پارکینسونیسم می‌باشد، نمی‌کند. بررسی‌های پاراکلینیک تنها برای یافتن ایتوکلوریهای دیگر و رد سایر بیماریهای است.

در مطالعه انجام شده به تایجی دست یافته‌یم که به قرار زیر است:

۱- بیماری پارکینسون در مردان شایع‌تر از زنان است (۷۴٪ مرد در مقابل ۲۶٪ زن)

۲- با افزایش سن، شیوع بیماری بیشتر شده و در ۸۲٪ بیماران، بیماری بعد از ۵۰ سالگی آغاز گردیده است (۴).

۳- در اکثر موارد ترمور تابلوی اصلی و عملت مراجعة بیماران بوده و بعد از آن رژیدیتی تظاهر اصلی بیماری را تشکیل داده است. سایر علائم صرفنظر از شیوع، بندرت و پیوگی بارز و تابلوی اصلی بیماری بوده‌اند.

۴- ترمور، رژیدیتی، اختلال بویایی و اختلال تکلم تیپیک پارکینسونی، یافته‌های بالینی شایع در این بیماری بوده و مواردی از قبیل اختلال وضع عقلی و هوشی، قامت خمیده، چهره ماسکه و پدیده On & Off از شیوع کمتری برخوردار بودند.

۵- مهمترین ویژگی این تحقیق، بررسی اختلالات بویایی در بیماران پارکینسونی می‌باشد که تاکنون فقط تعداد محدودی مطالعه در این زمینه انجام شده است. اختلال بویایی در ۶۱٪ بیماران مشاهده گردید که ۱۰٪ یکطرفه و ۵۱٪ دوطرفه بوده است. در بررسی بیماران مورد نظر، بروز ارثی در بیماران ما بسیار ناچیز بوده است. در صورتی که در برخی مقالات به وراثت اهمیت زیادی داده شده است (۱۳) و به نظر می‌رسد در بیماران ما که همه ایرانی بوده‌اند مسائله ارثی و ژنی کمتر دیده می‌شود.

نکته جالب دیگر وجود اختلال بویایی در بیماران مورد بررسی ما بوده است که بین این اختلال و شدت علائم، هیچ ارتباطی بدست نیامد. حتی برخی بیماران علیرغم کم شدت بودن بیماری، اختلال بویایی داشت و بر عکس در بعضی بیماران با پارکینسون پیشرفت، اختلال بویایی ملاحظه نشد. مسئله قابل توجه دیگر اینکه در ۳ بیمار دچار اختلال بویایی، بیماران ذکر می‌کردند قبل از ابتلاء به پارکینسون، به عارضه خود آگاهی داشته‌اند. هنوز در مقالات و کتب، ارتباط مشخصی بین اختلال بویایی و پارکینسون ذکر نشده و مطالعه‌ای به این وسعت در مورد حس بویایی پارکینسونی‌ها،

## منابع

- ۱- سلطانزاده، اکبر (۱۳۷۶) بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات، ناشر مؤلف.
- ۲- Adams RD, Victor M (1993) Principles of Neurology, 5th edition, McGraw-Hill.
- ۳- Aminoff MJ (ed) (1995) Neurology and general medicine. 2th edition Churchill Livingstone.
- ۴- De Ri JK MC, Breteler MM, Graveland GA, et al Prevalence

- Parkinson's Disease in elderly: The Rotterdam study Neurology 1995, 45: 2143-6.
- 5- Isselbacher KJ, Braunwald E, Wilson JD, Martin JB, Fauci AS, Kasper DL (eds) (1994) Harrison's Principles of internal medicine, 13th edition. MC Graw-Hill.
- 6- Jankovic J, Tolosa E (1992) Parkinson's Disease and Movement Disorders Urban & Schwartzenberg.
- 7- Johnsson F, Malm J, Nordh E, et al Use folnen of pallidotomy in advanced Parkinson's Disease, Journal of Neu. Neuros p 51, Feb 1997, Vol. 62, No.2, Page 125-132.
- 8- Koller W (1992) Handbook of Parkinson's Disease, 2th edition. Marcel Dekker.
- 9- Nutt JG, Hammerstad JP, Gancher ST. (1992) Parkinson's Disease.
- 10- Rajput AH, Rozdilsky B, Ang (1991) Occurrence of resting tremor in Parkinson's Disease. Neurology 41: 1298-9.
- 11- Rowland LP (ed) (1995) Merritt's Textbook of Neurology 9th edition Williams & Wilkins.
- 12- Swash M, Oxbury J (eds) (1991) Clinical Neurology. Churchill Livingstone.
- 13- Wood NW., Genes and Parkinonism Journal Neurology Neurosurgery & Psychiatry April 1997 Vol 2 N.4 Pagr 305-309.