

# بررسی تحقیقی تنوع گروههای خونی ABO و RH در ۱۱۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس

دکتر مهین ولیخانی، استاد گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران

## RESEARCH STUDY OF DIVERSITY OF RH AND ABO BLOOD GROUPS IN 110 PSORIATIC PATIENTS

### ABSTRACT

Psoriasis is an common, Chronic, recurrent, inflammatory disease of the skin. Characterized by red scaling plaques on the skin surface. The morphology of psoriatic lesions allows classification of the different types of psoriasis that included plaque type, pustular type and Erythrodermic type.

I have studied the relationship between distribution of RH and ABO Blood groups in 110 psoriatic patients and compared with control normal blood groups. The result of this study was as follow :

The rate of blood group type AB was significantly lower than that of the control normal blood group ABO.

### مقدمه

پسوریازیس یک بیماری مزمن ، عود کننده و شایع پوست اریترودرمیک دیده می شود (۱).  
در شکل پلاکی، بیماری بشكل پلاکهای اریتماتوسکوامو بوده که بیشتر در نواحی اکستانسور اندامها، تن و سر ایجاد میشود. البته هر نقطه پوست و ناخنها نیز ممکن است گرفتار شوند. در شکل پوستولر، بیماری به شکل پوستولهای استریل در زمینه اریتماتو می باشد و ممکن است به شکل منتشره در تمام بدن و یا به صورت موضعی بر روی دست و پا باشد. شکل اریترودرمیک آن بصورت درماتیت اکسfoliativo-nazal به خواهد آمد که

### چکیده

پسوریازیس یک بیماری مزمن ، عود کننده و شایع پوست می باشد که با پلاکهای قرمز پوسته دار در سطح پوست شناخته می شود ضایعات پسوریازیس از نظر شکل به سه شکل پلاکی ، پوستولر و اریترودرمیک تقسیم می شود.  
در این مطالعه ۱۱۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس را از نظر تنوع گروههای خونی ABO و RH مورد بررسی قرار داده و با گروههای خونی افراد سالم مقایسه کردیم و این نتیجه به دست آمد که افراد دارای گروههای خونی AB به طور معنی داری کمتر از گروههای خونی دیگر مستعد باشند، به پسوریازیس می باشند.

## روش کار

از ۱۱۰ بیماری که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند ۴۹ نفر زن و ۶۱ نفر مرد بودند. جوانترین بیمار ما ۱/۵ سال و مسن ترین آنها ۹۰ سال سن داشته است و متوسط سن بیماران ۳۶ سال بوده است. کمترین سایقه ابتلاء ۲۰ روز و بیشترین سایقه ابتلاء ۳۳ سال بوده است. از تمام بیماران بیوپسی به عمل آمد و توسط آسیب شناسی ابتلاء آنها به پسوریازیس تأیید گردید. از تمامی بیماران آزمایش گروههای خونی ABO و RH بعمل آمده است و سرانجام نتایج تنوع گروههای خونی ABO و RH مثبت و منفی بدست آمده از بیماران، با تنوع گروههای خونی ABO و RH مثبت و منفی افراد جامعه که توسط مرکز انتقال خون ایران ارائه شده بود مقایسه گردید.

## نتیجه

نتایج بدست آمده از تنوع گروههای خونی ABO و RH مثبت و منفی در ۱۱۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس که بیماری آنها با آسیب شناسی مورد تأیید بوده است به قرار ذیل است:

گروه خونی O شامل ۴۶ نفر، معادل ۴۱/۸۱ درصد بوده است که از این تعداد ۴۲ نفر RH مثبت و ۴ نفر RH منفی داشته‌اند.  
گروه خونی A شامل ۳۹ نفر، معادل ۴۵/۳۵ درصد بوده است که از این تعداد ۳۶ نفر RH مثبت و ۳ نفر RH منفی داشته‌اند.  
گروه خونی B شامل ۲۳ نفر، معادل ۹/۹۰ درصد بوده است که از این تعداد ۲۰ نفر RH مثبت و ۳ نفر RH منفی داشته‌اند.

گروه خونی AB شامل ۲ نفر، معادل ۱/۸۱ درصد بوده است که از این تعداد هر دو نفر RH مثبت داشته و بیمار RH منفی داشته‌اند.

از آمار فوق چنین نتیجه‌گیری می‌شود که از کل ۱۱۰ بیمار ۱۰۰ بیمار معادل (۹۰/۹۰ درصد) RH مثبت و ۱۰ بیمار معادل (۹/۹ درصد) RH منفی داشته‌اند.

جدول شماره (۱) مقایسه تنوع گروه خونی ABO در افراد بیمار و شاهد

افراد شاهد	مطالعه بیماران حاضر			گروه خونی
	درصد	تعداد	درصد	ABO
۳۶/۳۵		۴۱/۸۱	۴۶	O
۳۲/۱۴		۳۵/۴۵	۳۹	A
۲۳/۷۲		۲۰/۹۰	۲۳	B
۷/۷۹		۱/۸۲	۲	AB
۱۰۰	۱۰۰	۱۱۰		جمع

ممکن است بدنیال شکل پلاکی و پوستولر ایجاد شود. گرفتاری مفاصل بویژه مفاصل کوچک دست و پا بشکل التهاب مفصلی دیده می‌شود که ممکن است منجر به انهدام مفصلی یا انکیلوز گردد. بیماری در تمام سنین و در تمام نژادها دیده می‌شود (۱ و ۲) و نسبت ابتلاء در زن و مرد نیز یکسان است. بیماری گاه به شکل فامیلی دیده می‌شود بطوریکه در اینگونه موارد شروع ضایعه معمولاً در محدوده سنی کمتری می‌باشد (۱).


تشخیص این بیماری با آسیب شناسی تأیید می‌گردد بطوریکه شامل ضخیم شدن کرتاهای مالپیگی، طویل شدن ادماتودرمال پاپیلا، نازک شدن طبقه مالپیگی در قسمت فوقانی پاپیلا، پاراکراتوز وجود میکروآیسه موترو می‌باشد. و در موارد پوستولر، پوستولهای اسپوژیو فرم استریل در داخل اپیدرم موجود است (۲ و ۳).

در این بیماری HLA مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که افراد دارای HLA - CW6 - HLA، احتمال ابتلاء بیشتری را نسبت به پسوریازیس نشان میدهند (۱ و ۲) همچنین افرادی که دارای HLA B13 و HLA B17 نیز می‌باشند بعضی از اشکال بیماری مذکور در آنها بیشتر دیده می‌شود (۱ و ۲). اما ارتباط تنوع گروههای خونی ABO و RH تا آنجا که در این مطالعه مطالعه مورد بررسی قرار گرفت در این بیماری انجام نشده است و ما برای اولین بار این بررسی و تحقیق را در این بیماری انجام داده‌ایم.

این بررسی به این علت صورت گرفته است که علیرغم بررسی انجام شده بر تنوع گروههای خونی ABO و RH در بعضی از بیماریهای مانند سرطان کولون (۵) سرطان سرویکس رحم (۶) سرطان ریه (۶) سطح کلسترول، اسید اوریک و فشار خون (۷) و بسیاری از بیماریهای خونی و گوارشی و یا سایر سرطانها، که همراه تابع نتایج ملاحظه‌ای نیز بوده است. ولی در مورد پسوریازیس که یک بیماری نسبتاً شایعی است (با توجه به مطالعات ما) چنین بررسیهایی انجام نشده است. لذا ما این مطالعه را بر روی ۱۱۰ بیمار مبتلا به پسوریازیس که بین سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۳ به درمانگاه پوست بیمارستان رازی مراجعه کرده بودند و بیماری آنها با آسیب شناسی تأیید شده بود انجام دادیم و امید است که در سالهای بعد با تعداد بیشتری از بیماران این مطالعه ادامه یابد تا بتوان نتایج دقیق تری را ارائه نمود.

تعداد بسیاری از این بیماران در بخش پوست بسترهای بوده‌اند و تعدادی هم بطور سریائی مراجعه کرده‌اند. در تمام بیماران آزمایش گروههای خونی ABO و RH بعمل آمده است و سرانجام این نتایج با تنوع گروههای خونی ABO و RH افراد جامعه که از مطالعه مرکز انتقال خون در ایران بدست آمده بود مقایسه قرار گرفت (۸).

برای بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار آماری مجدداً از آزمون کای دو ( $X^2$ ) استفاده شد (جدول و نمودار شماره ۲) و بدنیال آن مشخص گردید که اختلاف آنها از نظر آماری کاملاً معنی دار است. این اختلاف نشان می دهد که افراد دارای گروه خونی AB بطور معنی داری کمتر از گروههای خونی دیگر مستعد ابتلاء به پسوریازیس میباشند.



نمودار شماره (۲): توزیع فراوانی گروههای خونی O, A, B و AB در مطالعه بیماران (سال ۷۳-۷۰) و افراد شاهد در ایران در مرحله بعدی RH مثبت و منفی بدست آمده از بیماران مورد مطالعه را با RH مثبت و منفی افراد شاهد که از مطالعه آماری مرکز انتقال خون در افراد ایران بدست آمده بود (۱) مورد مقایسه آماری قرار داده ایم. (جدول و نمودار شماره ۳).


افراد شاهد	مطالعه بیماران حاضر			RH
	درصد	تعداد	درصد	
۸۹/۶۲	۹۰/۹	۱۰۰		RH+
۱۰/۲۸	۹/۱	۱۰		RH-
۱۰۰	۱۰۰	۱۱۰		جمع

جدول شماره (۳): مقایسه تنوع RH مثبت و منفی در افراد بیمار و سالم شاهد

برای بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار آماری بین بیماران مورد مطالعه و افراد شاهد از نظر RH مثبت و منفی باز هم از آزمون کای دو ( $X^2$ ) استفاده گردید و نتایج آن مطابق جدول و نمودار شماره ۳ شان داده شد بطوریکه بین این دو گروه بیماران مورد مطالعه و افراد شاهد از نظر RH مثبت و منفی اختلاف معنی دار آماری از تظر استعداد ابتلاء به پسوریازیس مشاهده نگردید. سرانجام از کل مطالعه آماری انجام شده بین بیماران مورد مطالعه و افراد شاهد از نظر گروههای خونی AB, ABO, RH مثبت و منفی چنین نتیجه

بعد از تعیین درصد گروههای خونی ABO و RH مثبت و منفی ABO و RH، ما نتایج بدست آمده را با توزیع گروههای خونی ABO و RH مثبت و منفی افراد شاهد که نتایج آن به شرح زیر از بررسی آماری مرکز انتقال خون در افراد ایران بدست آمده است مقایسه کردیم. این نتایج عبارت بودند از گروه O معادل ۳۶/۳۶ درصد، گروه A معادل ۱۴/۳۲ درصد، گروه B معادل ۲۳/۷۲ و گروه AB معادل ۷/۷۹ درصد از نظر RH نیز ۶۲/۸۹ درصد RH مثبت و ۲۸/۱۰ درصد RH منفی بوده اند.

در ابتداء توزیع گروه خونی ABO بیماران با افراد شاهد مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. و سپس برای تعیین توزیع غیراوائی گروههای خونی بیماران مورد مطالعه و افراد شاهد از آزمون کای دو ( $X^2$ ) استفاده گردید (جدول و نمودار شماره ۱). و بدنیال آن مشخص گردید که اختلاف معنی داری بین گروههای خونی ABO در افراد بیمار و شاهد وجود ندارد.



نمودار شماره (۱): توزیع فراوانی نسبی گروههای خونی O, AB, B و A در مطالعه بیماران (سال ۷۳-۷۰) و افراد شاهد در ایران

در نهایت چون درصد گروه خونی AB در دو گروه افراد بیمار و شاهد تفاوت بسیار داشت ما برآن شدیم تا گروههای خونی A, B, O را با گروه خونی AB مورد مقایسه قرار دهیم (جدول و نمودار شماره ۲).

افراد شاهد	مطالعه بیماران حاضر			گروه خونی
	درصد	تعداد	درصد	
۹۲/۲	۹۸/۲	۱۰۸		O,A,B
۷/۸	۱/۸	۲		AB
۱۰۰	۱۰۰	۱۱۰		جمع

جدول شماره (۲): مقایسه تنوع گروه خونی O, A, B, AB در افراد بیمار و شاهد

## بحث


منظور از این مطالعه این بوده است که در بین توزیع گروههای خونی ABO و RH مثبت و منفی کدام گروه استعداد ابتلاء به پسوریازیس را نشان میدهد و با اصولاً ارتباطی موجود هست یا خیر.

همانطور که ثابت شده است بیمارانی که فنوتیپ HLA-CW6 را دارند (۱ و ۲) استعداد بیشتری به ابتلاء به پسوریازیس را نشان داده‌اند.

بررسی توزیع گروههای خونی ABO و RH در بسیاری از بیماریهای دیگر بویژه سرطانها انجام شده است بطور مثال در زنگنه که گروه خونی A داشته‌اند سرطان سر و یکس رحم بیشتر دیده شده است (۳)، و یا در بیمارانی که سرطان کلورکتال داشته‌اند اصولاً ارتباط معنی داری با گروه خونی ABO موجود نبوده (۴).

این بررسی همچنین در سرطانهای ریه (۵) و سرطانهای دیگر و همچنین در مواردی مثل بالا بودن فشار خون اسید اوریک و کلسترول هم انجام شده است (۶) و مانیز بر آن شدید که در بیماریهای شایع پوستی مثل پسوریازیس این بررسی را انجام دهیم و به این نتیجه رسیدیم که در بین توزیع گروههای خونی ABO گروه AB از نظر آماری بطور معنی داری کمتر از گروههای خونی دیگر مستعد ابتلاء به پسوریازیس میباشد.

گیری میشود که فقط افراد دارای گروه خونی AB به طور معنی داری کمتر از گروههای خونی دیگر استعداد ابتلاء به پسوریازیس را نشان میدهند.



نمودار شماره (۳): توزیع فراوانی RH مثبت و RH منفی در مطالعه بیماران (در سال ۷۳ - ۱۳۷۰) در افراد شاهد

## مراجع

- (۱) استخاری، میرزا آغا، آمار پخش گروههای خونی ایران، سازمان انتقال خون، کتاب انتقال خون، گرانش سپهرزیم، مشهد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
2. Rook & Wilkinsen, psoriasis Text book of dermatology 5th Edition, 1992; volum 2, 1391 London, Blackwell, Scientific Publication.
3. Arnold, Odom, psoriasis, Andrew's Diseases of the skin 8th Edition 1990; 198-214. Philadelphia : W.B Sanders company.
4. Kikained T, et al. psoriasis and HLA-CW6. BR J Dermatol. 1980; 102 : 179-84.
5. Kaşir I et al. Blood groups in relation to carcinoma of cervix uteri. Hum hered. 1992 ; 42 : 324.
6. Slater G et al. Clinico pathologi correlation of ABO and RH type in colorectal cancer. Dis - colon- Rectum .1993; 36 : 5-7
7. Cerny T; Fey-MF et al Prevalence of the RH Negative phenotype in caucasian patients with small cell lung carcinoma. int-j cancer. (1992) ; 52 : 504-6
8. Gillum RF. Blood groups, serum cholesterol, serum uric acid, serum pressure. J Nati med Assoc .1991; 83 : 682.