

متاستازهای کارسینومای استخوانی در اسکلت و

گزارش یک مورد بسیار نادر آن در دست

دکتر محمود فرزان، دانشیار گروه جراحی ارتودوپی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

METASTATIC CARCINOMA OF BONE IN SKELETON AND A REPORT ON ONE OF ITS RARE ONE IN HAND BONE

ABSTRACT

The primary carcinoma may secondarily invade bone tissue through direct extentions, blood circulation or lymphatic transportation particularly when it is arising from breast, prostate, kidney, thyroid and lung. Metastatic tumors of bone are more common than primary tumors of bone.

The most common tumor which metastasizes into bone, is the breast adenocarcinoma. Some metastatic tumors of bone including the breast cancer, may appear only as a destructive lesion, while prostatic carcinoma is osteoblastoma.

The metastasis is mostly appeared in skull, vertebrae, pelvic, femur and humerus bones.

The first metastatic syndrom is usually the affected bone pain and pathologic fractures are commonly caused by osteometsatasis.

چکیده

بدون تورم و علائم ناشی از وجود فشار بر روی ساختمانهای مجاور یا به علت شکستگی پاتولوژیک مراجعه می‌نماید. از لحاظ علائم رادیولوژیک، تومورهای متاستاتیک معمولاً باعث تخریب نامنظم استخوان می‌شوند که خود دال بر کیفیت بدخیمی آتهاست.

گرچه بیشتر اینگونه ضایعات، از جمله کارسینوم دستگاه گوارش استئولیتیک، می‌باشند ولی بعضی از آنها از جمله متاستاز کارسینوم پروستات استئوبلاستیک هستند.

در بیشتر موارد ناجیهای که عمل‌آگرفار متاستاز کارسینوم شده است به مراتب وسیعتر از آن است که در رادیوگرافی دیده می‌شود. هدف از درمان بیماران مبتلا به متاستاز اسکلت عبارتست از:

- ۱- کاهش درد
 - ۲- بهتر کردن کیفیت زندگی
 - ۳- بهتر کردن کیفیت پرستاری
 - ۴- تا حد ممکن، برگرداندن آنها به زندگی عادی و معمولی.
- بیماران مبتلا به متاستاز پروستات و پستان هم از درمان طبی وهم از درمان هورمونی - جراحی نتیجه می‌گیرند. عملهای جراحی ارتودوپی همراه با رادیوتراپی یا سایر درمانها در درمان متاستازهای اسکلتی، اغلب مفیدند.
- گاهگاهی آمپوتاسیون برای متاستاز منفرد اسکلت در نظر گرفته
- کارسینومای اولیه بخصوص آنکه متاستاز آن از پستان، پروستات، کلیه، تبروئید و شش باشد ممکن است بطور ثانویه بافت استخوانی را بطريق انتشار مستقیم، از راه جریان خون یا انتقال از راه لنف مورد تهاجم قرار دهد. تومورهای متاستاتیک استخوان به مراتب شایع تر از تومورهای اولیه استخوان می‌باشند.
- شایع ترین توموری که به استخوان متاستاز می‌دهد آذن‌کارسینومای پستان است.
- بعضی تومورهای متاستاتیک استخوان از جمله سرطان پستان ممکن است صرفاً به صورت یک ضایعه تخریبی باشند در حالیکه کارسینومای پروستات استئوبلاستیک می‌باشند.
- جایگاه متاستازها بیشتر در جمجمه، ستون فقرات، لگن، ران و استخوان بازو می‌باشد.
- ممکن است اولین علامت متاستاز به استخوان درد است شکستگی‌های پاتولوژیک در اثر متاستازهای استخوانی شایع می‌باشند.

مقدمه

تومورهای متاستاتیک، شایعترین تومورهای بدخیمی هستند که اسکلت را مبتلا می‌کنند. بیمار معمولاً به علت درد همراه تورم یا

انتهایی انگشت چهارم دست راست به خوبی مشخص بود. اسکن استخوانی: در ناحیه آرنج و نیز در بند انتهایی انگشت چهارم دست راست جذب بالاتری را نسبت به سایر مناطق اسکلت نشان می‌داد.

آزمایشات انجام شده: فسفر در حد طبیعی، کلسیم بالاتر از حد طبیعی و سدیماناتاسیون بالاتر از حد نرمال بود. بیوپسی از ناحیه آرنج: متاستاز سرطان مری.

چون متاستاز وجود دست، به معنی یک خبر شوم و مراحل نهایی زندگی است، لذا با مشورت با سایر همکاران رادیولوژیست - پاتولوژیست و انکولوژیست، بیمار تحت شیمی درمانی توانم با رادیوتراپی قرار گرفت که روز به روز دردهای سرکش اندام فوقانی راست تحت کنترل درآمد و تاکنون که حدود دو ماه از بستری شدن این بیمار می‌گذرد، خوشبختانه متاستاز ریوی پیدا نکرده و وضعیت نسبی بهتری نسبت به زمان مراجعته دارد.

نتیجه

تومورهای متاستاتیک شایعترین تومورهای بدخیمی هستند که اسکلت را فرامی‌گیرند. گرچه منشاء متاستاز در اسکلت می‌تواند از هر تومور بدخیمی باشد ولی تومورهای بدخیمی که بیشتر علاوه دارند به اسکلت متاستاز دهند، عبارتند از:

- ۱- کارسینوم پستان
- ۲- کارسینوم پروستات
- ۳- کارسینوم ریه
- ۴- کارسینوم تیروئید
- ۵- کارسینوم کلیه

۶- تومورهای بدخیم دستگاه گوارش (به تدرت)(۸). استخوانهایی از اسکلت که بیشتر گرفتار متاستاز می‌شوند عبارتند از: جمجمه، ستون فقرات، لگن، ران و بازو یعنی استخوانهای حاوی مغز استخوان قرمز محلهای شایعی برای پیداکردن متاستاز می‌باشند. متاستاز به استخوانهای زیر زانو یا زیر آرنج نادرند.

متاستاز به دست "acral metastases" شناخته شده است و معمولاً در ۵۰ درصد موارد ناشی از اسکوآموس سل کارسینومای ریه می‌باشد و در موارد نادر از سایر تومورهای بدخیم ریه منشاء می‌گیرد (معمولًا از منشاً برونشیال). متاستازهای استخوانی اسکلت به مراتب شایعتر از تومورهای بدخیم اولیه اسکلت می‌باشند. به طوری که نسبت متاستازهای استخوانی اسکلت به تومورهای اولیه استخوانی برابر بیست و پنج به یک ذکر کردند(۹).

بیش از ۸۰ درصد متاستازهای استخوانی ناشی از کارسینومای پستان، پروستات، خش، کلیه و تیروئید می‌باشند. سن متوسط بیماران متاستاز استخوان در حدود ۵۵ سال است در ۳ تا ۱۵ درصد بیماران دارای متاستاز استخوانی، محل تومور اولیه مشخص نیست. شایعترین توموری که به ستون فقرات متاستاز می‌دهد، تومور پستان است و نیز شایعترین توموری که به استخوان ران متاستاز می‌دهد، تومور پستان است. شایعترین

می‌شود (مثلًاً متاستاز ناشی از هیپرفنرومای کلیه). شیمی درمانی گاهگاهی باعث تسکین درد می‌شود.

منشاء متاستازهای استخوانی را با توجه به گروه سنی تحدید می‌توان حدس زد، برای مثال:

۱- متاستاز نوروپلاستوما بیندرت بعد از سن ۸ سالگی دیده می‌شود. متاستازهای نوروپلاستوما به صورت معمولی شامل ضایعات قرینه نزدیک به متافیز استخوانهای بلند می‌باشند، لذا در گروه سنی صفر تا ۸ سالگی چنانچه احتمال متاستاز وجود داشته باشد، بیشتر متاستاز نوروپلاستوما مطرح می‌شود.

۲- در گروه سنی ۸ تا ۲۰ سالگی بیشتر متاستاز کارسینوم تیروئید و متاستاز کارسینوم پستان مطرح می‌شود.

۳- در گروه سنی ۲۰ تا ۵۵ سالگی بیشتر متاستاز کارسینوم پستان در جنس زن و متاستاز کارسینوم پروستات در جنس مرد مطرح می‌شود.

۴- در گروه سنی ۵۵ تا ۷۵ سالگی بیشتر متاستاز کارسینوم کلیه در جنس زن و متاستاز کارسینوم پروستات در جنس مرد مطرح می‌شود، گرچه سایر تومورهای متاستاتیک نیز باستثنی در نظر گرفته شوند. متاستاز کارسینوم پروستات بیشتر در استخوانهای تنہ و استخوانهای بلند مجاور آنها دیده می‌شود. متاستاز هیپرفنرومای معمولاً در مرکز دیافیز استخوانهای بلند دیده می‌شود.

معرفی یک مورد بسیار نادر متاستاز ناشی از سرطان مری در دست

ح - مرد ۴۳ ساله کشاورزی است اهل و ساکن اردکان بزد، به علت درد شدید و تورم آرنج و دست راست مراجعته کرده است و علیرغم مراجعات متعدد به همکاران متخصص ارتپدی، بهبودی نسبی نیز نیافته است.

از حدود شش ماه قبل از مراجعته به درمانگاه ارتپدی بیمارستان امام خمینی، ناراحتی بیمار به صورت دیسفاری شروع شده که ابتدا نسبت به جامدات بوده و بتدریج شدید شده است، به طوری که نسبت به غذاهای مایع نیز دیسفاری داشته است. با مراجعته به همکار متخصص جراحی عمومی و انجام برونکوپری و نمونه برداری (بیوپسی) از تومور مری "squamous cell carcinoma" تشخیص داده شده است. چهار ماه قبل از مراجعته به درمانگاه با تشخیص کارسینوم مری تحت عمل جراحی قرار گرفته است (Akayama) و شیمی درمانی نیز به عنوان مکمل درمان جراحی برایش شروع شده است.

بیمار از یک ماه بعد از عمل جراحی سرطان مری دچار سوزش شدید و درد و تورم ناحیه آرنج و دست راست شده است. در موقع مراجعته به درمانگاه ارتپدی، آرنج و دست راست بیمار به شدت متورم، دردناک، همراه با محدودیت حرکتی بود، خستاً بند انتهایی انگشت چهارم دست راست نیز به شدت متورم، گرم، قرمز، دردناک بود همچنین بیمار در مدت یک ماه کاهش وزنی معادل ۸ کیلوگرم داشته است. رادیوگرافی: ضایعات لیتیک استخوانی در ناحیه آرنج و نیز در بند

زانت سل تومور، نقرس ، کندرولاستوما، آنوریسمال بن سیست (ABC)، کیست اپیدرومئید، کندروسارکوم، لمفوما و استئوسارکوم می باشند(۱۲).

شایعترین تومورهایی که به اسکلت متاستاز می دهند (با منشاء معلوم) شامل: پستان، پروستات و ریه می باشند.

شایعترین تومورهایی که به اسکلت متاستاز می دهند، با منشاء غیر معلوم عبارتند از: ریه، کلیه، پانکراس ، دستگاه گوارش ، کبد، تیروئید و ملانوما.

شایعترین علت مراجعه بیماران با متاستاز به اسکلت وجود درد است که در دو سوم آنها یافته می شود. در درجه بعدی وجودشکستگی مرضی که شایعترین محل آن در ستون فقرات است، می باشد. ضایعات لیتیک شکستگی مرضی شایعتر از متاستازهای بلاستیک است(۱۴).

از نظاهر اث سیستمیک اسکلت، هیپرکلسی و استئوآرتروپاتی هیپرتروفیک ریه مهمترین یافته می باشد. طبیعی است که هیپرکلسی در اینگونه موارد ناشی از تخریب استخوان در اثر متاستاز استخوانی است و بیمار ممکن است بعلت ضعف و بیحالی و حالت تهوع و گیجی مراجعه نماید.

به طور کلی متاستازهای استخوانی کمتر همراه با توده های نسج نرم هستند، به طوری که در تشخیص افتراقی، توده نسج نرم همراه با یک تومور استخوانی، در مرحله اول بایستی سارکوم اولیه استخوان یا لمفوم را مورد نظر قرار داد و بعد سارکوم نسج نرم را در مرحله آخر متاستاز قرار داد.

تومورهایی که به جمجمه متاستاز می دهند به ترتیب شامل: پستان و ریه می باشند. متاستاز استخوانی به استخوانهای دست و پا خیلی نادر است. متاستاز استخوانی در دست شایعتر از متاستاز استخوانی در پا است (دو به یک).

شایعترین تومورهایی که به دست متاستاز می دهند، به ترتیب شیوع عبارتند از:

۱- ریه در ۴۷ درصد موارد

۲- پستان در ۱۳ درصد موارد

۳- کلیه در ۱ ادرصد موارد (۱۰)

شایعترین تومورهایی که به پا متاستاز می دهند به ترتیب شیوع عبارتند از:

۱- کولونی مقعدی (colonorectum) در ۱۷ درصد موارد

۲- کلیه در ۱۷ درصد موارد


۳- ریه در ۱۵ درصد موارد

۴- مثانه در ۱۰ درصد موارد


۵- پستان در ۹ ادرصد موارد (۱۱).

متاستاز به دست و پا تواناً بسیار نادر است و تاکنون جمعاً شش مورد گزارش شده است . در دست شایعترین محل بروز متاستاز در بند انگشتان است، به خصوص در بند انگلابی ، ولی در پا شایعترین محل متاستاز در استخوان پاشنه یا در سایر استخوانهای مج پامی باشد. متاستاز به انگشتان پا گزارش نشده است(۱۲).


تشخیص افتراقی متاستازهای دست و پا شامل: عفونتها ، آرتربیت روماتوئید، انکندروما، ملانوم زیرناخن ، گلوموس تومور،



شکل شماره ۱- اسکن (Bone Scan) انجام شده از دست که "Uptake" بالاتری را در بند انگشت چهارم دست نشان می دهد.



شکل شماره ۲: XR گرفته شده از آرنج دست راست بیمار که مناستار را بصورت پک ضایعه لبیک نشان می دهد.



شکل شماره (۳): XR گرفته شده از دست راست بیمار که مناستار را بصورت پک ضایعه لبیک در بند انتهایی انگشت چهارم نشان می دهد.

مراجع

1. Poste G, Fidler,I: The pathogenesis of cancer metastasis. Nature, 1980; 283:139 .
2. Von Recklinghausen F.D., Die fibrose oder deformirende ostitis ,die osteomalacie und dieosteoplastische carcinose in ihren gegenseitigen Beziehung .In:Festschrift Rudolf Virchow zu seinem 71 Geburtstage gewidmet. Berlin, 1981; pp. 1-89, plates 1-5,

3. Willis R.A., *The spread of tumors in the human body.* 2nd Ed.London, Butterworth, 1952.
4. Batson O.V., The function of the vertebral veins and their role in the spread of metastases. *Ann.Surg.*, 1942; 112:138.
5. Holmes F.F., Fouts T.L., Metastatic cancer of unknown primary site.*Cancer*, 1970; 26:816.
6. Moertel C.G., Adencocarcinoma of unknown origin. *Ann.Intern.Med.*, 1979; 91:646.
7. Nystrom J.S., Weiner J.M., Heffelfinger J. et al., Metastatic and histologic presentation in unknown primary cancer . *Semin. Oncol.*, 1977; 4: 53.
8. Nystrom J.S., Weiner J.M., Wolf R. et al., Identifying the primary site in metastatic cancer of unknown origin. Inadequacy of roentgenographic procedures . *JAMA*, 1979; 241: 381.
9. Frances K., Hutter R., Neoplasms of the spine in the aged. *Clin.Orthop.*, 1963; 26:54.
10. Poigenfurst J. et al., Surgical treatment of fractures through metastases in the proximal femur. *J. Bone Joint Surg.[Br.]*, 1954; 50:572.
11. Libson E ,Bloom R.A., Husband J, Stocker D : Metastatic tumors of bones of the hand and foot.A comparative review and report of 43 additional cases. *Skel. Radiol.*, 1987; 16:387.,
12. Bunkis J ,Melvho A , Stayman J., Metastaticlesions of the hand and foot. *Orthop. Rev.*, 1980; 9:97.
13. Mess D, Sanger M., Head and neckcarcinoma: Metastases to the hand and foot. *Orthopedics*. 1968; 9:975.
14. Galasko C.S.B., The pathological basis for skeletal scintigraphy.J. *Bone Joint Surg. [Br.]*, 1975; 57:353. .
15. Greenberg E ,Divertic M.B., Woolner L.B., A review of unusual systemic manifestations associated with carcinoma. *Am. J. Med.*, 1964; 36:106.
16. Holling H ,Brodey R., Pulmonary hypertrophic osteoarthropathy. *JAMA*, 1961; 178:977.
17. Gall E ,Bennett G, Bauer W., Generalized hypertrophic osteoarthropathy.Pathologic study of 7 cases. *Am. J. Pathol.*, 1951; 27:349.
18. Debnam J, Staple T., Osseous Metastases from cerebellar medulloblastoma. *Radiology*, 1973; 107:363.,
19. Hubbard D, Gunn, D., Secondary carcinoma of the spine with destruction of the intervertebral disk. *Clin. Orthop.*, 1972; 88:86,
20. Firooznia H , Pinto R, Lin J , et al., Chordoma:Radiologic evaluation of 20 cases. *A.J.R.*, 1976; 127:797.
21. Deutch A , Resnick d : Eccentric cortical metastases to the skeleton from bronchogenic carminoma . *Radiology*, 1980; 137: 49.
22. Muggia F , Hansen H., Osteoblastic metastases in small- cell(out cell) carcinoma of the lung.Cancer, 1972; 30:801.
23. Witner D : *Radiology of bone tumors and allied disorders.* Philadelphia, W.B 1982; Saunders.
24. Selby H ,Sherman R, Pack G., A roentgen study of bone metastases from melanoma. *Radiology*, 1956; 67:224.
25. Johnson D , Osborne D , Bossen E., Case report 185. Metastasis to the femur from a bronchial carcinoid lesion. *Skeletal Radiol.*, 1982; 7:293.
26. Simon M , Karluk M., Skeletal metastases of unknown origin. Diagnostic strategy for orthopedic surgeons.clin. *Orthop.*, 1982; 166:96.
27. Simon M , Bartucci E., The search for the primary tumor in patients with skeletal metastases of unknown origin . *Cancer*, 1986; 58:1088.

*