

بررسی آماری و مطالعه مجدد سرطانهای مخفی پروستات

دکتر منصور جمالی زواره‌ای، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران

دکتر کتابیون فیاض مقدم، سازمان انتقال خون ایران

STATISTICAL STUDY AND REVIEW OF PROSTATIC LATENT CARCINOMA ABSTRACT

The autopsies which have been performed within the last 50 years, have revealed that real prevalence of prostatic carcinoma is more frequent than clinical one. The real prevalence of prostatic carcinoma, is prevalence combination of carcinomas which have been revealed clinically (they have been confirmed by autopsy or by operation) and the prostatic latent carcinomas are those which are found in autopsy or randomly in the biopsies taken for hyperplasia. But they have no clinical syndromes.

In order to review prevalence of prostatic latent carcinoma in Iran, all prostatic lesions (including hyperplasia or carcinoma) were studied in Imam Khomeini Medical complex during 10 years (1981-1991), in university Jihad center and Medical center of Iran within 2 years and in Yazd Faculty of Medicine within three years (1981-1984).

The total cases were 1110 among which 1085 cases were selected upon reviewing for statistical analysis. At first all lamellas were studied, then the ratio of adenocarcinoma to total prostatic lesions were analysed and types of carcinoma and their percentage in total cases were identified. Finally the prostatic latent carcinoma and its percentage in total malignancy cases were presented.

کل موارد شامل ۱۱۱۰ مورد بوده که از آن میان ۱۰۸۵ مورد پس از بررسی، جهت آمارگیری انتخاب شده، تمام لامها ابتدا بررسی شده و موارد آدنوکارسینوم به کل ضایعات پروستات محاسبه شده، سپس انواع کارسینوم و درصد آنها از کل موارد مشخص گشته و نهایتاً موارد سرطان مخفی و درصد تشکیل دهنده از کل موارد بدخیمی ارائه شده است.

براساس یافته های بدست آمده مشخص شده است که:
۱- سیستم "Grading" مناسبی که با پیش آگهی بیمار ارتباط داشته باشد در گزارشات پاتولوژی مربوط به سرطان پروستات وجود ندارد توصیه شده که از روش طبقه بندی M.D. Anderson گردد.
۲- جهت کشف سرطان مخفی، رعایت اصول مربوط به پروسه "Gross pathology" توسط پاتولوژیست ضروریست و پیشنهاد شده که تمام نمونه حاصل از عمل Transurethral Resection

خلاصه

طی اتوپسی های انجام شده در ۵۰ سال گذشته، مشخص شده است که شیوع حقیقی کارسینوم پروستات بیشتر از شیوع بالینی آن است. شیوع حقیقی کارسینوم پروستات ترکیب شیوع کارسینومهایی است که از نظر بالینی تشخیص داده شده (ودر اتوپسی و یا جراحی اثبات شده اند) و موارد مخفی آنست که در اتوپسی و یا بطور اتفاقی در نمونه های برداشت شده جهت هیپرپلازی یافت می شود. ولیکن علائم بالینی ندارد. برای بررسی شیوع سرطان مخفی پروستات در ایران، کل ضایعات پروستات (اعم از هیپرپلازی و یا سرطان) ۱۰ ساله (۱۳۶۰-۷۰) مجتمع بیمارستانی امام خمینی و ۲ ساله - مرکز جهاد دانشگاهی مرکز پزشکی ایران و ۳ ساله (۱۳۶۰-۶۲) دانشکده پزشکی یزد، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

۷۵-۱۰۰ درصد تومور تمایز نشان می دهد (Grade I)
 ۷۵-۵۰ درصد تمایز (Grade II)
 ۵۰-۲۵ درصد تمایز (Grade III)
 ۲۵-۰ درصد تمایز (Grade IV)

پروستات پروسس شده و در مورد نمونهای حاصل از پروستاتکتومی از هر ۵ گرم یک قطعه از نواحی توپر برش داده و مورد مطالعه قرار گیرد.

روش سوم ، درجه بندی گلیسون (Gleason) است که مورد توجه زیادی قرار گرفته است. (۲۰، ۱۹، ۱۸) در این روش براساس کاهش تمایز غددی، پنج طرح هیستولوژیک مطرح شده است (۲۰). این سیستم ، طرحهای متفاوت موجود در یک تومور را نیز شامل می شود ولی درصد آن را مورد بررسی قرار نمی دهد. اهمیت موضوع در این است که مستوفی (Mostofi) نشان داده است که ارزش پیش آگهی یک طرح هنگامی است که درصد تومور بیشتر از یک حداقل باشد. (۲۱)

آخرین روش مطرح طبقه بندی آندرسون (Anderson) است. (۲۲) که مشابه روش برودر است (۲۴، ۲۳) و آن گنجاندن تغییرات پایپلری و غربالی (Cribiform) در سیستم است که اگر از ۵۰ درصد تومور بیشتر باشد تومور را در درجه سه قرار می دهد. در بررسی ۱۸۲ مورد آدنوکارسینوم پروسسات مرحله C (Stage C) قدرت این طبقه بندی در افتراق بین Low, intermediate, high risk tumor - related death سیستمهای درجه بندی "مستوفی" و "گلیسون" برتری دارد. (۲۲)

در حال حاضر دو سیستم جهت تقسیم بندی مراحل (staging) تومور پروسسات بکار می رود که شامل :

Whilmore and jewett staging protocol T.N.M. Staging protocol است. مطالعه فراوان نشانگر ارزش پیش آگهی سیستم

"Jewett's staging" می باشد. (۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷)

از آنجاکه موضوع موربررسی ما شیوع کارسینومهای مرحله A1,A2(A) است، لذا به شرح بیشتر آن می پردازیم.

مرحله A یا "Incidental Prostatic Carcinoma" به مواردی از بدخیمی های پروسسات گفته می شود که قادر عالیم بالینی هستند ولی در بررسی نمونه های برداشت شده با تشخیص اولیه هیپرپلازی ندولار و یا در اتوپسی، بدخیمی ضایعات مشخص می گردد. شیوع این ضایعه با افزایش سن پیوی بیشتری می یابد و از ۱/۸ درصد به ۲۴ درصد می رسد. این ضایعه در ۱۲ تا ۴۶ درصد موارد اتوپسی مردان بالای ۴۰ سال و ۴۵ درصد تا ۱۰۰ درصد موارد اتوپسی بالای ۸۰ سال گزارش شده است.

بطور کلی موارد مرحله A ۲۲ درصد کل کارسینومهای تشخیص داده شده قبل از مرگ را تشکیل می دهد. (۲۴، ۳۷، ۳۱، ۱۴) بطور کلی ۶۰ درصد (۲۱ تا ۸۳ درصد) مواردی که در اتوپسی کشف می شوند از نظر کلینیکی غیرقابل تشخیص می باشند. (۴۵، ۳۹، ۶)

امتحان کامل نمونه های پروسسات بر روی کشف کارسینوم "Incidental" تأثیر داشته است و بدون شک اختلاف در شیوه بررسی نمونه ها، توسط پاتولوژیستهای متفاوت در مراکز مختلف، مسئول اختلاف گزارشات موجود است. (۴۱ و ۴۶ و ۴۹)

اهمیت بالینی کارسینوم "Incidental" موضوع قابل توجهی است. شیوع فراوان این ضایعه در اتوپسی، منتج به این نظریه شده

مقدمه

کارسینوم پروسسات از نظر شیوع ، دو میان بدخیمی مردان آمریکایی است که در سال ۱۹۸۵ مبتور به مرگ حدوداً ۲۶۰۰۰ نفر شده است و تعداد موارد جدید آن نیز در همان سال ۸۵۰۰۰ نفر گزارش شده است (۱).

عوامل مؤثر در شیوع آن شامل: سن ، منطقه جغرافیایی، نژاد، مذهب و عادات اجتماعی است (۴، ۳، ۲). در طی اتوپسی های انجام شده در ۵۰ سال گذشته، مشخص شده است که شیوع حقیقی کارسینوم پروسسات بیش از شیوع بالینی آن است.

کارسینوم مخفی (Latent Carcinoma) به کارسینومهای اطلاق می شود که در اتوپسی یافت شده و با بطرور اتفاقی در نمونه های برداشت شده جهت هیپرپلازی یافت می شوند و فاقد علائم بالینی هستند، (۸، ۷، ۶، ۵). شیوع حقیقی کارسینوم پروسسات ، ترکیب شیوع کارسینومای مخفی و کارسینومهایی است که از نظر بالینی تشخیص داده شده اند.

پاتولوژی

Mehmetrin یافته ظاهری نمونه که بیانگر وجود آدنوکارسینوم است، وجود مناطق سفت زرد رنگ است. در محیط پروسسات این یافته شیوع بیشتری داشته و چند کاتوتی بودن هم شایع است (۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱).

آدنوکارسینومهای با منشاء آسینار، ۹۸ درصد تمام کارسینومهای پروسسات را تشکیل می دهند. تشخیص میکروسکوپیک آدنوکارسینوم پروسسات ابتدا براساس خصوصیات تشکیلات غددی و طرح آنها و دوم براساس یافته های سیتولوژیک است و تنوع یافته های هیستولوژیک، بقدرتی شایع است که بعنوان یک قانون مطرح می باشد. از طرفی این گوناگونی هیستولوژیک آدنوکارسینوم پروسسات مانع بزرگی بر سر راه قبول پرتوکل های درجه بندی (Grading) می باشد و از طرف دیگر محدودیتهای موجود در درجه بندی بیوپسی های سوزنی پروسسات مسئله را مشکل تر می سازد (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷).

روش اول که در اکثر مراکز (بخصوص در ایران) از آن استفاده می شود شامل تقسیم بندی تومورهای انواع زیر است:

۱- آدنوکارسینوما با تمایز خوب

۲- آدنوکارسینوما با تمایز متوسط

۳- آدنوکارسینوما با تمایز ضعیف

۴- کارسینومای بدون تمایز

روش دیگر درجه بندی که شکلی از درجه بندی برودر (Broder) است ارزش پیش آگهی اندکی دارد. این روش که توسط برودر ارائه شده نشانگر این مطلب است که درصد تمایز تومور از پرونگوتومستیک در طول عمر نهایی بیمار دارد و چهار درجه را مطرح نمود که بشرح زیر است:

جدولهای یک، دو، سه و چهار نشان می‌دهند که موارد بدخیمی به هیپرپلازی در بخش پاتولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی و جهاد دانشگاهی به ترتیب ۸/۴۸، ۶/۲۲ درصد و در بخش پاتولوژی دانشکده پزشکی بزد ۱۲/۲ درصد است. نکته مهم قابل ذکر، عدم وجود یک سبیتم درجه بتندی معتبر در گزارشات پاتولوژی مورد بررسی است.

با استناد به مرجع شماره ۲۲ روش Low,intermediate, high risk of tumor- Related death M.D. anderson^{*} که در افتراق tumor بر دو روش مستوفی و گلیسون برتری دارد را توصیه می‌نماید.

نکته دیگر عدم رعایت نکات لازم در روند نمونه برداری است، زیرا نیمی از برگه‌های پاتولوژی بیمارستان امام خمینی (بخصوص در سالهای ۶۶-۶۱) توزیع نمونه‌های بروستات ارسالی بوده و فقط ابعاد گزارش شده است.

بررسی‌های مختلف جهانی، شیوع ۲۴-۳۲ درصد را برای این ضایعه (مرحله A) گزارش می‌نمایند و شیوع کلی آن ۲۰ درصد گزارش شده است. طبق آمار بدست آمده در این مطالعه در مجتمع بیمارستانی امام خمینی، شیوع این ضایعه ۴/۳ درصد است. لازم به ذکر است که دو مورد تشخیص داده شده مربوط به سالهای ۶۹-۷۵ می‌باشد و در سالهای ۶۹-۶۱ با این عنوان هیچ تشخیصی داده نشده است. (بررسی مجدد لامها نیز مشکل را حل نکرد). زیرا برشهای کافی وجود نداشت) یعنی واقعاً در طی سالهای ۶۹-۶۱ هیچ موردی وجود نداشته و یا ناشی از عدم توجه در بررسی صحیح و کامل نمونه‌ها می‌باشد.

در مرکز پاتولوژی جهاد دانشگاهی، شیوع این ضایعه ۷/۶ درصد و در بخش پاتولوژی دانشکده بزد ۲۰ درصد (متطبق با گزارشات جهانی) می‌باشد. همانطوریکه در جدول شماره چهار ملاحظه می‌شود از ۱۰۷ مورد بروستات بدخیم، ۱۳ مورد (مرحله A) برابر ۱۲/۲ درصد هستند و لذا توجه به معیارهای پاتولوژی جهت یافتن این کانسرهای پنهانی ضرورت نام دارد بخصوص اینکه با توجه به این جدول حدوداً از هر ۱۵ بیماری که بعلت اختلال کار پروستات جراحی می‌شود یک نفر مبتلا به کانسر می‌باشد و بنابراین بررسی کافی نمونه‌های ارسالی طبق اصل مطرح در تمام کتابهای پاتولوژی جهت دستیابی این ضایعه ضروریست و از آنجا که برخی از این ضایعات قدرت متاستاز دارند تشخیص صحیح در درمان و پیش‌آگهی بیماران دخیل است.

پیشنهادات

باتوجه به بررسی‌های انجام شده و نتایجی که حاصل گردیده است، پیشنهاد می‌شود که:

- ۱- نمونه‌های حاصل از T.U.R. تماماً بروسن شده و بررسی شوند.
- ۲- نمونه‌های حاصل از پروستاتکتومی باز به ازای حداقل هر ۵ گرم یک قطعه از نواحی توپر برش داده شود و مورد مطالعه قرار گیرد.

است که این ضایعه نسبت به کارسینوم مشخص دارای تفاوت بیولوژیکی است (۴۷،۶). این مسئله نهایتاً منجر به طرح مقوله کارسینوم مخفی (Latent Carcinoma) گردید که شامل، ضایعاتی که از نظر مرفولوژیک بدخیم بوده ولی از نظر بیولوژیک غیر مهاجم (Non Aggressive) می‌باشد. (۶،۷)

مطالعات بالینی و پاتولوژیک کارسینوم "Incidental" یا مرحله A شناخت مارا در باره این توپلاسمها گسترش داده است. اکثر این بیماران فقط توسط روش Transurethral Resection (T.U.R.) درمان شده‌اند و در مقایسه با گروه کترول هم سن، طول عمر یکسان داشته و افراد کمتری علائم بالینی مربوط به پیشرفت بیماری را نشان داده‌اند. بنابراین مهمترین نکته در شناخت این کارسینومها در این است که درصد کمی از آنها قدرت تهاجم موضعی و متاستاز به گره‌های لنفاوی لگنی را دارند. بطور کلی طول عمر ۵ ساله مرحله A تا ۸۴ درصد و طول عمر ۱۰ ساله آن ۶۳/۶-۲۸/۵ درصد است (۲۹ و ۳۸ و ۵۰).

روش کار

بطور کل در این سه مرکز، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز جهاد دانشگاهی مرکز پزشکی ایران و دانشکده پزشکی بزد، ۱۱۱۰ مورد تحت بررسی قرار گرفت. به این ترتیب که از روی دفاتر سوابق پاتولوژی، تمام ضایعات پروستات جمع آوری شد. (اعم از نمونه ارسالی پروستاتکتومی، T.U.R. یا اتوپسی سوزنی و تشخیص های مختلف بالینی اعم از هیپرپلازی ندولار و یا کارسینوم). سپس لامهای مربوطه مجدداً مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت و تمامی موارد دارای نقص و اشکال حذف گردید و در نهایت ۱۰۸۵ مورد جهت آمارگیری انتخاب شد. آمارهایی از مراکز از نقطه نظر اطلاعات بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

بطور کل در هر مرکز ابتدا در صدادنوکارسینوم به کل ضایعات پروستات محاسبه شد، تا شیوع این ضایعه در کشورمان بدست آید. سپس انواع کارسینوم و درصد آنها از کل موارد بدخیمی مشخص شد. و نهایتاً موارد کارسینوم "Incidental" و درصد تشکیل دهنده آن از کل موارد بدخیمی گزارش شد.

بحث و نتیجه گیری

همانطور که گفته شد، شیوع حقیقی کارسینوم پروستات ترکیب شیوع سرطانهایی است که از نظر بالینی تشخیص داده شده (و توسط جراحی یا اتوپسی تأیید شده) و موارد مخفی آنست که ابتدا در اتوپسی و یا نمونه‌های جراحی که تشخیص هیپرپلازی ندولار دارند، تشخیص داده شده است.

متاسفانه بعلت مشکلات موجود، اتوپسی که یکی از پایه‌های اصلی پاتولوژی و طب است، در ایران بصورت اجباری انجام نمی‌شود، از این‌رو نمی‌توانیم شیوع واقعی کارسینوم پروستات را در ایران مشخص نمائیم. ولی با بررسی دقیق نمونه‌های پروستاتی که تحت عنوان هیپرپلازی ندولار فرستاده می‌شوند و کشف کارسینوم "Incidental" می‌توان به این امر کمک نمود.

(جدول شماره ۲) مرکز پاتولوژی جهاد دانشگاهی

۱۵۰	کل موارد بررسی شده
(۷/۸/۶) ۱۳	کل موارد بدخیمی
(۷/۸۴/۷) ۱۱	آدنوکارسینوما
(۷/۱۵/۳) ۲	کارسینومای بدون تمايز
(۷/۰) ۰	کارسینومای ترازی بشمال
(۷/۷/۶) ۱	مرحله A
۲۸-۹۰	طبیف سنتی
۴-۱۱۷۸	طبیف وزنی
۶-۲۰۸	طبیف وزنی موارد خوش خیم

(جدول شماره ۳) مرکز پاتولوژی دانشکده پزشکی بزود

۳۹۳	کل موارد همراه بررسی
(۷/۱۲/۲) ۴۸	کل موارد بدخیمی
(۷/۷۱) ۳۴	آدنوکارسینوما
(۷/۱۴/۵) ۷	آدنوکارسینوم
(۷/۶/۲) ۳	کارسینومای ترازی بشمال
(۷/۲۰) ۱۰	مرحله A
۲۰-۱۰۳	طبیف سنتی
۶-۱۰۵	طبیف وزنی
۸-۲۲۵	بدخیم

(جدول شماره ۴) مقایسه کل موارد در نمونه های سه مرکز مورد مطالعه

(مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز پاتولوژی جهاد دانشگاهی، دانشکده پزشکی بزود)

مرکز	تعداد نمونه های بدخیم	تعداد نمونه های طبیف سنتی	تعداد نمونه های طبیف وزنی	تعداد نمونه های آدنوکارسینوم	تعداد نمونه های آدنوکارسینوم	تعداد نمونه های بدون تمايز	تعداد نمونه های ترازی بشمال	تعداد نمونه های مرحله A	تعداد نمونه های مجموع
-	۵۰-۸۵	۰	-	۰	۷۰	۰	۰	۵۰	۱۷۵
جهاد دانشگاهی	۷۰-۱۱۳	۷۰-۹	۰	-	۱۱	۰	۰	۱۰	۱۷۰
دانشکده پزشکی بزود	۷۰-۹-۱۰۰	۷۰-۱-۰	۰	۰	۷۰	۰	۰	۰	۱۴۰
جمع	۷۰-۹-۱۱۳	۷۰-۱-۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۱۵	۳۷۵

۳- کم بودن وزن نمونه ارسال شده به بخش پاتولوژی چه با عمل T.U.R و چه در عمل جراحی باز یکی از نکاتی است که باید پاتولوژیست رابه جستجوی دقیق تر جهت یافتن کانون احتمالی کانسر مخفی پروستات راهنمایی کند.

(جدول شماره ۱) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (سالهای ۱۳۶۰-۱۳۷۰)

۵۴۲	کل موارد بررسی شده
(۷/۸/۴) ۴۶	کل موارد کارسینوم
(۷/۹۱/۴) ۴۰	آدنوکارسینوما
(۷/۶/۵) ۳	کارسینومای بدون تمايز
(۷/۲۷/۱) ۱	کارسینومای ترازی بشمال
(۷/۰) ۰	کارسینومای اسکرآموس
(۷/۴/۳) ۲	مرحله A
۰-۵۸	طبیف سنتی
۰	طبیف وزنی

* شایعه مرحله A مربوط به سالهای ۶۹-۷۰ می باشد و در سالهای قبل مورده ذکر شده است.

مراجع

- Seidman H, Mushinski , Celb SK et al: Probabilities of eventually developing or dying of cancer-united states; 1985. CA 35:36.
- King H, Diamond E, Lilienfeld AM:Some epidemiological aspects of cancer of the prostate,. J chronic Dis 1963; 16:117.
- Wynder EL,Malbuchi K, Whitmore Jr WF: Epidemiology of cancer of the prostate.Cancer 1970; 28:344.
- Owen WL: Cancer of the prostate: A literature Review . J chronic dis 1976; 29:89.
- Andrews CS:Latent carcinoma of the prostate J clin pathol 1994; 2:197.
- Edwards CN, Steinthorsson E, Nicholson D:An autopsy study of latent prostatic cancer. Cancer 1953; 6:531.
- Franks LM: Latent carcinoma of the prostate J. pathol Bact 1954; 68:603.
- Dotak: Latent carcinoma of the prostate among the japanese. Acta un Int Cancer 1961; 17:952.
- Glenister TW: the development of the utricle and of the so-called "Middel" or"Median" lobe of the prostate.J Ant 1962; 96:443.
- Blennerhassett JB, Vickery Jr AL: Carcinoma of the prostate gland: An anatomical study of Tumor location. Cancer 1960;

- 19:980.
11. Gaynor EP: Zur frage des prostatakrebses, virchows Arch(A) 1938; 301:602.
 12. Byar DP, Mostofi FK, The veterans administration cooperative urological research Group: Carcinoma of the prostate: Prognostic evaluation of certain pathologic features in 208 radical prostatectomies. Cancer 1972; 30:5.
 13. Thoms R, Lewis RW, Sarma DP et al : Accurate clinical staging by histopathologic grading in prostatic cancer(abstr). J Urol (Suppl) 1981; 125:168
 14. Catalona WJ, Stein AJ, Fair WR: Grading errors in prostatic needle biopsies: Relation to the accuracy of tumor grade in predicting pelvic lymph node metastases. J Urol 1982; 127:919.
 15. Guileyardo JM, Sarma DP, Johnson WD et al : incidental prostatic carcinoma : tumor extent versus histologic grade. Urol 1982; 20:4).
 16. Lange PH, Narayan P: Understaging and undergrading of prostate cancer. Urol 1983; 21:113.
 17. Garrett JE, Oyasu R, Grajeda JT: The accuracy of diagnostic biopsy specimens in predicting tumor grades by Gleason, S classification of radical prostatectomy specimens. J Urol 1984; 131:690.
 18. Vickery Jr AI, Kerr Jr WS: Carcinoma of the prostate treated by radical prostatectomy . A clinicopathological survey of 187 cases followed for 5 years and 148 cases followed for 10 years. Cancer 1963; 16:1598.
 19. Gleason DF, Mellinger GT, The veterans Administration prognosis for prostatic adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging J Urol 1974; 111: 58.
 20. Gleason DF: Histologic grading and clinical staging of prostatic carcinoma . Intannenbaum M(ed): Urologic pathology : The prostate, P.171. Philadelphia , lea Febiger.
 21. Harada M, Mostofi FK, Corle DK et al : Preliminary studies of histologic prognosis in cancer of the prostate . Cancer treat Rep 1977; 61:223.
 22. Brawn PN, Ayala AG, Von Eschenbach AC et al : Histologic grading study of prostate adenocarcinoma : The development of a new system and comparison with other methods- A preliminary study .cancer 1982; 49:525.
 23. Broders AC: Epithelioma of the genitourinary Organs. Ann surg 1922; 75:574.
 24. Broders AC: Carcinoma : Crading and practical application. Arch pathol 1926; 2:376.
 25. American Joint Committee for cancer staging and End Results Reporting: Manual for staging of cancer , P 123. New Jersey. whiting Press, 1978.
 26. American Joint committee on cancer: Manual for staging of cancer 2nd ed, p 259.Philadelphia ,JB Lippincott , 1983.
 27. Golimbu M, Morales P: Stage A2 prostatic carcinoma should staging system be reclassified? Urol 1979; 13:592.
 28. Bruns AW,O, Cleiveachain F, Morales A et al : Carcinoma of the prostate: A critical look at , staging J Urol 1977; 117:319.
 29. Sheldon CA, Williams RD, Fraley EE: Incidental carcinoma of the prostate: A Review of the literature and critical Reappraisal of classification. J Urol 1980; 124:626.
 30. Murphy GP, Gaeta JF, Pickven Jetal : Current status of classification and staging of prostate cancer. Cancer 1980; 45:1889.
 31. Schoonees R, Palma LD, Gaeta JF et al : Prostatic carcinoma treated at categorical center. Clinical and pathologic observations, Ny state J Med 1972; 72:1021.
 32. Anderson R: Carcinoma of the prostate. Clinical observations and treatment. Acta Chir scand (suppl) 1959; 246.
 33. Corriere Jr JN, Covino JL , Murphy JJ: prognosis in patients with carcinoma of the prostate. Cancer 1972; 25:911.
 34. Calton Jr CE, Dawoud F, Hudgins pet al:Irradiation treatment of carcinoma of the prostate:A preliminary report based on 8 years of experience. J Urol 1972; 108:924.
 35. Varkarakis MJ,Murphy GP, Nelson CMK et al : Lymph node involvement in prostatic carcinoma . Urol clin North AM 1975; 2:197.
 36. Mcmillen SM, Wetlauffer JN:The role of repeat transurethral biopsy in stage A carcinoma of the prostate. J Urol 1976; 46:759.
 37. De vere white R, Paulson DF, Glenn JF:The clinical spectrum of prostate cancer.J Urol 1977; 117:323.
 38. Murphy GP,Natarajan N, Pontes JE et al :The national survey of prostate cancer in the united states by the American college of surgeons . J Urol 1982; 127:928.
 39. Moore RA:The morphology of smallprostatic carcinoma. J Urol 1935; 33:224.
 40. Rich AR:On the frequency of occurrence of occult carcinoma of the prostate. J Urol 1935; 33:215.
 41. Baron E, Angrist A: Incidence of occult adenocarcinoma of the prostate after fifty years of age. Arch Pathol 1941; 32:787.
 42. Lundberg S, Berge T: Prostatic carcinoma :An autopsy study .Scand J Urol Nephrol 1970; 4:93.
 43. Mintz ER,Smith GG:Autopsy Findings in100 cases of prostatic cancer N Engl J Med 211:479,1935.
 44. Arnheim FK:Carcinoma of the prostate :A study of the postmortem findings in one hundred and seventy-six cases. J Urol 1984; 60:599.
 45. Elkin M, Mueller HP:Metastases fromcancer of the prostate.Autopsy and roent genological findigs cancer 1954; 7:1246.
 46. Mccheffey GJ:Carcinoma of the prostate gland : Efficacy of method of examining prostatic tissue removed by transurethral resection to make apathologic diagnosis of carcinoma. proc staff Mayo Clin 1940; 15:458.
 47. Denton SE,Choy SH , Valk WL:Occult prostatic carcinoma diagnosed by the step-sectiontechnique of the surgical specimen. J Urol 1965; 93:296.
 48. Delides Os, Baltopoulos G, Papaharalampous NX:Latent carcinoma of the prostate: The probability of identifying smalllesions in routine histology. Br J Urol 1976; 48:207 .
 49. Golimbu M, Glasser J, Schinella R et al:Stage A prostate cancer from pathologist's viewpoint. Urol 1982; 18:124 .
 50. Boyer RJ,Kaufman JJ, Goodwin WE:Radical prostatectomy for carcinoma of the prostate:1951-1976.A review of 329 patients . J Urol 1977; 117:208.
- ۵۱- دکتر سیم فروشن ناصر، دکتر جمالی منصور، اعمال جراحی پرستانت از طریق مجرای ادرار، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، شماره پنجم و ششم - سال ۱۳۶۰، صفحه ۱۱۷-۱۲۹