

بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای طرف راست

جهت عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا

دکتر بهمن جهانگیری*

Intercostal Nerve Blockade in Cholecystectomy

Abstract

Four patients were studied for intercostal nerve blockade in cholecystectomy. All of the patients were poor risks (Class 4) and received premedication before the procedure. Intercostal nerve blockade (ICNB) of the 7th and 10th thoracic nerves on the right side was performed with lidocaine 1% plus adrenalin 5 ml. at each segment, T7 - T10 (a total dose of 20ml). Ventilation was controlled using intermittent positive pressure throughout the observation period. Heart rate and arterial pressure remained within normal limits in all patients.

خلاصه

غلظت ۰/۰۰۰۰۰ درصد با آدرنالین یک در ۲۰۰۰۰ مقدار حداقل ۲ میلی‌گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن را جهت بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای بکار برده و طول مدت اثر بی‌حسی ۸ - ۶ ساعت بوده است (۴).

در سال ۱۹۶۳ تیلوبیو (Telivuo) از بوپروآکائین ۰/۵ درصد با آدرنالین یک در ۲۰۰،۰۰۰ استفاده نموده، طول مدت اثر بی‌حسی ۱۴ ساعت بوده است.

در سال ۱۹۸۴ چرچیل دیپودسون (Churchill Davidson) از لیدوکائین ۱ - ۰/۵ درصد با آدرنالین یک در ۲۰۰،۰۰۰ برای طولانی شدن مدت بی‌حسی استفاده کرده، طول مدت اثر بی‌حسی را بیش از ۲ ساعت گزارش کرده است (۷).

در سال ۱۹۸۶ لیندل (Lindell) برای بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای از بوپروآکائین ۰/۵ درصد بدون آدرنالین برای هر فضا ۴ سانتی‌متر مکعب از T_7-T_{11} به مقدار ۲۰ سانتی‌متر مکعب استفاده کرده است (۵).

بی‌حسی عصب بین دنده‌ای راست برای عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا بالیدوکائین یک درصد همراه با آدرنالین در چهار بیمار (دو مرد و دو زن) بین سنین ۷۵ - ۴۵ سال انجام شد. این نحود بی‌حسی مخصوصاً برای بیمارانی که بدحال هستند و خطر سقوط فشارخون با انجام بی‌حسی نخاعی یا اپیدورال آنها را تهدید می‌کند، بکار رفته و با تجویز پیش‌داروی مناسب، بیماران، بی‌حسی عصب بین دنده‌ای را بخوبی تحمل نمودند و لزومی به تجویز داروهای بیهوشی دهنده وریدی یا مایعات تبخیرشونده بیهوشی نمی‌باشد. بعلاوه اثر ضد دردی طولانی که بعضی از داروهای بی‌حسی موضعی از جمله بوپروآکائین همراه با آدرنالین دارد (حدود ۱۴ ساعت)، بی‌حسی عصب بین دنده‌ای با این دارو می‌تواند سبب تسکین درد ساعتها بعد از خاتمه عمل جراحی شود.

مقدمه

در سال ۱۹۶۲ مور (Moore) و همکارانش آموکائین با

سنتین بین ۷۵ - ۴۵ سال بودند، برای بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای طرف راست جهت عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا انتخاب شدند.

پیش داروی بیهوشی برای تمام بیماران شامل نیم میلی‌گرم آتروپین عضلانی، ده میلی‌گرم دیازپام خوراکی، پنجاه میلی‌گرم پتیدین عضلانی یک ساعت قبل از ورود به اطاق عمل بود (۲). تجویز پیش داروی بیهوشی سبب آرامش بیماران شده و شرایط مناسب در اطاق عمل برای انجام بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای را فراهم می‌نمود (۴).

بیمار در روی تخت عمل جهت انجام بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای در وضعیت طرفی چپ خوابیده، ابتدا با انگشتان یک دست لبه پائینی دنده مورد نظر به فاصله ۷ سانتی‌متر یا عرض چهار انگشت از خط وسط پشتی را لمس کرده، پس از ضدغوفونی کردن پوست و بعد از انجام بی‌حسی موضعی با سوزن نمره ۲۱ بطول ۵ - ۲ سانتی‌متر متمایل به زاویه حاده و بطرف سر بیمار، سوزن بداخل پوست فرو می‌رود تا به استخوان بخورد نماید. سپس به آهستگی نوک سوزن به طرف لبه پائینی دنده حرکت می‌کند، بعد از آن به اندازه ۲ میلی‌متر نوک سوزن بطرف عميقی از لبه تحتانی دنده فرو می‌رود در موقع تزریق دارو به اندازه ۲ - ۱ میلی‌متر نوک سوزن به طرف خارج حرکت داده می‌شود. (مطابق شکل ۲) از دنده هفتم الی دهم برای هر دنده پنج سانتی‌متر مکعب لیدوکائین یک درصد با آدرنالین یک در ۰۰۰،۰۰۰ تزریق شده، سپس بیماران در وضعیت طاق باز فرار گرفته و برای ایجاد آمنی از مخلوط گازهای اکسیژن و نایتروس اکساید (O_2) به نسبت ۵۰٪/۵۰٪ با ماسک استفاده می‌شود. بعلت و خامت حال عمومی و به منظور کنترل و اصلاح کاهش ظرفیت تنفسی اینگونه بیماران، لوله تراشه با پاشیدن گزیلوکائین گذاشته شد و پس از تزریق چهار میلی‌گرم پانکورونیوم تنفس کنترله برقرار گردید (۱، ۳، ۷).

البته به نظر عده‌ای، بعلت اینکه پانکورونیوم روی ضربان قلب و فشارخون تأثیر مثبت دارد، اتراکورونیوم را تجویز می‌کنند.

فشارخون و نیض بیماران به فاصله هر ده دقیقه کنترل شد که تغییری نداشته و نزدیک به زمان قبل از انجام بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای بوده‌اند. طول مدت اعمال جراحی بین یک الی دو ساعت بوده و بعد از اتمام عمل جراحی، هر چهار بیمار با حال عمومی خوب به بخش منتقل گردیدند.

در سال ۱۹۸۸ باتینگ (Bunting) و همکارانش بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای را بعد از القاء بیهوشی برای تکین درد بیماران بعد از عمل جراحی آپاندیسیت بکار برده‌اند (۲).

در همین سال پیتر (Piter) و همکارانش از بوبوکائین ۵٪ درصد با آدرنالین به مقدار ۲۵۰ پیکوگرم (10^{-12} گرم = ۱ پیکوگرم) را برای بی‌حسی اعصاب بین دنده‌ای بکار برده و میزان کورتیزول و قند خون را در عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا اندازه‌گیری نمودند و مشاهده کردند بلا فاصله بعد از انجام بی‌حسی و قبل از عمل جراحی میزان غلظت کورتیزول پلاسمای از ۱۸۲/۵ نانومول (۱ نانو = 10^{-9} گرم) در لیتر به ۲۸۳/۸ نانومول در لیتر افزایش پیدا کرده و در تمام طول عمل جراحی و بعد از آن تا مدت ۵/۵ ساعت شروع به افزایش نموده و به میزان ۶۸۶/۲ نانومول در لیتر رسیده است و در گروهی که بی‌حسی عصب بین دنده‌ای انجام نشده، میزان نسبت به گروه فوق تفاوت مهمی نداشته است ولی میزان غلظت قندخون در بیمارانی که برایشان بی‌حسی عصب بین دنده‌ای انجام شده بود از مقدار ۳/۹۴ میلی‌مول در لیتر به میزان ۴/۴۵ میلی‌مول در لیتر افزایش پیدا کرده و در تمام طول مدت عمل جراحی مقدار آن ثابت بوده است.


اما بعد از شروع عمل جراحی در بیمارانی که بی‌حسی عصب بین دنده‌ای انجام نشده بود، غلظت قند خون به میزان ۶/۴۸ میلی‌مول در لیتر رسیده بود (شکل ۱) (۶). از نظر تشریحی اعصاب بین دنده‌ای از شاخه‌های اعصاب سینه‌ای منشعب می‌شوند و هر قطعه از عصب به زیر دنده مربوط به خود می‌رود.

هر عصب حسی بین دنده‌ای از سوراخ بین مهره‌ای بیرون می‌آید و از قصای پاراورتبرال (paravertebral) عبور کرده و فقط توسط فاسیای داخل سینه‌ای از جنب مجزا شده است.

هر عصب بین دنده‌ای در لبه تحتانی دنده قرار گرفته و سرخرگ و سپاهرگ بین دنده‌ای پائین‌تر از آن قرار دارند و بین عضلات خارجی و داخلی دنده امتداد پیدا می‌کند. اعصاب بین دنده‌ای در بالای ششمین دنده منحصرأ به دیواره فنسه صدری پخش می‌شوند و اعصاب بین دنده‌ای پائین ششمین دنده بطرف دیواره شکم امتداد پیدا می‌کنند (۴، ۳، ۱).


روش کار

در این بررسی چهار بیمار که عبارت از دو زن و دو مرد در



(شکل ۱)

نفیرات غلظت کورتیزول و قند پلاسمای در طول مدت عمل جراحی نقاط تبادل مربوط به بیمارانی است که در آنها بی‌حسی عصب بین دندای انجام شده است نقاط روش مربوط به بیمارانی است که در آنها بی‌حسی عصب بین دندای انجام نشده است.



نتیجه

فشارخون و نبض در این بیماران تغییر نکرده و میزان غلظت کورتیزول پلاسمایلافاصله بعد از بی حسی عصب بین دندای زیادتر از حد طبیعی گردیده و در موقع برش پوست میزانش بالاتر می رود (۶) این افزایش کورتیزول در جهت ثبت هموستازیس داخلی بیمار مؤثر است، بعلاوه با بکار بردن بعضی از داروهای بی حسی موضعی مانند بوپیواکائین، اثر ضد دردی آن می تواند چندین ساعت بعد از خاتمه عمل جراحی ادامه داشته باشد (۴).

این طریقه جهت بیمارانی که بد حال هستند و خطر سقوط فشارخون با انجام بی حسی نخاعی یا اپیدورال آنها را تهدید می کند، بکار رفته است (۴).

با تجویز پیش داروی مناسب، بیماران بی حسی عصب بین دندای را بخوبی تحمل نموده و نیزهمی به تجویز داروهای بیهوشی دهنده وریدی یا مایعات تبخیرشونده بیهوشی نمی باشد.

References :

- 1) Atkinson, R.S. Rushman, GB, Alfred lee j : Asynopsis of Anaesthesia. ninth Edition. London, John wright and sons LTD, page 695, 1982.
- 2) Bunting P, Geachie MC, Br JF. j Anaesth. 61 : 169, 1988.
- 3) Dripps RD, Eckenhoff, JE, and Vandam LD : Introduction to Anesthesia the principles of safe practice. seventh Edition. philadelphia, W.B. saunders co, page : 246, 1988.
- 4) Eriksson E : Illustrated Hand Book in local Anaesthesia. second Edition, London, lloyd luke LTD, page : 93, 1979.
- 5) Kirno K, lindell K.Br. j Anaesth, 58 : 246, 1986.
- 6) Pither CE, Brinden baugh LD, Reynolds F.Br. J Anaesth, 60 : 730, 1988.
- 7) Wylye WD, Churchill Davidson HC : Apractice of Anaesthesia fifth Edition, London , lloyd luke LTD, page: 907, 1984.