

گزارش درمورد سندروم آناکسی فریدریش در یک فامیل

دکتر فریدون سیماei

مقدمه

در سنین ۱۱ تا ۱۲ سالگی تظاهر می‌کند و نوع دیگر که بصورت صفت غالب منتقل می‌شود در سنین ۱۸ تا ۲۲ سالگی پیدا می‌شود، از نظر شیوه نوع مغلوب ده برابر بیشتر از نوع غالب دیده می‌شود. (۲)

آناکسی فریدریش از شایعترین علل آناکسی های در زنراتیوارشی است. این بیماری بعلل زیر قابل توجه است.

- ۱- نادر بودن بیماری
- ۲- ارشی بودن بیماری
- ۳- تشخیص آسان

گزارش دومورد کامل بیماری و دو مورد ناقص بیماری در یک خانواده مسائل سه گانه فوق را تا اندازه‌ای موردن تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

این بیماری در سال ۱۸۶۳ توسط آقای فریدریش از انواع آناکسی سیفلی متمایز شد و شخصیت مستقلی پیدا نمود و توسط علائمی چون آناکسی ATAXIA - نیستاگموس KYPHOSCLIOSIS NYSTAGMUS پس کاووس PES CAVUS مشخص می‌شود.

این بیماری در تمام افراد با ملیتهاي مختلف و نژادهاي گوناگون دیده می‌شود و بصورت اتوزوم غالب و اتوزوم مغلوب در هر دو جنس بطور مساوي انتقال می‌یابد. لیکن باید دانست که نوع بیماری که بصورت مغلوب منتقل می‌شود

پاتولوژی
علت آناکسی فریدریش نامعلوم نیست اندازه گیری آنزیمهای سرم و اندازه گیری آمنو اسیدها و دفع ادراری متabolیک های تریپتوфан اختلالی نشان نداده اند در عده زیادی از این افراد که چاق نبوده اند هیپر انسلینیسم HYPERINSULINISM حتی بدون دیابت دیده است (۳) که ارزش و اهمیت یافته اخیر هنوز بدستی معلوم نشده است. در یک بیمار که آنسفالوباتی نکروزان و هیپر آلانین می‌باشد آنچه در علامت بالینی تا اندازه ای شبیه آناکسی فریدریش بوده است. (۴)

ضایعه اصلی در آناکسی ارشی فریدریش شبیه دیگر ضایعات در زنراتیوم مخچه ای است این پدیده از سلولهای

در اطفال آهستگی در عمل راه رفتن یا استامبل STUMBLE پیدا می شود . اختلال تکلم و عدم تطابق حرکات سر ممکن است از اولین علامتهای بیماری باشد ، در مراحل پیشرفته بیماری ظاهر دیسمورفیک (DYSMORPHIC) و نارس پیدا می شود .

در یک بیماری تعدادی تغییرات استخوانی دیده می شود که ممکن است از بدو تولد وجود داشته باشد و $\frac{2}{3}$ بیماران پادارای قوس بلندی است (پس کاووس PES CAVUS) شست پا چکشی HAMMER TOES) و عضلات کوچک پاشنه پا آتروفی شده اند . در بیمارانیکه این تغییرات را از بدو تولد دارند ممکن است این تنها علامت آناکسی فریدریش باشد .

کیفواسکلیوز در 85% موارد دیده می شود . (۹)

علامت اصلی در این بیماری آناکسی است که بعلت آسینزی مخجهای و فقدان حس ستون خلفی نخاع می باشد . آناکسی بیشتر در پا است تا در دستها و بیشتر در هنگامی پیدا می شود که طفل راه می رود و یا می ایستد .

تکلم نیز دچار اختلال شده است و حالت انفجاری ویا EXPLOSIVE STACCATO پیدا می کند که بعلت عدم تطابق تنفس و تکلم است .

نیستاگموس در بیش از $\frac{1}{3}$ موارد دیده می شود اغلب دو طرفه است و با حرکات جانبی چشم مشخص می شود ، نیستاگموس با حرکت عمودی چشم نادرست (۵) در ۱۲ درصد موارد آتروفی اپتیک دیده می شود که ممکن است مادرزادی باشد یا در اوائل عمر پیدا شده است و بعد از زایمان بسرعت پیشرفت کرده است . (۹)

هرماه با ضایعه بالا در زنرایسیون پیگمانترین هم دیده می شود (۱۰) . ابتلاء وستی بول نیز گزارش شده است که می شود با انجام تست حرارتی یا (کالری تست) مشخص می شود . این ضایعه نیز در اوائل عمر دیده می شود . (۱) ضعف اندامهای تحتانی و دیستال وجود داشته و تولید آتروفی های مختلف و بدرجات متفاوت می نماید .

دیگر ضایعات فقدان حس PROPRIOCEPTIVE و ارتعاش است که در موارد پیش رفته در اندامهای دیستال حسها دیگر نیز ممکن است دچار اختلال شوند . درد و کرامپ و پاراستزی نیز شایع است . فقدان رفلکس های روتول -

محیطی تا سلولهای مرکزی عصبی ادامه پیدامی کند و سبب از بین رفتن جسم سلوالی می شود . در مغز ضایعه اصلی در رشته های دراز صعودی و نزولی پیدا می شود و رشته های عصبی محیطی نیز ممکن است مبتلا شوند (مثلًا " در پایه مغزی مخچه) در تمام مناطق گفته شده در زنرایسیون - دمیلینزاسیون و گلیوز جبرانی در آگسون ها دیده می شود . ضایعات دزئرایسیون سلوالی بیشتر در ستون کلارک نخاع پیدا می شود و به مقدار کمتر در هسته های پورکنر مغزی و پایه مغزی تحتانی و دیگر مناطق ماده خاکستری نیز ضایعات فوق ممکن است دیده شود . در آزمایشات بیولوژیکی از سلولهای ستون خلفی نخاع کاهش آنزیم های کلیکولیتیک، دیده شده است دراماتحان احشا؛ اغلب یک نوع کاردیومگالی و میوکاردیت دیده می شود .

یافته های بالینی

در غالب فامیلها بیماری بدون مقدمه شروع می شود نوع علائم در شکل غالب و مغلوب یکسان است . این علائم در جدول زیر خلاصه شده است :

| علائم | پورسانتاز |
|------------------------|-----------|
| آناکسی تنفسی | ۱۰۰ |
| علامت رومبرگ مثبت | ۹۵ |
| دیسمتری دستها و بازو | ۸۹ |
| اختلال تکلم | ۸۴ |
| اختلاف حس عمق | ۸۱ |
| فقدان رفلکس روتول | ۷۶ |
| تغییرات ستون فقرات | ۷۷ |
| نیستاگموس | ۷۶ |
| فقدان رفلکس مچ پا | ۸۰ |
| ضعف اندامها | ۷۲ |
| آناکسی اندامهای تحتانی | ۷۰ |
| علامت باپنسکی | ۶۶ |
| تروفی عضلانی | ۶۴ |

شرح موارد مبتلا به آتاكسی فریدریش

بیمار اول بنام م - ص - پسر ۱۵ ساله اهل آبادان و متولد آبادان در یک خانوداه بومی عرب در تاریخ ۴/۶/۲۶ مبتلای اختلال در تکلم و اختلال در راه رفتن و سقوط مکرر در اشتباه راه رفتن مراجعه و در بیمارستان شرکت نفت آبادان بستری شده است - شروع بیماری بطور مزمن از دو سال پیش بوده و بیماری سیر آهسته و بطئی داشته است . شدت بیماری بین درجی روبه تزايد است بطوری که این اختلالات سبب مراجعت در انجام کارهای روزمره و تکاليف مدرسه شده و او را از سایر همسالان خود عقب اندخته است . بیمار قبل از سن سیزده سالگی "کاملاً" سالم بوده و حتی یک بار نیز در بیمارستان بستری نگردیده است - او فرزند اول خانواده می باشد - فرزند دوم خانواده پسر ۱۳ ساله و ظاهراً سالم است - فرزند سوم پسر دوازده ساله ای است که از ناراحتی های مشابه با بیمار اول شاکی بوده و مورد بحث قرار خواهد گرفت . فرزند چهارم دختر هفت ساله ای است که شکایت خاص ندارد و تنها در معاینه چشمی نیستاگموس افقی واضح در هردو چشم مشاهده می گردد - والدین بیمار از جهت پدری قرابت فامیلی دارند و هر دو ظاهراً سالم هستند پدر بزرگ پدری بیمار دارای لرزش خاص است که در او اخیر عمر مبتلا به او شده است - از چگونگی بیماری پدر بزرگ اطلاعاتی دیگر در دست نیست در خانواده بیمار مرگ و میر غیر عادی یا بیماری مهم و قابل توجهی ذکر نمی شود - ما در بیمار دوران بارداری را طبیعی گذرانده و بیماری خاص را در این دوران بیان ندارد و داروی خاصی نیز مصرف ننموده است - زایمان طبیعی و در بیمارستان صورت گرفته است . طفل در موقع تولد سالم و بدون عیب گزارش شده است .

واکسیناسیون طفل در دوران کودکی بطور ناقص صورت گرفته است . رشد و تکامل کودک قبل از بیماری اخیر در مقایسه با دیگر برادرانش و دیگر همسالان او طبیعی و رضایت بخش بوده - دوران اولیه دبستان را بخوبی سپری نموده و عقب ماندگی درسی نداشته است ولیکن در دو سال اخیر مرتباً "نمرات متوسط و پائین داشته و از انجام تکاليف مدرسه ای - اجتماعی و حتی کارهای شخصی (مانند لباس پوشیدن) نیز نا اندازه قاصر بوده و ناتوان شده است . بعلت

مج پا وجود علامت باسنکی BABNSK دیده می شود . اشتراک باسنکی مثبت و رفلکس منفی روتول می تواند علامت پاتوگنومونیک این بیماری باشد .

کنترل ادرار و مدفوع بندرت اختلال می باید حتی در مراحل آخر بیماری نیز بدون نقص باقی می ماند . عقب افتادگی فکری و اختلال مشاعر در $\frac{1}{3}$ موارد مخصوصاً "در فرم مغلوب پیدا می شود .

تغییرات الکتروکاردیوگرافی میوکاردیت را در ۹۰ درصد موارد نشان می دهد و تغییرات موج تی III و ناقص مادرزادی قلبی و بلوکهای قلبی شایع است . (۱۱-۱۲) بطور غیر عادی نسبت شیوع دیابت در این بیماری به ۲۳ درصد می رسد (۱۲) مرگ در این بیماران بعلت دیسغازی - ضعف مغوط بدن و عضلات - نارسائی قلبی پیش می آید .

تشخیص

در بیماری بشکل تی پیک وجود آتاكسی بیشرونده و تغییرات استخوانی همراه با سابقه فامیلی (تصورت بیماری یا تغییرات استخوانی) موید تشخیص بیماری است . در میان آتاكسی بیشترته اطفال از نظر شیوع در این مورد آتاكسی تلانژکتازی است که وجود تلانژکتازی پوستی - ساقه عفونتهای مکرر و شدید تنفسی - فقدان یا کمبود شدید IGA گلبولین - فقدان تغییرات استخوانی و علائم حسی تشخیص آتاكسی تلانژی کتازی را ساده می سازد .

گاهی موارد حد واسطه نیز آتاكسی فریدریش و دیگر آتاكسیهای ارشی دژنراتیوگزارش شده است . تمام علائم و مطالعات پاراکلینیکی در سندروم آتاكسی فریدریش طبیعی است بجز الکتروکاردیوگرافی که تغییراتی دال بر میوکاردیت دیده می شود .

درمان :

"کودکان قبل" به این نوع (آتاكسی امپینوسبلار) باید تا - حدامکان اکیتوبا قیمانده، حرکات فیزیکی کافی داشته باشد .

افقی واضح در هر دو چشم در معاینه دیده می‌شود.

رفلکس‌های مردمک و قرنیه طبیعی هستند. در معاینه گوش و حلق و بینی نکته مرض دیده نشد – در معاینه قلب ضربان قلب هفتاد در دقیقه – دارای ریتم منظم بوده و صدای غیر طبیعی شنیده نگردید – در معاینه ریتین صداهای تنفس واضح و طبیعی شنیده شد در معاینه شکم ضایعه پاتولژیک مشاهده نگردید. در معاینه دستگاه تناسلی ادراری خارجی علائم تکامل بلوغ با رشد آلت مردانه و رویش موهای زهار مشاهده گردید – بیضه‌ها با اندازه طبیعی و در کیسه بیضه قرار دارند – نکته غیر عادی و مرض دیگر دیده نمی‌شود.

در معاینه اندامهای دست و یا تغییرات واضح در هر دو پای بیمار بصورت تولید قوس بیشتر در انحنای هردو پا که اصطلاحاً "به آن CAVUS PES" می‌گویند دیده می‌شود. (تصویر ۰۷) اتروفی عضلانی بمقدار زیاد در عضلات پشت ساق پا و بمقدار مختصر در سایر عضلات بدن مشاهده می‌گردد. دیگر مفاصل بدن بیمار کاملاً "سالم" – متحرک بدون تورم و بدون درد هستند.

در معاینه عصبی همانطور که ذکر گردید رفتار عمومی – درجه شعور و آگاهی – میزان هوش – حافظه و حالات هیجانی و روحی بیمار در حد یک کودک طبیعی بود. بخوبی همکاری می‌کند. علی‌رغم اشکال تکلم سعی زیاد در بیان حالات خود می‌نماید.

شنوایی خوب است. بینایی طبیعی است – تکلم بیمار به نحو خاص دچار اختلال است: بیمار پس از بیان چند کلمه ناگهان توقف پیدا می‌کند در حالی که تلاش می‌کند تا کلمات را بزیان بیاورد و پساز چند ثانیه ناگهان کلمات بر زبان جاری می‌شود و سرعت گفته می‌شود و پس از چند لحظه تکرار حالات قبلی – شکل سخن گفتن بیمار از نظر شکل و مکانیسم اختلال مانند راه رفتن بیمار می‌باشد. چنین اشکالاتی نیز درنوشتن بیمار بوجود آمده است – ایجاد لرزش هم‌زمان با حرکت دست بیمار را از انجام اعمال فیزیکی دقیق وظیف عاجز برخیزد می‌دارد.

در معاینه تمام اعصاب جمجمه‌ای سالم به نظر می‌رسد – در معاینه اعمال مخجه‌ای اعمال رساندن انگشت به بینی – رساندن انگشت بیمار به انگشت معاینه کننده دچار اختلال شده است – قدرت ایستادن با چشمان بسته از بین

لرزش بدن و اشکال در بیان کلمات مورد تمسخر کودکان مدرسه قرار می‌گرفته ولیکن این موضوع چندان ناراحتی روانی مهمی در کودکان مبتلا ایجاد ننموده است. در پرسشهای مختلف دیگر شکایت دیگری وجود نداشت.

در مورد دستگاه عصبی – عضلانی تاکید بیشتری شد ولیکن از علائمی چون سردرد – سرگیجه – تشنج ذکری بیان نیامد.

در معاینه بیمار – بیمار در حالات عمومی خوب – بدون تب – نبض ۷۵ در دقیقه – تنفس ۲۰ در دقیقه – مرتب و بدون اشکال – فشار خون $\frac{120}{80}$ میلی متر جیوه وزن ۴۵ کیلوگرم قد ۱۵۹ سانتی متر دورسر ۴۸ سانتی متر است – بیمار در پرسانتایل ۲۵ قرار دارد.

همانطورکه ذکر شد حالت عمومی بیمار عالی است. بخوبی در معاینه همکاری می‌کند – به سؤلات براحتی جواب کافی و قانع کننده می‌دهد. از نظر جسمی بدن بیمار خصوصاً تنہ بیمار بعلت کیفواسکلیوز بطرف راست تعامل بیشتری دارد. سرورموسفال است، صورت طبیعی است – قفسه صدری رشد کافی نداشته و حجم آن کاهش یافته است و بصورت نوعی از تغییرات سینه کبوتری خودنمایی می‌کند (تصویر ۰۶).

بیمار در حالت نشسته هیچگونه اشکالی ندارد. لرزش وجود ندارد – شروع لرزش با شروع حرکت همزمان است – راه رفتن کاملاً "بدون توازن است – تلوتو می‌خورد و به چپ و راست تعامل پیدا می‌کند – احتمال سقوط دارد – ناگهان وقفه در برداشتن قدم دیگر پیدا می‌شود سپس چند قدم بطور ناگهانی و سریع و پرشی برداشته می‌شود و راه – رفتن برای چند لحظه‌ای عادی می‌شود و دوباره حالت قبلی تکرار می‌گردد.

آتاکسی بیمار در ابتدای حالت ایستاده واضح نیست ولیکن پس از گذشت چند دقیقه آتاکسی در حالت ایستاده آغاز می‌گردد و در صورتیکه بیمار چشمان خود را بسته نگاه دارد آتاکسی بلا فاصله تولید شده و بیمار به زمین سقوط می‌کند (رومبرگ مشت) در پوست بیمار لکه پاتولژیک دیده نمی‌شود – ارنوباتی وجود ندارد.

در معاینه ته چشم بیمار (فوندوسکوپی) ضایعه‌ای دیده نشد – حرکات کره چشم طبیعی ولیکن نیستاگموس

و در نوشتن کاملاً "شبیه برادر بزرگترش می باشد و بهمین جهت از ذکر و شرح مجدد آنها خودداری بعمل آمد . دیگر نکات مثبت عبارتند از :

آناکسی تنمای آناکسی اندامهای تحتانی - نیستاگموس افقی در هر دو چشم - وجود کیفواسکلیوز مختصر - طبیعی بودن رشد فیزیکی و عقلی - طبیعی بوده صدای قلب و ریتین - طبیعی بودن تمام آزمایشات لابراتواری و نبودن تغییرات مرض در الکتروکاردیوگرافی - وجود تغییرات استخوانی در استخوانهای مج پا و کف پا بصورت CAVUS - کاهش رفلکس‌های تاندونی - فقدان رفلکس‌رتون - وجود بانبستی دو طرفه - وجود آتروفی عضلانی عمومی خصوصاً در عضلات پشت ساق پا .

رفته است - لرزش در هنگام حرکت پیدا می شود - شدت آناکسی در اندازهای تحتانی بیشتر مشاهده می شود نیستاگموس افقی و اختلال تکلم نیز دیده شد که ذکر گردید - در معاينه سیستم حركتی = اتروفی عضلانی در تمام بدن بخصوص در عضلات پشت ساق پا واضح است - قدرت عضلانی کاهش یافته است - اسپاسم در عضلات پشت ساق پا وجود دارد - تمام رفلکس‌های تاندونی کاهش یافته اند - رفلکس‌های مربوط به عضلات دوسر - سه سر - آشیل - چهار سررانی از بین رفته اند - رفلکس‌های پوستی شکمی و کرماست و وجود دارند - رفلکس‌کف پائی بانبستی EXTENSOR PLANTAR در هر دو پا دیده می شود .

نتیجه آزمایشات آزمایشگاهی که تماماً "طبیعی" هستند بقرار زیر است :

هموگوبی ۱۴ گرم درصد گلبلول قرمز ۵ میلیون
کلبلول سفید ۹ هزار با ۳۰ درصد .

لمفولیت - ۶۵ درصد توتروفیل ۲٪ منوسيت يك درصد بازو فيل ۲ درصد باند و يك درصد رتيكوموسيت . قند خون ناشتا ۹۰ گرم .
کلسترون سرم ۲۰۰ گرم سديم ۱۴۰ ميلي آلوalan -
پتانسيم ۴ ميلي اكيوالان - فسفر ۴ و کلسیم ۱۱ ميلي گرم -
آزمایش ادرار طبیعی - آزمایش موضوع طبیعی - رادیوگرافی قلب و ریتین طبیعی - در الکتروکاردیوگرافی تغییرات مرض دیده نشد .


بيمار دوم بنام الف - ص پسر ۱۲ ساله برادر كوچکتر بيمار اول که بعلت اختلال در تکلم و اختلال در راه رفتن وعقب ماندگی در دروس مدرسه دردو سال اخیر مراجعت نموده است . بعلت تشابهات زياد در شرح بيماري و سيمير بيماري و علائم بيماري در اين مورد با اول نکات اصلی به ترتيب زير خلاصه می شود :

شرح بيماري تدریجی و مزمن از ۱/۵ سال قبل یعنی از سن ده سالگی شدت پیش روی بيماری خفیف تراز برادر بزرگ او بوده است - بيمار قبل از شروع بيمار نکته قابل توجهی که سبب مراجعت او به پزشك شود نداشته است . حالت عمومی بيمار خوب است و کاملاً "هوشيار است و بسئوالات بخوبی جواب می دهد و همکاری لازم را دارا می باشد . اختلال در راه رفتن - عدم توازن با چشمان بسته . اختلال در تکلم


خلاصه

دو مورد واضح سندروم فریدریش که دو برادر ۱۲ و ۱۵ ساله بودند شرح داده شد بنظر می رسد با تکیه به زمان شروع بیماری این نوع سندروم فریدریش از نوع اتوزوم مغلوب باشد . وجود نیستاگموس افقی در خواهر بیماران وجود نوع محفوظ این سندروم را دلالت می دهد که تنها با وجود علامت نیستاگموس خودنمایی کرده است . خلاصه علائم مشاهده شده در بیماران عبارت است از :


آناکسی حرکتی در تنه و خصوصاً در اندام تحتانی - رومبرگ مثبت - دیسمرتی دستها و بازوها - اختلال تکلم - اختلال حسی عمقی - فقدان رفلکس‌های تاندونی مخصوصاً "رفلکس روتول - کیفواسکلیوز - افزایش قوس کف پا بصورت PES CAVUS وجود بانبستی مثبت دو طرفه .




شکل ۱




شکل ۲




شکل ۲




شکل ۴



شکل ۵



شکل ۶



شکل ۷

REFERENCE

- 1- Friedrich,N.: Urber Degenerdtive Atrophie der spinalen hinterstraenge Virchow arch, patts and 26.391 1863
- 2- Bell J. and Garmichael E.A. on hereditary ataxia and spastic paraplegia treasur of human inhtentanel 4: 141 1939
- 3- Gafle, B.I., Segal, I. and Keller, P. Insulin level in hereditary ataxia New Eng.J.Med. 283, 1410, 1970
- 4- Dunn H.G. and Dolman C.L. Nectrotizing encephalopathy, Neurology (Minneap) 19: 536, 1969
- 5- Greenfield J.G. the spino-cerebellar degenerations, beackwell oxford 1954
- 6- Locks, S and foley, S.M. a case of cerebellar ataxia with a discussion of classification arch. Neurol 3279, 1960.
- 7- Robrnrson M. fried nchis ataxia: a histochemical & study.I. Enymes of carbohydrate metabolism, art neuropatts to: 25, 1966

- 8- Robinson N. Chemical change in the spinal cord in fnednchis ataxia and motor neuron disease, J. neurol. Neurosery 6: 25, 1966
- 9- Sjogren T. Klinische and erbbiologische untersuchungen urber die heredoataxia acta psych. et neurol suppl. 27, 1943
- 10-Andre van leeuwen, M: sur deax cas familiaux de maladie de Fnednchis avec atrophie optigul precoce globale et grare rey. Neurol (paris) 81: 941, 1949
- 11-Boyeris.H.Chisholem Q.W., and ma kusick V.A. cardiac aspect of fnednchis ataxia, circulation 25: 492, 1962
- 12-Hewer R.L. study of fatal cases of enednchis ataxia brit. med.J. 3: 649 1968
- 13-Textbook of child neurology John, H. Menkes 89-92, 1973.