

نواقص متابولیکی آمینواسیدها، کربوئیدراتها و موکوبالی ساکاریدتها در بیماران عقب افتاده ذهنی و روانی

* دکتر رضا سید یزدانی ** اقدس غفاری زاده *** دکتر حسین عاملی

مقدمه:

در این مقاله نتایج آزمایشات ۶۹۵ بیمار عقب افتاده ذهنی از لحاظ نقص در متابولیسم آمینواسیدها و موکوبالی ساکاریدها و کربوئیدراتها مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و متodes آزمایش:

خون و ادرار از ۶۹۵ بیمار عقب افتاده فکری که درجه عقب ماندگی متفاوتی را نشان میدادند جمیع آوری گردید، ادرار صبح بیمار بعد از تهیه تا انجام آزمایش در ۲۰- درجه سانتی گراد نگاهداری گردید.

تشخیص فنیل کتونوری: تعیین افزایش فنیل آلانین خون با استفاده از تست گاتری انجام پذیرفت، که عبارت است از منع رشد باکتری باسیلوس سوبتیلوس در یک محیط آکار محتوی ماده منع کننده بتا - ۲- تی انیل آلانین که آنالوگ فنیل آلانین میباشد. (۱۲) و (۱۴).

آزمایشات شیمیائی:

در ده سال اخیر بیماریهای متعددی شناخته شده که با عقب افتادگی ذهنی و افزایش یک یا چند آمینواسید در ادرار همراه بوده است. آمینواسید اوری ممکنست بعلت افزایش مقدار آمینواسید پلاسما که نتیجتاً "موجب افزایش آمینواسید ادرار میگردد حاصل شود، مانند فنیل کتونوری (۱) بیماری شبیت افرا (لوسینوز) (۲) و (۳) هیپرگلیسین امی (۴)، هیپرلیزین امی (۵) و هوسیستین اوری (۶) هیستیدین امی (۷) آرژینین سوکسینیک اسید اوری (۸)، و یا در اثر نقص انتقال کلیوی که موجب افزایش دفع آمینواسید در ادرار میگردد حاصل شود، در اینصورت میزان آمینواسید پلاسما، طبیعی یا کمی کاهش را نشان میدهد، مانند بیماری هارتندوب (۹) و سندرم لو (Low s) (۱۰) و تباہی مخی و ماکولائی (Cerebromacular degeneration) (۱۱) همراه میباشد (۱۱) و بالاخره سندرم دیگری که عقب افتادگی ذهنی همراه با آسپاراتیل گلوكوز آمین اوری میباشد شناخته شده است (۱۲).

* بخش بیولوژی کاربردی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران.
** مرکز تحقیقات و مشاوره ژنتیک انسانی وابسته به بنگاه حمایت مادران و نوزادان.

کروماتوگرافی آمینواسیدها در محیط بوتانول استیک اسید و آب با نسبت ۴:۱:۱ (۲۰) و کروماتوگرافی قندها در محیط اتیل استات و پیریدن و آب با نسبت ۱۲:۵:۴ (۲۱) بود. الکتروفورز آمینواسیدها با ولتاژ بالا در $\text{PH}=1.9$ فرمیک اسید، استیک اسید، و آب با نسبت ۲۷:۸۲:۶ (۱۹۸۸) پیریدن، استیک اسید و آب با نسبت ۱۰۰:۱۰:۱۰۰ (۲۰) انجام پذیرفت (۲۲).

معرفهای شیمیائی اختصاصی:

این معرفهای برای تشخیص آمینواسیدهای متیونین و آمینواسیدهای سولفوردارو - هیستیدین و آرژنین و تیروزین و تریپتوفان بکار می‌رود (۲۳).

نتایج:

آزمایش خون و ادرار از ۶۹۵ بیمار عقب افتاده ذهنی و روانی با درجهات مختلف بعمل آمد. ۲۵ بیمار دارای میزان غیر طبیعی آمینواسیدی، ۳ بیمار دارای آفزايش قابل ملاحظه موکوپلی ساکاریدو ۱ بیمار دارای آفزايش غیر طبیعی ترکیبات قندی بودند.

در ۱۲ بیمار از جمع ۲۵ بیمار آفزايش آمینواسید در سرم و ادرار وجود داشت در ۵ بیمار آفزايش آمینواسید وابسته به نقص انتقالی کلیه‌ها بود که این آفزايش تنها در ادرار دیده شد. در ۳ بیمار آمینواسید اوری از نوع متغیر بود که اهمیت این نوع اختلال متابولیکی هنوز شناخته نشده. شکل ۱ نشان دهنده نتایج بررسی الکتروفورز با ولتاژ بالا است از بیمارانی که دارای نواقص متابولیکی در آمینواسیدها می‌باشد.

جدول (۱) مشخص کننده نتایج بدست آمده از بررسی ۶۹۵ کودک عقب افتاده ذهنی و روانی می‌باشد.

جدول (۱)

نتیجه بررسی ۶۹۵ بیمار عقب افتاده ذهنی و روانی

تعداد بیماران	تشخیص نوع بیماری
۱	۱- نقص متابولیکی همراه با آفزايش آمینواسید در سرم و ادرار
۱۱	(الف) فنیل کتونوری
۱	ب- بیماری شربت افرا

آزمایش شیمیائی کلرور فریک، ۱ml از معرف فریک کلرید باضافه ۱۵ قطره ادرار را خوب تکان داده ایجاد رنگ سبز مشخص کننده وجود فنیل پیروویک اسید یا ایمییدازول پیروویک اسید است (۱۵).

آزمایش تعیین سیستین و هموسیستین را با اضافه کردن ۴/۰ میلی لیتر سدیم سیانید به امیلی لیتر ادرار مورد بررسی قرار داده ایجاد رنگ صورتی (قرمز کم رنگ) میتواند مشخص کننده نتیجه مثبت باشد (۶) (۱۷).

افزايش گلوکز و دیگر ترکیبات کربوئیدراته، تشخیص گالاكتوزی، عدم قدرت تحمل ارشی فروکتوز و پنتوز و دیابت را با اضافه کردن ۳ قطره ادرار به ۱ میلی لیتر محلول بندیکت (Benedicts) تعیین نموده، ایجاد رسوب زرد رنگ یا پرتفالی مشخص کننده مثبت بودن این آزمایش می‌باشد. (۱۸) (۱۹).

وجود افزایش تیروزین - پ - ئیدروکسی فنیل لاکتیک اسید، پ - ئیدروکسی فنیل استیک اسید و پ - ئیدروکسی فنیل پیروویک اسید و تشخیص تیروزین امی را با اضافه کردن ۱۵ قطره از محلول نتیروزونفتل به ۳ قطره ادرار که نتیجه آن ایجاد رنگ قرمز پرتفالی است میتوان مشخص نمود (۱۶).

تعیین افزایش الفا - کتواسید، و تشخیص فنیل کتونوری، تیروزین امی، بیماری شربت افرا و هیستیدین امی را با افزایش ۳ قطره از محلول دی نیترفنیل هیدرازین به امیلی لیتر ادرار مورد بررسی قرار داده ایجاد رسوب زرد مشخص کننده مثبت بودن آزمایش است (۱۶).

در بیماریها گالاكتوزی و سندروم لو (LOW) و سولفو سالیسیلیک مثبت می‌باشد با اضافه کردن ۳ قطره از محلول ۲۰% سولفو سالیسیلیک به امیلی لیتر ادرار رسوب ایجاد می‌گردد. نتیجه مثبت میتواند مشخص کننده انواع متفاوت بیماریهای کلیوی باشد (۶).

برای تعیین افزایش موکوپلی ساکاریدها به امیلی لیتر ادرار ۶ قطره از معرف ستیل تری میتل آمونیم برومنید اضافه گردید ایجاد رسوب مشخص کننده نتیجه مثبت است. این آزمایش با معرف آبی تولوئیدین هم مثبت می‌باشد (۱۸) (۱۹).

۲- آمینواسید اوری حاصل از نقص انتقال در کلیمه‌هاالف) لیزین اوریب- بتا-الانین اوریپ- گلوسین اوری۳- آمینواسید اوری متغیرتعداد بیماران تشخیص نوع بیماریالف) گلوسین اوریب- لیزین اوری۴- موكوبالی ساکاریدوز۵- کوبوئیدراتهاشکل (۱)- الکتروفورز آمینواسیدهای ادرار در بیماران مبتلا به نواقص متابولیکی آمینواسیدی۳- فنیل کتونوری۲- گلیسین اوری۴- بتا-الانین اوری۱- ادرار طبیعی۷- آمینواسیدهای استاندارد.۶- شربت افرا۵- لیزین اوری

میتواند دلیلی باشد برای آغاز تحقیقات بیشتر در مورد تعیین دقیق کثرت این بیماری در ایران و اسکرین تمام نوزادان جهت تشخیص فنیل کتونوری و معالجه و درمان کامل آنها.

بیماری فنیل کتونوری در جوامع مختلف جهان با فراوانی متفاوتی وجود دارد در ایرلند این بیماری با نسبت ۱:۴۵۰۰ نفر و در اسرائیل با نسبت ۱:۱۹۰۰۰ نفر دیده شده است (۳۵). دانشمندی بنام Saugstad (۲) فراوانی فنیل کتونوری را در نروژ با نسبت ۱:۷۵۰۰ در سال ۱۹۱۸ و ۱:۱۲۵۰۰ در سال ۱۹۴۱ و ۱:۱۴۰۰۰ از سال ۱۹۶۲ - ۱۹۷۱ و نسبت ۱:۱۶۰۰۰ را در سال ۱۹۷۲ تعیین نمود او کاهش بیماری فنیل کتونوری را طی سالهای متتمادی بعلت کم شدن ازدواج‌های فامیلی در کشور نروژ توصیف کرد.

در این مقاله یک نمونه بیماری نادر شربت افرا که وراثت آن بصورت اتوزومی میباشد گزارش گردیده است، این بیماری در ۹ کشور اروپائی با نسبت ۱:۱۲۰۰۰۰ نفر (۳۶) و در آمریکا فراوانی آن با نسبت ۱:۲۹۰۰۰ نفر تعیین شده است (۳۳).

در مورد بیماری متابولیکی و نادر بتاalanin اوری و بیماریهای متابولیکی گلوسین اوری و لیزین اوری که همگی دارای وراثت نهفته اتوزومی میباشند هیچگونه اطلاعات زنتیکی که نمایان کننده فراوانی اینگونه بیماریها در جوامع مختلف باشد هنوز بدست نیامده است.

در این مقاله ۳ مورد بیماران عقب افتاده ذهنی همراه با افزایش دفع موکوپلی ساکارید بطور دائم تعیین گردید که سندروم یکی از بیماران مورکنیو تشخیص داده شد. در پلاسماسرم این بیماران فعالیت آنزیمهای گلی کوسیداز که در متابولیسم موکوپلی ساکاریدها اهمیت دارند مورد بررسی قرار گرفت که فعالیت کاتالیتیکی این آنزیمهها با استفاده از روش‌های فلوریمتری کاملاً "طبیعی بود، این آنزیمهها عبارت بودنداز: ان - استیل - بتا - دی - گلوكوز آمینیداز، ان - استیل بتا - دی گالاكتوز آمینیداز، بتا - گالاكتوزیداز، بتا - گلوكور و نیداز، الفا - گلوكوزیداز، بتا - گلوكوزیداز، الفا - آرابینوزیداز - الفا - گزیلوزیداز، بتا - گزیلوزیداز.

خلاصه:

در بررسی های متابولیکی از ۶۹۵ بیمار عقب افتاده

بحث:

اکثر بیماریهای متابولیکی مادرزادی بصورت وراثت نهفته اتوزومی انتقال می‌باید. در اینحال نقص زنتیکی موجب اختلال درسترنیک آنزیم خاص شده و در نتیجه موجب ذخیره نوعی متابولیت در بدن میشود که این خود ایجاد نشانه‌های روانی و اختلال در سیستم مرکز عصبی و اعضاء، دیگر بدن را فراهم می‌سازد (۶، ۷).

تشخیص دقیق و موقع بیماریهای متابولیکی مادرزادی بچند دلیل دارای اهمیت فراوان می‌باشد.

در بعضی از اینگونه بیماریها امکان جلوگیری از ضایعات مغزی در اثر رژیم غذایی مناسب وجود دارد. درین این گروه میتوان از بیماریهای گالاکتوز می و فنیل کتونوری نامبرد، که رژیم غذایی بلافاصله بعد از تولد آغاز می‌گردد (۹۶).

رژیم غذایی در مورد بیماریهای آرزینینوسوکسینیک اسیداوری (۱۰) و بیماری شربت افرا (۱۱) و تیروزین امی (۱۲) دارای نتایج بسیار قابل توجهی بوده است. بعضی بیماریهای متابولیکی را میتوان در مرحله جنبینی تشخیص داده و موجبات سقط‌جنین مبتلا را فراهم نمود، از اینگونه بیماریها هیبرآمون امی و آرزینین امی و آرزینینوسوکسینیک اسید اوری و گالاکتوز امی، هموسیستین اوری، والین امی (۲) را نام برد.

بالاخره تشخیص دقیق بیماری متابولیکی از نظر جنبه‌های مشاوره زنتیکی خانوادگی حائز اهمیت می‌باشد.

بررسیهای متابولیکی در بیماران عقب افتاده ذهنی و روانی تاکنون در اجتماعات متفاوتی صورت گرفته است (۲۴) و (۲۵) و (۲۶) و (۲۷). فراوانی نواقص متابولیکی در آمینو اسیدها در بین این بیماران که نتیجه این بررسیها بوده بین ۱-۴/۶٪ متغیر می‌باشد، که بالاترین ارقام در ایرلند شمالی ملاحظه شده است که احتمالاً "بعلت افزایش ازدواج‌های فامیلی در خانواده‌های کاتولیک وجود دارد (۲۹-۲۸).

فراوانی بیماری فنیل کتونوری در کودکان عقب افتاده ذهنی که در این مقاله گزارش گردیده رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد که این فراوانی احتمالاً "با ازدواج‌های فامیلی که در ایران بوفور دیده میشود بی ارتباط نمی‌باشد و خسود

متغیر آمینواسیدی که ۱ نفر آنها مبتلا به گلیسین اوری و دو نفر لیزین اوری بودند. ضمناً ۳ بیمار موكولی ساکاریدوز و ۱ بیمار همراه با نقص متابولیکی در مواد قندی شناخته شد.

ذهنی در ایران نتایج زیر عمل آمد. ۱۱ بیمار فنیل کتونوری، ۱ بیمار ادرار شربت افرا، ۳ بیمار گلیسین اوری، ۱ بیماری لیزین اوری، ۱ بیمار بتا آلانین اوری و ۳ بیمار دارای افزایش

REFERENCES

- (1) Folling, A.: Z.Physiol Chem 227 : 169 (1934).
- (2) Menkes, J.H., Hurst, P.L., Craig, J.M.: Pediatrics 14: 462 (1954).
- (3) Snyderman, S.E.: In W.L. Nyhan (ed.) Amino acid metabolism and genetic variation. Mc Graw-Hill, New York, P. 171. (1967).
- (4) Childs, B., Nyhan, W.L., Borden, M., Bard, L., and Cooke, R.E.: Pediatrics 27: 522 (1961).
- (5) Ghadimi, H., Binnington, V.I., and Pecora, P.: J.Pediatrics 65: 1120 (1964).
- (6) Carson, N.A.J., Cusworth, D.C., Dent, C.E., Field, C.M.B., Neill, D.W., and Westall, R.G.: Arch Dis Child 38 : 425 (1963).
- (7) Ghadimi, H., Cusworth, D.C., Dent, C. New. Eng. J. Med 265 : 221 (1961).
- (8) Allan, J.D., Cusworth, D.C., : Lancet i : 182 (1958).
- (9) Baron, D.N., Dent, C.E., and Harris, H., Hart, E.W., Jepson, J.B. : Lancet ii : 421 (1956).
- (10) Lowe, C.U., Terry, M., and Mac Lachlan, E.A.: Amer. J.Dis Child 83 : 164 (1952)
- (11) Bessman, S.P., and Baldwin, R.: Science 135 : 789 (1962).

- (12) Pollitt, R.J., Merskey, H., and Jenner, F.A. Lancet ii: 253 (1968).
- (13) Guthrie, R., Susi, A.: Pediatrics 32 : 338, (1963).
- (14) Guthrie, R., Murphy, W.H. : IN Bickel, H. Hudson, F.P., Woolf L.I. (eds). Thieme Verlag, Stuttgart, P. 132 (1971).
- (15) Renuart, A.W.: New England J. Med. 274 : 384-387, (1966).
- (16) Perry, T.L., Hansen, S., Mac Dougall, L. : Canad Med Ass J. 95: 89, (1966).
- (17) Brand, E., Harris, M.M. and Biloon, S.: J.Biol Chem 86: 315, (1930).
- (18) Bradley, G.M.: Human Patho 12: 30-, (1971).
- (19) McKusick, V.: Heritable disorder of connective tissue (2nd ed. : St.Louis C.V. Mosby Comapny. 1960).
- (20) Efron, M.L., Young, D., Moser, H.W. MacCready, R.A.,: The New england Journal of medicine. June 25, Vol. 270. No. 26: 1378, (1964).
- (21) Wright, S.W., Ulstron, R.A., and Szewczak, J.T.: J.Dis. Childhood 93 : 173-181, (1957).
- (22) Holmgren, G. Jeppsson, J.G. and Samulson, G.: Scand. J. Clin. Lab Invest 26, 318. (1970).
- (23) Lehman, H. Huntsman R.G. Mans hemoglobins, North - Holland Publication Company P437, (1974).
- (24) Holmgren, G. Human Heredity, 23 (6), 548, (1973).
- (25) Carson, N.A.J. and Neill, D.W. : Arch Dis Child, 37 : 505 (1962).
- (26) Mattingly, J. : New Zeal Med J 68 : 308 (1968).
- (27) Stridhara Rama Rao, B.S., Narayanan. Reddy, G.N. ; Brit J. Psychiat 118 : 505 (1971).

- (28) Kiil, R., Rokkones, T. : Acta Paediat Scand 53 : 356, (1964).
- (29) Holmgren, G., Inborn Errors of Amino Acid Metabolism in Children With Psycho Neuological Diseases. Medical Dissertations No. 16. (1974).
Department of Pediatrics, University of Umea, Sweden.
- (30) Scriver, C.R., and Rosenberg, L.E.: Amino Acid Metabolism and Its Disorders, PP. 290-337 Saunders, Philadelphia, 1973.
- (31) Sangstad, L.F.: Clin Genet., 7, 40, (1975).
- (32) Collective Results of Mass Screening for Inborn Metabolic Errors in Eight European Countries. Acta Paediat. Scand., 62, 413. (1973).
- (33) Levy, H.L. Genetic Screening in Advances in Human genetics, edited by H. Harris and K.Hirschhorn, Vol. IV, P. 389. Plenum, New York, (1973).