

## گزارش دومورد تشخیص و درمان بیمار مبتلا به الکاپتینوریا

دکتر روح‌الله اقراری

مقدمه:

در تشخیص الکاپتینوریا باین نکات باید توجه داشت:  
ادرار تازه منظره طبیعی دارد ولی در مجاورت هوا از سطح شروع بسیاه شدن میکند و این خاصیت در محیط قلایعی ادرار تشید میشود. معرف بندیک را اسید هموژانتزیک برنگ قهوه‌ای تیره تبدیل میکند و با معرف فریک کلراید برنگ ارغوانی سیاه درمی‌آید.

صرف اسید اسکوریک بمقدار فراوان سیاه شدن رنگ ادرار را ممکن است زایل کند که باعث جواب کاذب با معرف‌های فوق الذکر خواهد شد. تغییر رنگ ادرار بعلت وجود مواد صفرایی، بورفیرین‌ها، میوگلوبین باید با آزمایش‌های مخصوص خود شناخته شوند تا در تشخیص الکاپتینوریا اشتباه نشود.

### شرح حال بیماران ما:

بیمار زنی است بنام خ - ح ۴۶ ساله مدیره یک دبیرستان اهل تبریز و ساکن تهران بعلت درد پهلوی چپ شش سال قبل بیکی از همکاران متخصص بیماریهای داخلی مراجعه میکند و در عکسبرداری سایه سنگی در لگنجه کلیه چپ مشاهده میشود که تحت عمل جراحی قرار میگیرد پس از برداشتن سنگ آرامش نسبی در وضع بیمار پدید می‌آید ولی دردها بطور کلی برطرف نمیشود. در حرکات و هنگام فعالیت درد در ناحیه پشت وجود داشته مدتی درمانهای


مختصری در باره الکاپتینوریا: الکاپتینوری درنتیجه اختلال متابولیسم تیروزین بعلت کمبود آنزیم اسید هموژانتزیک اکسیداز است. الکاپتینوریا عامل و مقدمه اکرونوزیس است که این حالت مربوط به رسوب دانه‌های اکسیده قهوه‌ای متمایل بسیاه اسید هموژانتزیک در نسوج هم بندی است که باعث اسیوندیلوزیس و آرتروپاتی میشود.

اسید هموژانتزیک در کبد و کلیه اکسیده شده و به اسید مالیل استواستیک تبدیل میشود. در صورت نبودن این فعل و انفعال اسید هموژانتزیک در نسوج تجمع یافته و بصورت مواد الکاپتینوریک از ادرار دفع میشود. تجمع این اسید در خون مشاهده نمیشود زیرا سرعت از راه کلیه و از گلومرولها دفع میشود. صدمه آن بنسوج همبندی که مشخص اوکرونوزیس است نتیجه تماس ممتد با اسید هموژانتزیک است. پیگمانهای اکسیده شده آن مثل اسید بنزوکینان استیک پولمریزه میشود و پیگمانهای شبیه به ملانین درست میکند که بطرور ثابت بنسوج کلازن می‌چسبند و معتقدند که چسبیدن همین دانه‌های رنگی بدور رشته‌های کلازن باعث تغییر صفات فیزیکی و شیمیائی نسج کلازن میشود و مسئول تغییرات دزتراتیو در اوکرونوزیس است.


گرچه الکاپتینوریا در بچه‌های نوزاد ممکنست دیده شود ولی تغییرات نسج ملتجمه تا زمان بلوغ ظاهر نمیشود.

راست مشاهده میشود . توجه به رادیوگرافیهای بیمار که نشان میدارد از فاصله بین مهره ها کاسته شده و دیسک های بین مهره ای دکالسیفیه است ما را بدبیال تشخیص الکارپتیور با برد (کلیشه ۱ - ۲) . که علت ادامه دردهای بیمار و ساختن سنگهای متعدد را توجیه میکند . از اختلالات ادراری گذشته و از بیماریهای دوران کودکی بیمار سوال شد چیزی بخارط ندارد و چون به بیمار راجع به تغییر رنگ ادرار توجه داده شد بخارط آورد که در دوران کودکی بنا یافته مادرش ادرارش بخلافه سفید لکه های سیاه بجای میگذاشت . قوه شتوائی بیمار از ده سال پیش بتدریج کاهش یافته و دچار سنگی گوش است .

روماتیسمی انجام میشود که با قطع داروهای مسکن درد شدت یافته تا سه سال قبل که ناراحتی های هاضمه ای مثل درد در ناحیه معده ، ترش کردن غذا ، نفخ شکم عارض بیمار میشود و چون هنگام معاينه ناحیه کیسه صفرا در دنای بوده اقدام به کوله سیستوگرافی میشود و چون بتعداد زیاد سنگ در کیسه صفرا داشته از اینترو اقدام بعمل جراحی و کله سیستکتومی میشود . ناراحتی های اخیر بیمار برطرف میشود ولی دردهای سابق در پشت بیمار ادامه میباید . تا آنکه در چند ماه قبل بیمار بعلت درد و سوزش هنگام ادرار کردن مراجعه میکند و با تشخیص ورم مثانه تحت درمان قرار میگیرد و بهبود میباید ولی چند هفته بعد مجدداً "ورم مثانه تکرار میشود اینبار اقدام به I.V.P. میشود و سایه سنگی در لگنجه کلیه طرف



شکل ۱



شکل ۲

گویچه یک هسته‌ای بزرگ ۲ لنفوسيت  
۰۲۳) . مرغولوزی گلبولهای قرمز طبیعی  
است.

هموگلوبین ۱۴ گرم  
اوره خون ۳۴ میلی گرم درصد  
سدیماناتاسیون ساعت اول ۵ میلیمتر  
ساعت دوم ۱۵ میلیمتر  
رادیوگرافی قلب و ریتین طبیعی است.

در این بیمار تشخیص الکاپتینوریا داده شد و تشخیص مبتتنی  
است بر:

۱ - کاهش فاصله مهره‌ها و دکالسیفیه شدن دیسک بیش  
مهره‌ها.

آزمایش‌های پاراکلینیکی بیمار:  
آزمایش اسید هموگلوبین ادرار + + + (آزمایشگاه  
سرم شناسی دانشکده پزشکی تهران) .

آزمایش میکروسکوپیک ادرار:  
گلبول قرمز ۵ - ۳ عدد در هر شان میکروسکوپیک.  
گلبول سفید ۲ - ۲ عدد در هر شان میکروسکوپیک.  
البومین تراس - سیلندر ندارد.  
سلول ابی تلیال ۲ - ۱ عدد در هر میدان میکروسکوپیک.


فرمول شمارش:  
گلبول سفید ۵۰۰ عرب ۴  
گلبول قرمز ۵۰۰۸۰۰ (سگمنته ۶ باتونه ۶ اوزیونوفیل ۳

هموگلوبین ۱۶ گرم درصد

رادیوگرافی از استخوانهای ساعد طبیعی است اوروگرافی و رادیوگرافی ستون فقرات بعمل آمد ضایعه‌ای مشهود نبود ولی هنگام معاينه بیمار دو لکه تیره در روی شورت سفید رنگ بیمار دیده شد و از بیمار توضیح خواسته شد بیان داشت که گاه گاهی این لکها را میبیند و تصور میکند مربوط به ترشح واژن باشد ولی یا جلب توجه بیمار به پیدایش آنها اظهار داشت که بعد از ادرار کردن غالباً دیده است از اینرو آزمایش اسید هموژانتزیک بعمل آمد که مشتب بود و تشخیص الکاپتیوریا داده شد.

در بیمار دوم، علائم دردهای ستون فقرات وجود داشت با انتشار به اطراف کلیه‌ها که علت اصلی مراجعته بیمار بود ولی همانطور که ذکر شد هنوز آثار رادیولوژیک در ستون فقرات مشهود نیست. (کلیشه ۳) باین بیمار نیز روزانه یک گرم ویتامین C تجویز شده و دردها آرامش نسبی دارد.

شکل ۳



۲ - وجود آزمایش اسید هموژانتزیک مشبت.

۳ - سابقه سنگهای متعدد و شرح حال کلینیکی بیمار.

بیمار تحت عمل جراحی برای خارج کردن سنگ کلیه راست قرار گرفت و بعد از مرخص شدن تاکنون (۳۷ ماه) بطور متناوب روزانه یک گرم ویتامین C تجویز شده و دردهای پراکنده بیمار نسبتاً بهبود یافته.

### بیمار دوم

ت - م دختری است ۱۸ ساله که بعلت درد کمر مراجعه نموده دهساله بوده که پدر خود را از دست داده و در یازده سالگی مادرش را بعلت عارضه قلبی از دست داده است و نزد خاله خود زندگی میکند. بعد از حرکات ورزشی، راهپیمایی و آنطور که خود بیمار ذکر میکند سرماخوردگی درد در ستون فقرات و کمر بیمار عارض میشود و استراحت در بهبود درد بیمار چندان موثر نیست.

در معاينه بیمار ظاهر "سالم" است وزن ۴۸ کیلو و قد متوجه. در معاينه ستون فقرات علامت ظاهری بچشم نمیخورد و با فشار در ناحیه ستون فقرات و عضلات لومبوساکره بطور پراکنده محسوس است. رفلکس‌ها طبیعی است. در معاينه قلب و ریتین طبیعی است.

### آزمایش پارا کلینیکی

سدیماتاسیون	ساعت اول ۸ میلیمتر
ساعت دوم	۱۸ میلیمتر
اوره خون	۳۶ میلی گرم درصد
در آزمایش میکروسکپیک ادرار:	کلبول قرمز ۲ - ۵ عدد در هر میدان میکروسپیک
کلبول سفید ۳ - ۱ عدد در هر میدان	سیلندر ندارد الیومین تراس
فرمول شمارش:	کلبول سفید ۴۹۵۰ گلبول قرمز ۵۸ (سکمانته ۶۰۰۰۰۰۰)
باتونه ۷ اوزینوفیل ۴ یک هسته‌ای ۲ - لنفوسيت	(۲۳)

**نتیجه:**

دیسک بین مهره‌ها توجه داشت تا مواردی از الکاپتینوریا را یافت. تجویز ویتامین C بمقدار یک گرم در روز در کاهش تغییر رنگ ادرار این بیماران موثر است و دردها را نسبتاً تخفیف میدهد.

باید در دردهای ستون فقرات به الکاپتینوریا توجه داشت. علامت تغییر رنگ ادرار را با آزمایش اسید هموزانتریک تحقیق کرد و به کم شدن فاصله مهره‌ها و دکالسیفیه شدن

**RCGCFHCCS**

1. UROLOGY CAMPBELL
2. Duncan G.G. Disease of metabolism P. 168 and 675
3. Galdston M steelej-M, and Dobrines K: Alcptonuria and ochronosis
4. Garrad A.E. Inbovn Errors of metabolism ended. London Henry Frowde
5. Lernes. A.B. Metabolism of Phenylalanine and Tyrorine in Advance in Enzymology Vol 14, New York Interseueie press
6. Oppenheimes B.S. and Kline B.S. 1935 Ochronaris with study of an additional eare Arch Int. Med, 27: 732.
7. Partington, M, Scriver, C.R, and Sass-Kortsak. A. (EDS.) Conferance on heredity Tyrosinemia Canad M.A.J. 97: 1045, 1967
8. Perry, T.B, and othres: Carnosinemia, New England, Med, 277: 1219, 1967.
9. Neubauer, O: Handbuch Der Normalen. Uno Patholocischen Physiologie Vol. 5. Berlin, Julius Springer 1968, P. 851.