

تروش شیر و جلوگیری از آن

LACTATION

استفاده از ویتامین B₆ و مقایسه آن با سایر داروها بررسی بر روی ۱۶۵ مورد :

دکتر مهدی رضائی زاده

شده فوق به نسبت بیشتری ترشح شده بیزگی و آمادگی پستان جهت تغذیه نوزاد کم میکند البته رلتغذیه مادر را نبایستی نادیده گرفت . (۱۵۰ و ۹۳)

از عوامل دیگری چون تیروکسین و انسولین در فعالیت پستانی نیز یاد شده ولی بهر صورت این هورمونها بیشتر زمینه ساز بوده و اثر مستقیم ندارند . (۹۳ و ۱۵۰)

در مورد ترشح شیر این مهم نیست که پستان در ضمن حاملگی چه مقدار بزرگ میشود بلکه بایستی توجه داشت تا زمانی که جفت در بدن وجود دارد ترشح شیر ممکن نیست چون این عمل بعلت تاثیر استروژن بر روی هیپوتالاموس و هیپوفیز قدا می مهار شده است و بلا فاصله بعد از زایمان و خروج جفت اثر ممانعت کننده از بین رفته با ایجاد پرولاکتین ترشح شیر از پستان را تحریک میکند و مهمتر از همه ادامه ترشح شیر بوسیله تحریک نوک پستان از طریق مکیدن است و بوسیله یک مکانیسم عصبی از طریق هیپوتالاموس باعث ترشح پرولاکتین میشود . (۱۵۰ و ۹۳)

نکته دیگر اینکه تخلیه کامل پستان خود به ترشح شیر کم میکند (نکته ای که در مورد خشکانیدن شیر با بستن پستانها مهم است) البته عمل تخلیه پستانها در اثر انقباض سلولهای میوایی تلیال اطراف مجاری و آسینی ها صورت میگیرد که تحت تاثیر استروژن و پرولاکتین نیز شدت میباشد . بطور کلی استروژن- هیپوفیزی و کورتیکوئید فوق کلیوی هم موثر هستند ولی بعد از بلوغ ادامه رشد و نمو پستانها علاوه بر هورمونهای فوق تحت تاثیر پرژسترون و پرولاکتین نیز شدت میباشد . بطور کلی استروژن- هورمون سوماتوتrop و کورتیزون باعث رشد و نمو مجاری شیری میشوند در حالیکه پرژسترون و پرولاکتین و کلیکوکورتیکوئیدها باعث رشد و نمو غدد شیری میشوند . علاوه بر رشد و نمو مجاری و غدد این هورمونها باعث تجمع چربی در نسخ پستان شده و بیزگی آن کم میکند . در ضمن حاملگی تمام عوامل یاد

ترشح شیر مقدار شیر نه تنها بسلامت و قدرت جسمانی مادر بستگی

دستگاه ترشح شیر در ساختمان بدن انسان و سایر حیوانات پستاندار وجود دارد ولی تنها در جنس مونث فعال است اما بطور استثنایی در برخی از حیوانات نظیر خفاش عمل ترشح شیر در جنس نر نیز فعال است و میتواند به جفت خود کم کند . (۱)

مکانیسم ترشح شیر . واحد ترشحی شیر در پستان آلوئول است و هر آلوئول دارای ساختمانی بشرح زیر است .

۱ - مامبران بازآل - ۲ - سلولهای میوایی تلیال - سلولهای ترشحی مطبق (این تلیوم ترشحی) این ساختمان ترشحی و سیله یک سیستم عصبی هورمونی کنترل میگردد . (۹۳ و ۱۵۰)

فعالیت پستانها را میتوان در دورانهای بلوغ ، سیکل ، ماهانه ، حاملگی و پس از زایمان بررسی کرد . در مورد رشد و نمو پستان (۱۵۰) عقیده دارد و معتقد است که حتی در یک نوزاد مونث نوک پستان درشت تراز جنس مذکور است و شروع واقعی رشد و نمو پستان در قبل از بلوغ و بیشتر تحت تاثیر استروژن تخدمانی است ولی هورمون STH هیپوفیزی و کورتیکوئید فوق کلیوی هم موثر هستند ولی بعد از بلوغ ادامه رشد و نمو پستانها علاوه بر هورمونهای فوق تحت تاثیر پرژسترون و پرولاکتین نیز شدت میباشد . بطور کلی استروژن- هورمون سوماتوتrop و کورتیزون باعث رشد و نمو مجاری شیری میشوند در حالیکه پرژسترون و پرولاکتین و کلیکوکورتیکوئیدها باعث رشد و نمو غدد شیری میشوند . علاوه بر رشد و نمو مجاری و غدد این هورمونها باعث تجمع چربی در نسخ پستان شده و بیزگی آن کم میکند . در ضمن حاملگی تمام عوامل یاد

بیماران فوق بسیه گروه غیر مستقیم و درمانهای زیر صورت گرفت .
گروه اول . فقط با استیل بسترونول بشکل دوز ۳ قرص ۵ میلی گرم از روز دوم زایمان بمدت ۶ روز استفاده شد و در صورتی که ترشح شیر باقی بود این درمان با دوز ۱۵ میلی گرم در هفته بعد نیز تکرار شد .

گروه دوم . درمان توان استیل بسترونول ۱۵ میلی گرم و تستو ترونون ۲۵ میلی گرم یک روز در میان تا ۶ روز بکار برده شدو در موارد ادامه ترشح شیر درمان داروئی با استیل بسترونول به تنها (بخارط جلوگیری از عوارض تستو ترونون) در هفته بعد نیز ادامه یافت .

گروه سوم . فقط از پیرو دوکسین بمقدار ۲۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز در هفته اول بعد از زایمان استفاده شد و در مواردی اثر بودن درمان در هفته بعد درمان با دوز ۳۵۰ میلی گرم ۲ بار در روز ادامه یافت و نتیجه درمانی آن بهتر از سایر روشها بوده است .

قرص سه بار در روز بمدت ۶ روز از روز دوم یا سوم زایمان بود تا بتوان مواردی را که خود بخود نقص ترشحی وجود دارد جدا ساخت و در مدت ۶ روز مقدار شیر ترشح شده وضع پستانها را بررسی می کرددند در صورت دردو ناراحتی آنالژیزیک تجویز می شد — در صورت عدم موفقیت یک دوز درمانی دیگر تکرار می شد .

و بدین ترتیب اثراقاطع و سریع پیرو دوکسین در قطع ترشح شیر بدون ناراحتی دیده می شود . گرچه مکانیسم اصلی ویتا مین B6 شناخته نشده است ولی همانطور که آقای Kamberi (3) نشان داد احتمالا افزایش دویامین هیپوتالاموس باعث مهار پرولاکتین ازراه تحریک فاکتور مهار کننده پرولاکتین می شود . با توجه باطلاعات داده شده و مطالعه مقالات فوق که به آنها اشاره شد از ۳ سال قبل بر روی ۱۶۵ مورد در بیمارستانهای خصوصی و عمومی تهران (بنگان حمایت مادران — زایشگاه کورش کبیر) مطالعه ای بشرح زیر انجام گرفت .

این درمان بصورت جدول زیر ارائه می شود .

جدول داروهای داده شده و مقایسه آن

مقدار داروی داده شده در روز	بهبودی نیافته	درصد بهبودی در هفته دوم	درصد بهبودی در هفته اول	تعداد کل بیمار	دارویی داده شده
۱۵ m.g.	۶/۱۲	۱۰/۲	۸۳/۶	۴۹	استیل بسترونول
۱۰ میلی گرم	۱	۱۵	۸۹/۱	۵۵	استیل بسترونول
۲۵ میلی گرم	—	۲	۹۳	۶۱	تستو ترونون
۶۰۰ میلی گرم	—	—	—	—	پیرو دوکسین

گردید .

البته باستی توجه داشت که نتیجه گیری از این مطالعه و مطالعات مشابه در ایران احتیاج به پیگیری بیشتری دارد .

در این بیماران از سایر روش درمانی که سابقاً استفاده می شد وبصورت بستن پستانها و دادان دیورتیک بود استفاده نشد و در صورت شناختن درد در پستانها از مسكن های معمولی استفاده

REFERENCES

- 1) Arthur Guyton Text book of medical physiology 1966
- 2) Gambrell. M.D. AM. J. OB. Gyne. 1971. 110: 838
- 3) Kamberi M.D. Endocrinology 1970 88:1012
- 4) Kase. M.D. AM. J. Ob. gyn 1972 114:3
- 5) Macleod M.D. AM. J. Ob. gym 1970 106:359
- 6) Sherman M.D. AM. J. Ob. gyn 1970 106:818
- 7) Sherman M.D. British Common Wealth 1972 79:654
- 8) Talbert L.M. AM.J.Ob. gyn 1971 110:847
- 9) Traking tor M.D. Journal of Clinical endo crinology 1972 34:306
- 10) T.N.A. Jeffcoate M.D. Principles of gyn. Third edition 1972
- 11) Tyson M.D. AM. J. Ob. gyn 1972 113:14
- 12) Weir M.D. AM. J. Ob. gyn 1971 111:1