

دکتر بهین دخت نویدی کسمائی (باسقی) *

مقدمه

عرض خطر از سال ۱۳۴۶ (۱۸۱۷) و مصرف ۴۴۷۶۰۴۷ دوز واکسن تا سال ۱۳۵۱ که پوششی در حدود ۴۳ درصد جمعیت آسیب پذیر تا این سال را بوجود آورد تعداد مبتلایان با این بیماری و میزان بروز آن در جمعیت در عرض خطر در سطح کشور در طی سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۱ به ترتیب از حدود ۱۳۰۰۰ نفر در سال به ۵۵۰۰ نفر تقلیل یافت و میزان بروز بیماری از ۱۴/۹ در هزار به ۴/۸ در هزار تنزل نمود. (۵ تا ۱۷ و ۲۰۵) که برنامه‌ای موفقیت آمیز بوده است.

در آمریکا استفاده گسترده از واکسن سرخک از سال ۱۹۶۳ موجب کاهش قابل ملاحظه در بروز بیماری سرخک و آنسفالیت سرخکی گردیده است (۲۲) به نحویکه امروزه سرخک در این کشور یک بیماری همگانی نبوده و فقط کودکان مستعد پذیرش بیماری که هنوز مصنوبیت نیافتدان بدان مبتلا می‌شوند (۳۵). باید دانست که برآورده میزان شیوع مصنوبیت نسبت به بیماری در جمعیت مورد هدف در مراحل قبل و بعد از مبارزه، مقیاس بهتری برای ارزشیابی موفقیت برنامه است تا تعداد دوزهای مصرف شده واکسن، زیرا باین وسیله نه تنها میتوان موفقیت کلی برنامه را اندازه گیری نمود، بلکه از این راه تعیین وضع مصنوبیت گروههای مختلف و تعریف جمعیت در عرض خطر امکان پذیر خواهد بود. بعلاوه کارآئی واکسن مصرف شده و مقدار واکسن به هدر رفته نیز روش میگردد (۲۴).

نظرات در مورد ایمن‌سازی علیه سرخک

تجارب سالهای گذشته در کشورهای مختلف نشان داده است که واکسن تهیه شده ازوپروس زنده خفیف شده سرخک بی خطر، ایضی زاو بسیار موثر است (۲۳)، مطالعه دونوع مختلف واکسن تهیه شده ازوپروس زنده سرخک ۱/۲ (بدرجات مختلف خفیف شده) و عوارض ناشی از آن در ایران نیز موید نکات فوق است

. (۲۶)

در کشورهای استوایی و در حال توسعه بیماری سرخک از عوامل مهم مرگ و میرکودکان بشمار می‌آید. علت عدمه آنهم اینست که کودکان این مناطق بطور متوسط در سنین پایین تری از عمر در تماس با ویروس این بیماری قرار دارند در حالیکه در بین کودکان کشورهای پیشرفته و معتدل چنین نیست. در مطالعه ای در ایران نشان داده شده که ۳۵ درصد کودکان ۸ ماهه تا ۲ ساله دارای پادتن علیه سرخک بوده‌اند و این نسبت با سن کودک بتدريج افزایش یافته بطوریکه در سن ۱۲ سالگی به ۸۳ درصد رسیده است. (۲۷ و ۲)

هرچه کودک در سنین پایین تری مبتلى با این بیماری شود خطر مرگ و میرش افزونتر است. خطرابتلا، در کودکان ممالک در حال توسعه از لحظه‌ای شروع می‌شود که سطح پادتن‌های محافظ مادری آنها قوس نزولی طی می‌کند (۳۳). در ایران، قبل از اجرای برنامه ایمن‌سازی علیه سرخک بزرگترین رقم ابتلا، باین بیماری در گروه سنی ۷-۱ ساله و بزرگترین رقم مرگ و میر در فاصله بین یک و دو سالگی گزارش شده است (۳). شدت بیماری سرخک متناسب با توزیع سنی جمعیت، کودکان در جامعه، حداکثر سن بروز بیماری، تراکم جمعیت شرایط بهداشتی محیط، قرارگرفتن در عرض غفونت میکروبی و بالاخره وضع تغذیه تغییر پذیر است. در کشورهای در حال توسعه، سوء تغذیه نقش عمده‌ای را در شدت علائم بیماری و بروز عوارض آن بازی می‌کند (۳۲).

امروزه به یاری واکسن موثر علیه این بیماری بطری موثری میتوان از انتشار بیماری جلوگیری بعمل آورد و حتی آنرا تحت کنترل درآورد. گزارش کشورهای مختلف نشان میدهد که تزریق واکسن سرخک، میزان ابتلا و مرگ و میر آن را بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.

در ایران پساز شروع تزریق واکسن سرخک به کودکان در

و دیگر کودکانی که واکسن غیر فعال دریافت کرده‌اند (۲۵). مطالعه دیگری که در سال ۱۹۷۴ در جریان همه گیری سرخ در یک بخش صنعتی از کاتانیکت امریکا بعمل آمد این نتیجه بدست آمد که تأکید برای تزریق واکسن به کودکان بین سالین ۹ تا ۱۲ ماهگی ضرورتی ندارد زیرا مشاهده شده که حداقل اینمی در مقابل سرخ در کودکانی بوده که تزریق واکسن به آنها پس از یکسالگی بعمل آمده است. ولی در ضمن این توصیه نیز شده است چنانچه در نقاطی شیوع سرخ در شیرخواران فراوان باشد و یا دسترسی بکودکان پس از یکسالگی مشکل باشد، تزریق واکسن در سنین پائین تری انجام شود مشروط بر آنکه بکودکان مزبور پس از یکسالگی تزریق یادآور فراموش نگردد (۲۶).

مطالعاتی که مرکز مبارزه با بیماری‌های واکیر امریکا در ده‌سال اخیر نموده است، سبب غالب ناکفایتی‌های اینمی حاصل از تزریق واکسن، تزریق آن در دوره شیرخواری بوده (موقعی که پادتن‌های مادری ممکنست هنوز موجود باشد) و یا واکسن را پس از حل کردن بطور صحیح در بیچال نگهداری نکرده بودند (۱۹).

بحث و پیشنهادات

دو نوع هدف برای این‌سازی علیه سرخ ذکر شده است (۳۲). ۱- کاهش‌سراحت و انتقال بیماری و در صورت امکان قطع آن. در آمریکا و انگلیس چنین هدفی دنبال می‌شود. برای نیل به چنین هدفی باید برنامه مداومی تنظیم نمود بنحوی که در شدت آن در طول زمان وقفه‌ای حاصل نشود زیرا اگر از شدت مبارزه کاسته گردد میزان بروز سرخ بتدريج بسطح طبیعی خود خواهد برگشت.

۲- حفظ کودکان آسیب پذیر از بیماری تا حداقل تعدادی که مقدور است که یک هدف قابل اجراء و خوبی است.

باید دانست که این سازی سرخ از نظر اقتصادی برنامه گران قيمتی است و اثر دراز مدت آن بستگی به مداومت و پیگیری در اجرای آن دارد. پس از شروع اين برنامه، لازم است که با همان شدت ادامه داده شود و مجاهدت بعمل آيد تا میزان اینمی در سطح بالائي نگاهداری شود. در غیر اين صورت مخارج و مساعی مصرف شده به هدر خواهد رفت. از آنجا که کودکان واکسن تزریق شده در دوران زندگی،

سازمان جهانی بهداشت، پائین ترین سن مناسب برای تزریق واکسن علیه سرخ را ۸ ماهگی و بالاترین آنرا سال دانسته که حداقل بروز بیماری قبل از رسیدن آن سن واقع می‌شود.

سن مطلوب در بین دوزمان فوق قرار دارد که در هر کشور از روی وضع اپیدمیولوژیک محل و با توجه بمنابع آن و برناهه اینمی موجود در آنجا تعیین می‌گردد (۳۲). بطورکلی سازمان جهانی بهداشت سن تزریق واکسن سرخ را بین ۹ ماهگی و ۱۲ ماهگی پس از تولد (۳۱) به همانگونه که در وزارت بهداشت ایران نیز اجرا می‌شود (۱۸) توصیه مینماید.

مادرانی که قبل از بیماری سرخ دچار شده باشند پادتن بیماری را در دوران بارداری به جنین خود منتقل مینمایند. این نوزادان تا مدتی پس از تولد دربرابر بیماری سرخ اینمی دارند.

بررسی که در زایشگاه فرج پهلوی بروزی ۱۵۴ مورد خون مادر و نوزاد هر دو بعمل آمد، در ۷۶ درصد از نمونه‌ها پادتن سرخ مشاهده شد. تیتر این پادتن در ۹۱ درصد موارد در مادر و نوزاد مساوی و در ۹ درصد موارد در نوزاد بیشتر از میزان موجود در مادر بوده است (۱).

تیتر این پادتن پس از تولد بتدریج کاهش می‌یابد و متناسب با این کاهش اینمی کودک نیز در مقابل بیماری از بین می‌رود. تزریق واکسن سرخ در ماههای اول پس از تولد ممکن است بعلت وجود پادتن‌های منتقله‌ها مادر اینمی با دوامی در شیر خوار بوجود نیاورد. علت این ناکفایتی اینمی را پاره‌ای از دانشمندان جلوگیری از تکثیر ویروس واکسن بعلت وجود پادتن در بدن نوزاد میدانند.

در امریکا مشاهده شد که پس از شروع تزریق واکسن سرخ در سال ۱۹۶۳ میزان موارد گزارش شده بیماری بعک تدریجاً رو بکاهش نهاد و این کاهش تا سال ۱۹۶۸ ادامه یافت ولی از سال ۱۹۶۹ این میزان مجدد افزایش یافت. در جستجوی یافتن علت افزایش متوجه شدند که تعدادی از مبتلایان به سرخ را کودکانی تشکیل میدادند که قبل از آنها واکسن تزریق شده بود. از این مطالعه نتیجه گیری شد که دو گروه از کودکان ممکن است احتیاج به تزریق واکسن یادآور داشته باشند، یک دسته آنها یک‌دهه قبل از ۱۱ ماهگی با آنها واکسن تزریق شده است

کنند (۳۳) .

در خاتمه توجه بنکات زیر را توصیه مینماید.

۱- برای سهولت مطالعات اپیدمیولوژیک در آینده ذکر اطلاعات زیر در پرونده کودک بسیار مفید خواهدبود. نام واکسن، کمپانی سازنده واکسن، تاریخ تولید و تاریخ قابل مصرف بودن و شماره سری آن.

۲- در گزارش تعداد بیماران سرخکی توسط دستگاهها مسئول، مبتلایان واکسن تزریق شده بطور جداگانه ثبت و گزارش شوند.

۳- دربروانه دفن تنها به ذکر عوارض بیماری بعنوان علت مرگ بدون قید نام بیماری اصلی اکتفا نشود و حتیا به بیماری اولیه که منجر به آن عارضه گردیده است نیز اشاره شود و در آمارگیری منظور گردد.

۴- موقع نام نویسی دانش آموzan در هنگام ورود به مدرسه تاریخچه کاملی از وضع این سازی آنها گرفته تا کودکان حساس مشخص شده و قبل از ابتلاء به بیماری آنها واکسن تزریق شود.

۵- تجویز توام واکسن سرخکبادیگر واکسنها و یا تزریق همزمان آنها که با صرفهتر بوده و در بسیاری از موارد ضمن حفظ قدرت اثر آنها عوارض سوء را نیز افزایش نمیدهد، مورد توجه قرار گردد. در این زمینه مطالعه‌ای در ایران در مورد تجویز توام واکسن زنده سرخک و فلنج اطفال شده است (۲۷) که توجه آن را توصیه مینماید.

خلاصه

سرخک یکی از عوامل مهم مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه است. خوشبختانه امروزه واکسن موثر بر علیه این بیماری وجود دارد که مصرف صحیح و بدون وقفه آن در جمعیت در معرض خطر، موجبات کنترل بیماری را فراهم می‌سازد. اینک با گذشت هشت سال از شروع تزریق همگانی واکسن سرخک در ایران و با توجه به بروز سرخک در پاره‌ای از کودکان واکسن تزریق شده در نقاط مختلف دنیا و ناکافی بودن اطلاعات و آمار در ایران، لزوم جمع آوری بهتر اطلاعات و انجام یک بررسی دقیق در این زمینه احساس می‌گردد تا بتوان میزان قدرت واکسن تزریق شده و دوام مصونیت حاصل از آن را در کودکان ارزشیابی نمود و میزان بروز سرخک را در کودکان واکسن

تا وقتیکه سرخک در جامه وجوددارد، باوبروس بیماری سرخک در تماس میباشد، سطح پادتن سرم آنها بالا می‌رود. اما اگر تزریق واکسن در سطح کشور عملی شود بعلت کاهش بیماران سرخکی تمام کودکان واکسن تزریق شده باوبروس سرخک به تدریج قطع می‌گردد لذا احتمال پائین آمدن تدریجی تیتر پادتن وجوددارد و از این جهت ارزشیابی مداوم تیتر پادتن ضروری است.

اینک که حدود هشت سال از شروع تزریق همگانی واکسن سرخک در ایران میگذرد مشاهده بیماری سرخک در پاره‌ای از کودکانی که قبل از آنها واکسن تزریق شده است (۲۹ و ۲۵-۲۱) توجه بنکات زیر را ایجاب میکند. چگونگی اینمی در افرادی که آنها واکسن تزریق شده و در حد تزریق شدگان هم چنین کفايت قدرت واکسن مورداستفاده و دوام ناشی از آن بنکات فوق اهمیت لزوم انجام یک بررسی کلی در سطح کشور را نشان میدهد تا کارآئی واکسن و وضع اینمی افراد واکسن تزریق شده در سنین پیش از یکسالگی و پس از آن تعیین گردد. نتیجه حاصل از این بررسی میتواند راهنمای خوبی در مورد لزوم تغییر سن شروع تزریق واکسن سرخک، ضرورت تزریق واکسن یادآور و زمان آن باشد.

با انجام مطالعه سرولوژیک و اپیدمیولوژیک و توجه بشرایط بهداشت محیط شاید ضروری باشد که در مناطق شهری در سن شروع تزریق واکسن تجدیدنظر شود ولی در مناطق روستایی با در نظر گرفتن تراکم جمعیت در واحدهای سکونی و ترکیب سنی جمعیت شرایط بهداشتی محیط، قرار گرفتن در معرض عفونتها میکری، سوئغذیه و اشکال دسترسی بکودکان پس از یکسالگی، شاید تغییر سیاست موجود از طریق تزریق یادآور بیشتر به صلاح باشد تا به تاخیر اند اختن تزریق واکسن سرخک از سن ۹ ماهگی به سن یکسالگی به بعد. حتی بسیاری از کارشناسان در مبارزات صحرائی شروع تزریق واکسن را از سن ۶ ماهگی ذکر نموده و توصیه کرده‌اند که به هر محل دوبار در سال بمدت نامحدود برای تزریق واکسن مراجعت شود و به کودکانی که در سنین قبل از ۹ ماهگی (که ممکنست پادتن های مادری آنها اثر اینمی بخش واکسن را خفیف نمایند) آنها واکسن تزریق شده است، مجدد تزریق یادآور بعمل آید. این کارشناسان حداقل سن تزریق واکسن را در این مبارزات ۳ سالگی ذکر می

شده‌اند مقایسه نمود تا بتوان در مورد تغییر سن شروع تزریق ۱ واکسن سرخک ضرورت تزریق واکسن یادآور و زمان تزریق آن تصمیم مقتضی اتخاذ کرد.

منابع و مأخذ

- ۱۰- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار موارد بیماری‌های کل کشور براساس طبقه بندی بین المللی ۱۵۵ علت بیماری در سه ماهه دوم سال ۱۳۴۹" نشریه شماره ۱۶۲، شهریور ماه ۱۳۵۵
- ۱۱- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار موارد بیماری‌های کل کشور براساس طبقه بندی بین المللی ۱۵۵ علت بیماری در ششم‌ماهه دوم سال ۱۳۴۹" نشریه شماره ۱۶۵ آبانماه ۱۳۵۵
- ۱۲- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار بیماری واگیر کل کشور در سال ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵" نشریه شماره ۱۶۳ شهریور ماه ۱۳۵۵
- ۱۳- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها، آمار بیماری‌های بر حسب گروههای سنی در چند منطقه کشور در سال ۱۳۴۹ نشریه شماره ۱۷۲
- ۱۴- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها، گزارش سالانه بیماری‌ها در ایران در سال ۱۳۵۵" نشریه شماره ۱۷۸، دی ماه ۱۳۵۱
- ۱۵- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار بیماری‌ها بر حسب گروههای سنی در چند منطقه کشور در سال ۱۳۵۵" نشریه شماره ۱۸۰، خرداد ماه ۱۳۵۱
- ۱۶- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "گزارش - اقدامات و فعالیتهای بهداشتی و درمانی انجام شده در سراسر کشور از بهمن سال ۱۳۴۲ تا بهمن سال ۱۳۵۱" ۱۳۵۲-۱۳۵۱
- ۱۷- وزارت بهداشت - سازمان سپاه بهداشت "بررسی همه گیری شناسی بیماری سرخک در سطح روستاهای کشور در حوزه عملیاتی گروههای سپاه بهداشت در سالهای ۱۳۴۷-۴۶-۴۵" ۱۳۴۷
- ۱۸- وزارت بهداشت - بهداشت و تنظیم خانواده "راهنمای واکسیناسیون کودکان" نشریه اداره کل بهداشت مادران و کودکان وزارت بهداشت، اسفندماه ۱۳۴۹

تزریق شده تعیین و تبیین پادتن کودکانیکه قبل از یکسالگی به آنها واکسن تزریق شده با آنها یکه بعد از یکسالگی تزریق

- ۱- سعیدی، س و بهرامی، گ، انتقال آنتی کورهای ویروسی از مادر به جنین از راه پلاسانتا مجله داشکده پزشکی تهران، سال بیست و نهم، شماره پنجم، صفحه ۲۲۰
- ۲- سعیدی، س و نفیسی، ک "توزیع سنی سرخک و سرچه در کودکان تهران" مجله طب عمومی سال دهم - صفحه ۵۵
- ۳- منطقی، ا. "سرخک و تطور اپیدمیولوژی آن در ایران" واکسیناسیون در ایران "مجله بهداشت ایران سال اول - شماره اول - صفحه ۴۲-۵۵ ۱۳۵۱
- ۴- نفیسی، ک، مفیدی، ش و ناطق، "بررسی کوتاهی از آخرین اطلاعات درباره انتیولزی - آسیب شناسی - کلینیک درمان - پیشگیری و واکسیناسیون سرخک" نسخن پزشکی - شماره نهم - دوره پنجم - صفحه ۲۴۸-۲۱۵، ۱۳۴۴
- ۵- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "بررسی مقدماتی همه‌گیری شناسی سرخک در سال ۱۳۴۵ در ایران" نشریه شماره ۹۸، ۱۳۴۶
- ۶- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار بیماری‌ها و اگیر کل کشور در سال ۱۳۴۶" نشریه شماره ۱۱۹
- ۷- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار بیماری‌ها و اگیر کل کشور در سال ۱۳۴۷" نشریه شماره ۱۳۶، اسفندماه ۱۳۴۸
- ۸- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار بیماری‌ها و اگیر کل کشور در سال ۱۳۴۸" نشریه شماره ۱۵۱، آبانماه ۱۳۴۹
- ۹- وزارت بهداشت - اداره کل آمار و بررسیها "آمار موارد بیماری‌های کل کشور براساس طبقه بندی بین المللی ۱۵۵ علت بیماری درسه ماهه اول سال ۱۳۴۹" نشریه شماره ۱۵۶، دی ماه ۱۳۴۹

- 19- Edsall, G. "Adequate Records of Vaccination (Cont.)" The New Engl. J. Med. Vol. 293; 611, Sept. 18, 1975.
- 20- Faghīgh, M.A. "Cost benefit analysis of Mass Vaccination Programs exemplified by measles Vaccination in Iran" Iranian J Public Health, 2, 175, 1974.
- 21- Fraikor A.L. "Adequate Records For Vaccination" The New Engl. J. of Med. Vol. 293, 201, July 24, 1975.
- 22- Horwitz, O. Grunfeld K. Lysgaard-Hansen B. "The epidemiology and natural history of measles in Denmark" Am. J. Epidemiol 100: 136-149, 1974.
- 23- Krugman, Saul "Vaccination against communicable Diseases Am. J. Dis. Chil. 126: 406, 1973.
- 24- Landrigan, Philip J., Navarro Rivas, E. Eddins, D.L. "Epidemiologic Assessment of a Nation wide Multiple Antigen Vaccine Campaign" Environmental Child Health, 20: 133-140, 1974.
- 25- Linnemann, C.C. Jr., "Measles vaccine: Immunity, reinfection and revaccination", Am. J. Epid Vol. 97: No. 6, PP 365-371, June 1973.
- 26- Naficy, K., Saidi S., Nategh, R. Mostatab, A. and Akbarshahy, E. "Comparative Study of live attenuated and further attenuated measles vaccines in rural area of Iran". Arch Gesamte Viru-forsch, Vol. 22, Nos. 1-2, 11-22, 1967.
- 27- Naficy, K. and Saidi, S. "Serological survey on viral antibodies in Iran" Trop. Geog. Med. Vol. 22: PP 183-188, 1970.
- 28- Naficy, K. and Nategh, R. "Measles Vaccine and its use in Developing countries" Advances in virus Research Vol. 17, PP 279-294, 1972.
- 29- Schlusderberg, A, Lamm, S.H., Landrigan, P.J., and Black, F.L. "Measles immunity in children vaccinated before one year of age" Am. J. epid, Vol. 97: No. 6, PP 402-409, 1973.
- 30- Witte, John J. "The epidemiology and control of Measles" Am. J. Epidemiol 100: 77-78, 1974.
- 31- W.H.O. Chronicle "Immunization programmes" Vol 27: No. 2, PP. 66-69, Feb. 1973.
- 32- W.H.O. Chronicle "Measles vaccination" Vol. 27: No. 2, PP. 101-102, March 1973.
- 33- World Health Notes. The practitioner 215: 409, 1975.