

## سینیمای بیماریهای کلیوی در ایران یافته‌های کالبدگشائی

دکتر کمال الدین آرمین\*

در کشور ما شیوع دارد بخوبی آشنا شوند. امروز ناهمجاريهای موجود در کلیه تشخیص داده و درمان می‌شود [۵] از آنجاییکه اصولاً کار و ساختمان هرسیستم بیولوژیک بهم ارتباط دارد، در بیماریهای حاد یا مزمن کلیه هم که تعدادی نفرون از بین میرود کار ترشحی کلیه‌ها دستخوش اختلال می‌شود و سرانجام وضع شیمیائی خون تغییر می‌کند [۶] در طبقه بندی و تشخیص بسیاری از بیماریهای کلیوی مرتكب اشتباهاتی می‌شوند زیرا اتیولوژی غالباً آنها را نمی‌شناسیم و اصطلاحاتی را که متخصصین بالینی و آسیب‌شناسی بکار می‌برند یک‌جور نیست. اصطلاحات نفریت- نفروز- نفریت نفرو- حاد- تحت حاد و مزمن که ما متخصصین بیماریهای کلیوی بکار می‌بریم باهم فرق دارند، زیرا که تغییرات پاتولوژیک که ناشی از یک عده زیادی از بیماریهای کلیوی می‌شود مشابه است. کما اینکه عملای می‌بینیم در نمونه‌های بیوپسی کلیه در گرفتاران بسترد نفروتیک، لوپوس اریتماتوز دیسمینه - گلومرولوفریت حاد پس از عفونت حاد با استرپتوکوک لاکلی در مرحله پیشتره از نظر آسیب‌شناسی بهم مشابه هستند در صورتیکه از نظر بالینی باهم اختلاف فاحش دارند.

در ایران هنوز آماری صحیح و قابل اطمینان وجه دندارد که روشنگر وضع و چگونگی بیماریهای کلیه و مرگ و میر ناشی از آن باشد و از این رو به تنظیم گزارش کالبدگشائی که حکایت از چگونگی وضع، فوروشیوع بیماریهای کلیوی در کشور عزیزان می‌کند مبادرت ورزیده است.

**مقدمه و تعریف :**  
بیماریهای کلیوی یکی از مهمترین بیماریهای دهگانه است که سبب مرگ و میر بشر امروزی می‌شود [۱]، [۲] . مطالعه کلیه از نظر آسیب‌شناسی و بیماری‌شناسی برای مایزشکان بسیار بغرنج و پیچیده است زیرا:

- انواع و اقسام بیماریهای کلیوی علائمی مشابه در بیمار بوجود می‌آورد و در کلیه ضایعات کلیوی هم سرانجام وضع شیمیائی خون و نیز بازده ادراری تغییر می‌آید.
- مشکل بزرگ‌ما در تشخیص بیماریهای کلیوی بیشتر از این ناشی می‌شود که ما معمولاً در مراحل آخر بیماری بافت کلیوی دست می‌یابیم [۳] و آنچه که امروز بهترین وسیله تشخیص بیماریهای کلیوی ارزش و شروع بیماری می‌باشد (یعنی پونکسیون کلیه) هنوز در اختیار کلیه پزشکان که در مناطق مختلف کشور به ایفای وظیفه مشغول هستند قرار نگرفته است.

قدرت مسلم آنست که کلیه‌ها نیز همانند سایر بافت‌های دیگر جوابگو بازاری است که بدان میرسد و از خود و اکتشهائی بروز میدهد. در آماں حاد کلیه مانند سایر بافت‌های دیگر تجمع سولوهای پولی نوکلر و در آماں‌های مزمن آن اسکار و تخریب بافتی می‌بینیم [۴] . امروز بخوبی میدانیم که عفونت دستگاه ادراری با یابدون علامت بالینی خطرزیادی دارد زیرا بعدم کفایت کلیه و مرگ و میر منجر می‌شود. البته این وضعیت در جاهائی که از روی اساس صحیح و درمان متناسبی بمبارزه با این بیماریها می‌شتابند شاید مشکلی نباشد ولی باید اعتراف کنیم که برای ما هنوز مشکل و معماهی است و همکاران باید بدان دقت بیشتری نمایند و بحقیقت و چگونگی بیماریهای کلیوی آنطور که

\* استاد آسیب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

**جدول ۳ - وفور و شیوع اشکال مختلف آسیب‌های کلیوی در ۸۴۷ مورد از ۴۶۳ اتوپسی**

تعداد	نوع آسیب
۲۸۲	پی‌یلو‌نفریت‌ها
۱۶۵	آسیب‌های کلیوی (درسل)
۱۱۲	بیماریهای عروقی
۱۰۱	گلومرولونفریت‌ها
۴۵	آسیب‌های کلیوی در اندوکاردیت و رماتیسم
۳۰	نفرورزایی تلیال
۲۸	آمیلوبئدوز (بدون سل)
۲۸	سوء تشکیلات جنبی
۲۰	دیابت (بدون سل)
۱۳	تومورها
۱۰	سپتی‌سمی
۸	توکسمی آبسنتی
۵	کلیه می‌یلومی
۸۴۷	جمع

**گلومرولونفریت :**

اصطلاح گلومرولونفریت برای آن ضایعاتی بکار برده شده که مفترض و از ابتدا در گلومرونها متمن کرده است، اتیولوژی اغلب اشکال مختلف این گروه بیماری‌ها [۷] هنوز روشن نیست. ولی پرا واضح است که بعضی از اشکال آن مربوط به جواب این‌منی اشخاص مستعد می‌باشد. گمان می‌کنم همان مشکلی که برای روشن شدن علت گلومرولونفریت‌ها در همه جای دنیا است در کشور ما هم وجود دارد منتهی با یک گسترش و ضریب بزرگ نمائی بیشتری زیرا که:

۱ - شرح حال بیماران و سابقه بیماری آنها آنطور که شاید و باید روشن نیست که بتوان مورد استفاده و قضاوت قرارداد.

۲ - بی‌گیری بیماران هم در اکثر موارد که منجر به اتوپسی شده آنچنان که شاید و باید انجام نگرفته است.

**مصالحح کار و طرق مطالعه :**

برای مطالعه سیمای وفور و شیوع بیماریهای کلیه و نقشی را که در مرگ و میردار گزارش‌های ۴۶۳ کالبدگشائی که در یین پانزده سال اخیر در بیمارستان‌های تابعه دانشکده انجام گرفته مجددآ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این بیمارستان‌ها بیمارانی بستری می‌شوند که اکثر آن‌ها گزارش و دهقان هستند و از نقاط مختلف کشور می‌آیند. در این گزارش سعی شده است که با درنظر گرفتن علائم بالینی و بافتی‌های آزمایشگاهی و سوابق بیماری ضایعات آسیب‌شناصی تجزیه و تحلیل چگونگی پیشرفت ضایعات بررسی گردد. رنک آمیزی‌های اختصاصی که در این مطالعه بکار برده شده است عبارت است از: ۱ - هماتوکسیلین ائوزین . ۲ - آنی‌لین بلو (anilin blue) برای تشخیص واضح مامبرانهای بازال گلومرولها. ۳ - پاس (PAS) (مامبران بازال گلومرول‌ها را بررنک قرمز بنفش در می‌آورد و گلیکوژن را در داخل اپی‌تلیوم لوله‌های ادراری نشان میدهد)

قدر مسلم آن است آنچه را که معرفی می‌شود کاری تازه و یا اصلی نمی‌باشد بلکه مجموعه‌ای است از آنچه دیگران گفته‌اند و پنداشته‌اند و برای روشن شدن وضع بیماریهای کلیوی در کشور خودمان از آن منابع استفاده شده است.

چنانکه در جدول (۱) مشاهده می‌شود از ۴۶۳ کالبد گشایی که در این ۱۵ ساله اخیر انجام گرفته ، ۸۴۷ مورد بیماریهای کلیوی موجود در مرک بیماران نقش اساسی داشته است. وفور و شیوع بیماریهای مختلف کلیوی نیز در جدول ۲ مستخخص می‌باشد.

**جدول ۱ - وفور و شیوع آسیب‌های کلیوی در ۴۶۳ کالبدشکافی**

ردیف نحوه ردیف	آسیب‌های کلیوی	عدد کالبدشکافی		گروه سنی
		زن	اولد	
۷۰۷	۲۴۰	۴۶	۲۱۶۵	از ۱۴ سال به پائین
۱۴۰	۵۰	۹۰	۲۲۹۸	از ۱۴ سال به بالا
۸۴۷	۲۹۰	۵۵۷	۴۴۶۳	مجموع

نوع استرپتوکوک نیووده است و بیماری را بعلت عفونت‌های پنموکوسیک- آندوکاردیت باکتریال و حتی روماتیسم و سل هم گزارش داده‌اند.

**گلومرولونفریت پرولیفراتیو** - چنانکه در جدول ۳ مشاهده می‌شود، گلومرولونفریت پرولیفراتیو در کودکان و سالمندان مشاهده شده است.

این نوع گلومرولونفریت معمولاً [۱۲، ۷] در کودکان پس از عفونت با استرپتوکوک همولی‌تیک بتا گروه A پیدا می‌شود و در بیمارساقله درد گلو. او تیت میانی- آذنیت سرویکال وجوددارد و در این گزارش نیز چون بندرت در پرونده بیماران جواب‌کشت مشتبی بچشم می‌خورد درد گلو و او تیت و آذنیت سرویکال موجود را وابسته به عفونت استرپتوکوک قبلی بشمار آورده است. این نوع گلومرولونفریت معمولاً پس از دیگر مرحله کوتاهی در حدود ۲ الی ۳ هفته و گاهی هم بیشتر که از عفونت با استرپتوکوک بگذرد پیدید می‌آید [۱۱] اگرچه اختلاف در میکهای تشخیص دوره پی‌گیری بیمار ارزشیابی عاقبت این بیماری را دشوار می‌سازد ولی قدر مسلم آن است که اغلب بیماران بادرمان یا بدون درمان بهبود می‌یابند و در حدود ۳ درصد کودکان با این بیماری می‌میرند و ۳ درصد هم بیماریشان به ازمان می‌گراید.

هر قدر که سن کودک زیاد می‌شود [۱۰، ۹] احتمال ابتلاء او به بیماری کاهش می‌یابد و شاید هم علت اینکه در کودکان پیش از رفتن به مدرسه زیادتر دیده می‌شود این است که این اطفال هنوز تجربه کافی نیامده اند که چطور در مقابل استرپتوکوک باید از خود دفاع کنند و از این‌رو نمی‌توانند بسرعت از آثار ویرکت این‌شناختی بهره‌مند گردند و با گذشت زمان کم کم نسبت به دین ارگانیسم این‌می‌بینند. از آنجاکه اغلب این بیماران از این بیماری رهایی می‌یابند شناس مطالعه آن دریافت‌های اتوپسی بسیار کم است و اگر هم بیماری منجر به مرگ گردد طبیعتاً باید مرحله را گذرانده باشد و از این‌رو در این گزارشها اغلب با صطلاح گلومرولونفریت تحت حاد نامیده شده‌اند. و فرور شیوع گلومرولونفریت پرولیفراتیو حادیات تحت حاد بر حسب جنس و سن و سابقه بیماری در کودکان و سالمندان در جدولهای ۴ و ۵ مشخص است.

پس با در نظر گرفتن این دو حقیقت نباید انتظار داشت آنچه که از نظر خوانندگان می‌گذرد روشنگر علت این گروه بیماریها باشد ولی کوشش شده است که این بیماری با خایرات دیگری که ممکن‌باشد بر آن قدمت داشته در کالبدگشائی مورد توجه قرار گیرد و یک جا تجزیه و تحلیل شود [۸]. طرز شروع و سیر این گروه بیماری در کودک و سالمند یکسان نیست و پیش- آگهی بیماران در کودک بهتر است. شاید هم در کودکان سهل‌تر بتوان بوجود سرشت و چگونگی سیر بیماری پی‌بردی را که برخلاف سالمندان بندرت به آتریو اسکلروز و هی‌پر تانسیون گرفتار می‌باشد. اگرچه اصولاً خیلی از محققین معتقد هستند که ماهیت و چگونگی گلومرولونفریت حاد در کودکان و سالمندان متشابه است ولی قدر مسلم آن است که گذشته و سابقه و عاقبت بیماری در این دو گروه تفاوت دارد.

عملای می‌بینیم که وفور و شیوع گلومرولونفریت‌های حاد در گزارش‌های مختلف متفاوت است و این کیفیت شاید بستگی داشته باشد به ظرفیت نفری توژنیک انواع و اقسام استرپتوکوک‌های همولی‌تیک بتا گروه A و مردمی که تحت بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.

ایولوژی این بیماری در غالب موارد روشن نیست و در خیلی از گزارش‌ها هم می‌بینیم که کلیه و ادرار هیچ‌یک حاوی این

### جدول ۳- وفور و شیوع اشکال مختلف گلومرولونفریت‌ها

بر حسب جنس و گروه سنی

ردیف	گروه سنی				اشکال مختلف گلومرولونفریت‌ها	
	از ۰ تا ۱۴ سال به بالا		از ۱۵ تا ۴۰ سال به بالا			
	زن	مرد	زن	مرد		
۵۸	۸	۴۵	۲	۳	گلومرولونفریت مزمن	
۱۱	۳	۶	-	۲	گلومرولونفریت حاد	
۱۸	۳	۹	۴	۲	گلومرولونفریت تحت حاد	
۱۱	۱	۵	۲	۳	گلومرولونفریت مامبرانوز	
۲	-	۲	-	-	پورپورا روماتوئید	
۱	-	۱	-	-	لوپوس اریتماتوزدیسمینه	
۱۰۱	مجموع					

شرانجام با توپسی منجر شده است تغییرات اضافی دیگری هم دیده شده است. بدین معنی که سلوهای اپی تلیال هم پرولیفراسیون یافته و در فضای بوم توده سلوهای اپی تلیال دیده می شود و هالهای ویژه جلب توجه می نماید. باید گفت که این تغییرات بیشتر در سالمدان دیده می شود و از خصوصیت آن تدریجی بودن بیماری میباشد. در این موارد علاوه بر تغییرات گلومرولی افیلتر اسیون لوکوسیت ها اغلب در بافت انترستی سیل مشاهده میگردد. لولهای پیچایی پروکسیمال اغلب گلوبولهای قرمز در بردارند و لولهای گردآورند و رگهای خونی اغلب آزاری ندارند. اگرچه در مواردی که مرض بطول انجامد ممکن است بعلت فشارخون موجود تغییرات ثانویه در رگها دیده شود. گاهی بعلت خیزفر او ان گلومرولو نفریت را، گلومرولو نفریت اکسوداتیو دیفووز می نامند، در این موارد مخصوصاً گلوبولهای سفید در کلافه های گلومرولر موجود است.

گلومرولو نفریت هم را زیک دیفووز حاد موقعی پدیده می آید که بیشتر کاپیلرهای گلومرولی پاره شده باشند و در نتیجه گلوبولهای قرمز زیادی خارج و سبب بروز پتشی در سطح کورتیکال می شود. گلومرولو نفریت نکروززا در مواردی که در گلومرول نکروز بوجود آید پدید می آید. در مواردی که سلوهای اپی تلیال بیشتر تکثیر یافته باشد گلومرولو نفریت را اکسترا کاپیلر و چون سلوهای آندوتلیال بیشتر زیاد شده باشد انترا کاپیلر می نامند. بدیهی است در این حالت اخیر دیگر هلالی وجود ندارد.

**۹** در ۹ مورد بیماران این گروه به سندرم نفروتیک گرفتار بوده و پرتوئین اوری شدید بالاتر از ۴ گرم، هی پوپرتوئین امی - خیزوهی پرلی پمی داشته اند. در این نوع گلومرولو نفریت که با سندرم نفروتیک همراه است مامبران بازال کلفت می شود. بطور کلی در این موارد پرولیفراسیون اپی تلیال - آندوتلیال و کلفتی مامبران بازال دیده می شود.

**۱۰** گلومرولو نفریت مامبرانو زد ره سنی - بر عکس گلومرولو نفریت حاد که مخصوصاً کودکانی که هنوز بمدرسه نرفته اند میباشد گلو - مرو لونفریت مامبرانو زد ره سنی دیده می شود. شروع شیوه سر و صدا و اغلب با ادم همراه است. از خصوصیت گلومرول نفریت مامبرانو زد ره سنی پنهانی پودوسیت ها و کلتی مامبران بازال می باشد. متنه با میکرسكپ معمولی نمیتوان بهم پیوستن پاهای پودوسیت را مشاهده کرد. گلومرولو نفریت مامبرانو زد ره سنی کی از عمل شایع سندرم نفروتیک می باشد و در بیماران گرفتار علائم پرتوئین اوری بیش از ۴ گرم - هیپوپرتوئین - امی آدم آمازارک - هی پرلی پمی مخصوصاً هی پر کلسیترو لسمی لی پیدا اوری پدیده می آید.

#### جدول ۴- وفور و شیوع گلومرولو نفریت حاد و تحت حاد

بر حسب سابقه بیماری در کودکان

نوع بیماری	عدد	نوع بیماری	عدد	مجموع
بیماریهای حاد	۷	سندرم نفروتیک	۱	۸
گلودرد	۳	لیشمانيوز ویسرا	۱	۴
مجموع	۱۳			

#### جدول ۵- وفور و شیوع گلومرولو نفریت حاد و تحت حاد بر حسب

سابقه بیماری در بزرگسالان

نوع بیماری	عدد	نوع بیماری	عدد	مجموع
نامشخص	۱۱	گلودرد	۳	۱۴
سندرم نفروتیک	۷	پورپورا روماتوئید	۲	۹
بیماریهای حاد	۵	لوکوزhad	۱	۶
چرکی ریه		لوپوس اریتماتوز	۱	۱
دیسمنه				۳۰

در مواردی که منجر به اتوپسی شده است کلیه یا طبیعی و یا کمی بزرگتر از طبیعی و بطور متوسط در حدود ۱۸۵ گرم وزن دارد. سطح کورتیکال صاف و عاری از اسکار و در اثر پاره شدن کاپیلرهای گلومرولی نقاط پتشی ریزی موجود و سطح منقطع پارانشیم قدری برآمده و کورتکس و مدلول از هم متمايز است [۱۳-۱۴-۱۵] تغییرات بافتی مختلف و بطور کلی کلافه های گلومرولی پرسلوی یعنی سلوهای آندوتلیال و اپی تلیال داخل کلافه های گلومرولی افزایش می یابد و در آن سلوهای پولی - نوکلئر گردمی آیند. بدیهی است که درجه پرسلوی (هی پرسلو - لاریته) از یک بیمار تا بیمار دیگر و در یک شخص از یک گلومرول تا یک گلومرول دیگر فرق می کند.

در مواردی که هی پرسلو لاریته زیاد باشد و یا آنکه سلوهای متورم باشند به موی رگهای گلومرولی فشار وارد می آید و در نتیجه گلومرولهای خون می ماند.

در این گزارش چون وضع بیماری طوری بوده است که

نفریت مزمن از یک گلومرولونفریت حاد بوجود می‌آید ولی با آنچه که در این بررسی مشاهده شده است از انتیولوژی صحیح آنچه که بررسی شده اطلاعی بدست نیامده و نمیتوانیم بطور صریح اظهار بداریم که بچه میزان گلومرولونفریت حاد به مزمن می‌گراید. در سری ما از ۸۴۷ مورد که در کالبدگشائی آسیب کلیوی مشاهده گردیده است ۵۸ مورد گلومرولونفریت مزمن در کودکان و سالمندان مشاهده گردیده است و در ۱۰ مورد یعنی ۲۱ درصد بیماران به اولین علامت کلیوی خویش پس از ۵ سالگی توجه کرده اند. فور و شیوع گلومرولونفریت از ۳۵ سال پائین نیز ۲۹ نفر (۵۰ درصد) و از ۳۰ تا ۵ سالگی ۱۹ مورد (۳۲ درصد) بوده است. نمای ماکروسکوپی کلیه - نمای ماکروسکوپیک کلیه در گلومرولو- نفریت مزمن بستگی دارد به مرحله پیشرفت بیماری. در مرحله که بیماری هنوز کامل پیشرفت نکرده کلیه ممکن است دان دان و رنگ پریده (شاید بعلت خیز و استحاله چربی لوله‌های ادراری) و کمی مچاله و وزن آن در حدود ۱۱۰ گرم باشد. با گذشت زمان و پیشرفت بیماری کلیه‌ها بطور قرینه منقبض و گرانولهای منتشر و ظرفی پیدا می‌کنند. وزن آن در حدود ۹۰-۸۰ گرم می‌شود. کپسول آسانی ریش ریش می‌شود. نشانی اصلی آسیب شناسی در گلومرولونفریت مزمن هی پرسلولاریته پیشرفتی گلومرولها و اسکار فیبروز کلافه‌های گلومرولی می‌باشد که گاهی ممکن است بقدرتی پیشرفتی باشد که جای گلومرول را بافت کولازن یا هی یالن بگیرد و فضاهای گلومرولی چسبندگی پیدا کند و یا آنکه بکلی مسدود شود. اغلب در این موارد دور تا دور گلومرول یک حلقه بافت فیبروز می‌شود. پس با آنچه یاد شد بین نتیجه‌های رسیم که گلومرولونفریت مزمن ممکن است مرحله نهائی انواع و اقسام بیماریهای کلیوی حاد و تحت حاد باشد. در خیلی از موارد بدون آنکه سابقه بیماری وجود داشته باشد بطور بی سرو صدا این ضایعه پیش می‌آید.

از ۵۸ مورد گلومرولونفریت مزمن که در کالبدگشائی تشخیص داده شده است ۱۴ درصد در اولین آزمایش خیز و در ۳۲ درصد فشارخون و در ۱۴ درصد حالت اغما دیده شده است. گلومرولو اسکلروزندولر - این ضایعه که به گلومرولو- اسکلروزندولر دیابتی نیز موسوم است [۱۸] در ۵۵ درصد دیابتی‌های مورد بررسی در این گزارش وجود داشته است. قدر مسلم آن است و قتی که دیابت را تشخیص میدهیم قطعاً ضایعاتی در کلیه وجود دارد و گلومرولو اسکلروزندولر را از علائم ویژه دیابت می‌پنداشند [۱۹-۲۰-۲۱] از خصوصیت بافت شناسی

بدیهی است که سندروم نفروتیک چنانچه در جدول [۶] مشاهده می‌شود بعله دیگری هم غیر از گلومرولونفریت حاد و مamber انوز مشاهده گردیده است.

#### جدول ۶- فور و شیوع سندروم نفروتیک در بیماریهای مختلف کلیه

نوع بیماری	گروه سنی			
	از ۱۶ سال به بالا		از ۱۶ سال به پائین	
	زن	مرد	زن	مرد
سل	۶	۳	-	۲
گلومرولونفریت حاد و تحت حاد	۶	۱	-	۲
آمیلوئیدوز (بدون سل)	۲	۴	-	-
گلومرولونفریت مزمن	۴	-	۱	۱
بی‌بلو نفریت مزمن	۲	-	۱	-
بی‌بلو نفریت حاد	۱	-	-	-
مجموع	۳۵	۱۱	۹	۶

گاهی گلومرولونفریت پرولیفرا تیو با مamber انوز همراه است و آنچه در این موارد جلب توجه می‌کند عبارت است از:

- ۱- هی پرپلازی سلولهای مزانژیال
- ۲- تهاجم استطاله (پروسسوس) های سیتوپلاسمی سلولهای مزانژیال به مamber ان باز آل کاپیلرهای محیطی [۱۶]
- ۳- افزایش سلولهای آندوتیال
- ۴- کلفتی مamber ان باز آل بطر و فو کال

۵- هیجوم سلولهای پولی نوکلئر در کلافه‌های گلومرولی. گلومرولونفریت مamber انوز بیماری است عود کننده، مزمن که چون پیشرفت کند تورم سلولهای اپیتیال و آندوتیال بیش از پیش شدت می‌یابد و مamber ان باز آل کلفت و نامرتب تر می‌شود. گلومرولها بدون رگ می‌گردد و بعلاوه شباخت کاملی به مرحله پیشرفتی گلومرولونفریت پرولیفرا تیو پیدامی کند ولی در هر حال در گلومرولونفریت مamber انوز هی پرسلولاریته کلافه‌های گلومرولی هیچگونه چسبندگی ایجاد نمی‌کند.

گلومرولونفریت مزمن - حساب گلومرولونفریت مزمن از سایر گلومرولونفریت‌های دیگر جدا است [۱۷] [۱۸] اگرچه خیلی از محققین عقیده دارند که اگر تمام گلومرولونفریت‌های مزمن از یک گلومرولونفریت مادرانشی نباشد لااقل در خیلی موارد گلومرولو-

**آمیلوئیدوز کلیوی** – چنانکه در جدول ۷ مشاهده می‌شود  
ضایعات اولیه که در این گزارش در پیدا شدن آمیلوئیدوز نقش مهمی  
داشته است عبارت است از:

سل. بیماریهای غیرسلی ریه. استئومیلیت-می‌یلوم -  
کولیت اولسراتیو - آمی‌بیاز. جذام - سیفیلیس (۶۴ مورد). این  
آمار بخوبی نشان می‌دهد که تاچه حد هنوز ما باید در مبارزه  
با بیماری سل بکوشیم و آنرا جدی بگیریم و دیگر آنکه امکان  
آمیلوئیدوز در کولیت اولسراتیو و آمی‌بیاز را بیان می‌دارد.

### ضایعات دیگر گلومرولی

کلیه در اغلب از بیماریهای کلاژن [۲۴ و ۲۵] من جمله  
ارتریت روماتوئید گرفتار می‌شود و در بعضی از این گروه بیماران  
علت [۲۶ و ۲۷] مرگ بیمار ضایعه کلیوی او می‌باشد. در این  
سری، عده موادر آرتریت روماتوئید دوموردو لوپوس اریتماتوز  
دیسمینه یک مورد بوده است.

در لوپوس اریتماتوز گلومرولها متتحمل تغییرات بافتی  
زیر می‌شود:

۱- پرولیفراسیون اندوتیال ۲- ضخامت مامبران بازال  
۳- رسوب ماده فیبرینوئید بین مامبران بازال و سلسه‌های  
آندوتیال مدخل مؤین رگها و بالاخره ۴- اسیدوز توپولو

[۲۷-۲۹-۳۰-۳۱].

**اکلامپسی**- یکی دیگر از ضایعات گلومرول که در  
این گزارش جلب توجه می‌کند مسمومیت حاملگی می‌باشد که  
۸ مورد مشاهده شده است. بطور کلی باید دانست که مسمومیت  
حاملگی (توکسمی گراویدیک) یک سیمای تشریحی خاص و

گلومرولو اسکلروز ندوار این است که:

۱- مامبران بازال در موئین رگهای گلومرولی کلفت تراز  
عادی است.

۲- در داخل کلافهای موئین رگی گلومرول توده‌های  
هی بالن گوی مانندی رسوب می‌کند و بنظر میرسد که این ندوارها  
بین کاپیلرهای ارمه‌گیر دوازین رواست که بنام گلومرولو اسکلروز  
انتر کاپیلر خوانده می‌شود [۲۲، ۲۳].

**گلومرولو نفریت فوکال آمبولیک** - یکی از عوارض  
آندوکاردیت باکتریال گلومرولو نفریت فوکال آمبولیک می‌باشد  
واز خصوصیت آن نکروز آماسی حادی است که بصورت کانون  
یا لکه لکه درمی‌آید. معمولاً در ۹۰-۲۳ درصد اندوکاردیت‌های  
باکتریال تحت حاد دیده می‌شود.

اندازه کلیه معمولاً در این بیماری طبیعی است و یا آنکه  
کمی بزرگتر از طبیعی است. ظاهرآ در سطح کلیه هیچگونه  
علامت غیر طبیعی جز پتشی‌های بطور پراکنده و دیمی دیده  
نمی‌شود. این پتشی‌ها از پتشی‌هایی که در گلومرولو نفریت حاد  
می‌باشند بزرگتر است. در این عارضه در گلومرولها جابجا  
کانون‌های آماسی حادی بطور پراکنده مشاهده می‌گردد. در  
بعضی موارد فقط چند گلومرول جدا از هم آزار نشان  
میدهند و در بعضی موارد عده گلومرولهای آزرده بقدرتی زیاد  
است که حقیقت نمی‌توان آنرا از گلومرولو نفریت دیفونز متمایز  
ساخت. در یک گلومرول ممکن است یک یا چند کلافه گرفتار  
باشد و واکنش موجود نکروز فیبرینوئید جدار موئین رگها و  
رسوب ماده فیبرینوئید در درون جدار و مدخل مؤین رگهای  
گلومرولی می‌باشد.

جدول ۷- وفور و شیوع آمیلوئیدوز در ۴۴۶۳ کالبدآشائی بر حسب گروه سنی، جنس و علت

مجموع	حملت									گروه سنی
	سیفیلیس	جذام	آمی‌بیاز	آمی‌بیک	آمی‌بیکو	آمی‌بیکو	آمی‌بیکو	آمی‌بیکو	آمی‌بیکو	
۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲	زن از ۱۴ سال
۳	-	-	-	-	-	-	-	۱	۲	مرد به پائین
۱۷	-	-	-	۱	-	-	-	۳	۱۳	زن از ۱۴ سال
۴۲	۱	۱	۱	۱	۲	۲	۱	۱۴	۱۹	مرد به بالا
۶۴	۱	۱	۱	۲	۲	۲	۱	۱۸	۳۶	مجموع

جدول ۸- وفور و شیوع آسیب‌های مختلف بافت انترس تی‌سیبیل

ردیف نام	گروه سنی				نوع آسیب	
	از ۱۴ سال به بالا		از ۱۶ سال به پائین			
	زن	مرد	زن	مرد		
۱۶۰	۴۷	۹۳	۵	۱۵	پی‌یلو نفریت مزمن	
۴۵	۷	۲۵	۵	۸	پی‌یلو نفریت حاد	
۴۲	۱۰	۲۹	۱	۲	نفریت انترس تی‌سیبیل مزمن	
۳۰	۴	۱۲	۶	۸	هیدرونفروز و سنک	
۵	۱	۴	—	—	نفریت انترس تی‌سیبیل حاد	
۲۸۲	۶۹	۱۶۳	۱۷	۳۳	مجموع	

**بیماریهای رگی- رگهای خونی در انسواع و اقسام بیماریهای کلیوی آزارنشان می‌دهد ولی منظور از این عنوان بیماریهایی است که بطور اولیه رگها گرفتار هستند [۳۸]. در جدول (۹) وفور و شیوع فشارخون در بیماریهای مختلف کلیه برحسب گروه سنی و جنس مشخص می‌باشد و چنانکه ملاحظه می‌شود مهمترین بیماریهای رگی که سبب فشارخون در این برسی شده است نفرواسکلروزنیکخیم و نفرواسکلروز بدخیم- انفارکتوس کلیه و نکروز کورتیکال حادمیباشد.**

جدول ۹- وفور و شیوع فشارخون در آسیب‌های کلیوی برحسب جنس و گروه سنی

ردیف نام	گروه سنی				نوع آسیب	
	از ۱۶ سال به پائین		از ۱۴ سال به بالا			
	زن	مرد	زن	مرد		
۶۰	۳۰	۴۰	—	—	بیماریهای عروقی	
۵۱	۱۹	۳۰	—	۲	پی‌یلو نفریت	
۴۰	۶	۳۰	—	۴	گلومرولونفریت	
۳	۳	—	—	—	دیابت	
۲	۲	—	—	—	سل	
۱۵۶	۶۰	۹۰	—	۶	مجموع	

جالبی دارد و تغییرات آسیب‌شناسی می‌تواند ملاک عمل خوبی برای طبقه‌بندی نفروپاتی‌های حاملگی باشد . معمولاً در این بیماران پرتوئین اوری [۳۲-۳۳-۳۴-۳۵] هی برتانوسیون و خیز وجود دارد و این نشانی‌ها ممکن است تنها و یا باهم باشد . آسیب‌شناسی یافتنی که در این موارد می‌بینیم مربوط به گلومرول‌ها و آرتربیول‌می باشد بدین معنی که:

۱ - سلولهای اینی تلیال گلومرول‌ها زیاد می‌شود و در فضای گلومرولی هلال پدید می‌آید و در نتیجه حجم گلومرول‌ها افزایش می‌یابد.

۲ - جدار موئین رگ‌ها بطور کانونی (فوکال) کلفت و همین‌طور نیز مناطق بین موئین رگ‌ها (انترکاپیلر) کلفت می‌شود.

۳ - در نتیجه گلومرول‌ها بی‌خون می‌ماند و در کلافه‌های گلومرولی نکروز فیبرینوئید آشکار می‌گردد.

۴ - همراه با این ضایعات گلومرولی نکروز حاد ارتربیول‌ها کوژسیون دیفوز و ادم در انترسیس دیده می‌شود.

ضایعات لوله‌های ادراری - در این گزارش سه مورد نکروز توکسیک و ۲۷ مورد نکروز کولمیک و ۵ مورد نکروز می‌بلومی وجود داشته است. نکروزهای توکسیک موجود در دو مورد مربوط به مسمومیت باسوبالیمه و یک مورد داروی نظافت می‌باشد. در این موارد اخیر اپی‌تلیوم سوله‌های کلیوی مخصوصاً لوله‌های پیچیده پروکسیمالی در اثر سم خراب و استحاله حبایی (واکوئولر) نشان میدهد.

#### بیماریهای بافت انترس تی‌سیبیل-

شایع‌ترین بیماریهای کلیوی در کالبد گشائی‌های انجام شده پی‌یلو نفریت و نفریت انترس تی‌سیبیل است که شامل ۲۸۲ مورد یعنی ۵ درصدی باشد. البته نسبت این بیماری در گزارشاتی که داده شده خیلی متفاوت است زیرا که حقیقته هنوز مفهوم پی‌یلو نفریت برای همه یکسان نیست [۳۶]

متأسفانه در زمان حاضر مایا توکریست‌ها در آزمایش کلیه که به پی‌یلو نفریت گرفتار است تمام هم خود را صرف مطالعه تغییرات پارانشیمی می‌کنیم و فراموش می‌کنیم [۳۷] که یک لگنچه هم وجود دارد و عیب آن رانادیده‌میگیریم و بدیهی است که این عادت منجر باشتباهاتی هم می‌شود . جدول ۸ مشخص وفور و شیوع پی‌یلو نفریت‌های حاد و مزمن نسبت به سن و جنس می‌باشد.

- 19- Ireland. J.T., *Amer. J. Med.*, 15: 192, 1970.
- 20- Rafael, A. Gerhard Treser., *Amer. J. Med.*, 15: 195, 1968.
- 21- Alberto, Daysog., *Ann. Inter. Med.*, 54:672- 684, 1961
- 22- Ramon. A., Gutllon., *Arch Path.*, 34: 598, 1961.
- 23- Turgeon. Cl., Schelchon C., *Amer. J. path.*, 38: 237, 1961.
- 24- Urol. I , Munkacsi., *Brit. Med. J.*, 1: 713, 1961.
- 25- Maurice. A. Pearl, T., *Amer. J. Med.*, 246: 118, 1963.
- 26- Milliez. G. Lagrue., *Rev. Praticien.*, 4: 941, 1961.
- 27- Milliez. G , *Lancet* , 2: 451, 1966.
- 28- Grosnier, T. Slama., *Press. Medicale.*, 10: 371, 1960.
- 29- Martin. A. Shearn., *Am. Inter. Med.*, 67: 100, 1967.
- 30- Farmer. D Ferguson., *Med. clin. N. Amer.*, 50: 119, 1966.
- 31- Naomi. A. Rothfield., *New. Eng. J. Med.*, 269: 537, 1963.
- 32- Giussep. F. *Amer. J. Obstet. Gynec.*, 87: 1047, 1963.
- 33- Pollak. V., Victor., *Amer. J. Med.*, 30: 181, 1961.
- 34- Victor. E. Pollak, T., *Amer. J. Med.*, 39: 150, 1967.
- 35- Mettles, T. Pollak. E. Victor., *Amer. J. Obst. Gynec.*, 70: 650, 1960.
- 36- Rabson. S.M., *Amer. J. Hyg.*, 78: 427, 1969.
- 37- Heptinstall. H., *J. Infect. Dis.*, 120: 104, 1969.
- 38- Kenneth O., *Brit. J. Urol.*, 31: 414, 1959.
- 39- Claud. J. Biava, D., *Amer. J. path.*, 44: 349 1964.
- 40- Ashworth, C.T. Erdmann *Amer. J. Path* , 10: 20, 1965.
- 41- Leonard. B. Berman , *Arch. path.*, 69: 52, 1960.