

لاده دانشکده پرستش تهران

آبان ماه ۱۳۴۶

شماره دوم از سال بیست و پنجم

جستجوها و کاروایی علمی

دکتر تقش تبریزی*

دکتر میرسپاسی*

دکتر ابراهیم حسن زاده**

گزارش ۷۴ هورد ترک اعتیاد^۱

بحث بهداشت روانی و آماری - از کارهای علمی بیمارستان میمت

موضوع گزارش ما بررسی در ۷۴ مورد بیماران معتاد بمواد مخدر (هروئین و ترباک) است که در سالهای ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ در بیمارستان میمت تحت درمان قرار گرفته‌اند.

۱- از نظر سنسی: در ۷۴ مورد ازه ۲۰-۱ سالگی معتادی وجود نداشته است که در آمار ۲۴ مورد نیزاین نکته تأیید شده بود.

۱- در شماره هشتم نامه دانشکده پژوهشی مورخ اردیبهشت ماه ۴۵ تحت عنوان گزارش ۴۲ مورد ترک اعتیاد بحث شده و این مقاله با ۷۴ مورد جدید دنباله آن است که جمع موارد را از نظر آماری بحث کرده‌ایم.

* استاد و مدیر گروه آموزشی روانی (بیمارستان روزبه)

** استادیار سابق گروه آموزشی روانی و رئیس بخش روانی بیمارستان میمت

*** دستیار بخش روانی بیمارستان میمت

- بین ۰۲۰-۲۵ سالگی ۱۲ نفر (٪۱۶/۲) که درآمار قبلی این نسبت ۴/۲۱٪ بوده است.
- » » » » » ٪۱۶/۶
- بین ۰۲۵-۳۰ سالگی ۱۰ نفر (٪۱۳/۰)
- » ٪۲۱/۴
- بین ۰۳۰-۳۵ سالگی ۱۳ نفر (٪۱۷/۰)
- » ٪۱۱/۷
- بین ۰۳۵-۴۰ سالگی ۲۶ نفر (٪۲۵/۱)
- » ٪۱۶/۶
- بین ۰۴۰-۴۵ سالگی ۱۲ نفر (٪۱۴/۸)
- » ٪۱۱/۷
- از ۰۵۰ سالگی بیلا ۲ نفر (٪۲/۷)
- چنانکه ملاحظه میشود پیش از ۴ ساله هستند که درآمار قبلی رقم ۱/۱٪ بدست آمده بود (رجوع شود به نمودار شماره ۱).
- ۳- وضع زناشویی :** در ۷ سورد ۲۷ نفر مجرد (٪۳۶/۵) و ۴ نفر متاهل هستند (٪۶۲/۱) یک نفرهم وضع ازدواجش را پنهان کرده است. درحالیکه درآمار مربوط به ۲۴ سورد، مجردین (۰/۲۸٪) و متاهلین (۴/۴٪) بودند. ۱ نفرهم وضع ازدواج مشکوک داشتند (٪۲۳/۸).

۳- پایه تحقیقات: ازع سورد.

- بیسواند وسواند مختصر ۸ نفر (٪۱۰/۸) درآمار قبلی (۰/۴۵٪).
- ششم ابتدائی ۱۰ « (٪۱۳/۵)
- سیکل اول ۱۴ « (٪۱۸/۸)
- دیپلمه ۲۱ « (٪۲۸/۳)
- تحقیقات عالی ۱۳ « (٪۱۷/۵)
- ۸ نفر پایه تحقیقات خود را سخنی کرده‌اند (٪۱۰/۸).
- نتیجه‌ای که از مقایسه ارقام فوق گرفته میشود این است که معتادین با پایه تحقیقات عالی و معتادین بیسواند بیشتر از سابق شده‌اند ولی تعداد معتاد باسواند متوسط و دیپلم تقریباً بدون تغییر مانده‌اند (نمودار شماره ۲).

- ۴- نوع اعتیاد:** هروئین تنها ۵ نفر (٪۶۷/۰) درآمار قبلی (۰/۴٪).
- تریاک تنها ۱۹ « (٪۴۰/۴)
- هروئین و تریاک ۰ « (٪۶/۷)
- چنانکه با مقایسه آمار قبلی کاملاً مشهود است بدیرج از تعداد تریاکیها کم شده و بر معتادین هروئین اضnahme میشود.

- ۵- دفعات اعتیاد:** از ۴ نفر ۲ نفر برای اولین بار (۱/۳٪) درآمار قبلی (۰/۵۲٪).
- ۶ نفر برای بار دوم (۰/۲۱٪) « (٪۱۹)

۷ نفر برای بار سوم (۳٪) در آمار قبلی (۶٪)

(٪، ٪/٪) » (٪، ٪/٪) چهارم (۱) » » ۵

٩ « دفعات پنجم و ششم و هفتم (٪۱۳/۰)

در آمار قبلی (۳/۲٪)

۱ نفر بیش از . ۱ سرتبه (۳/۱٪)

نفر نامعلوم

۶- مدت اعتیاد: بیمارانی که سه ماه از اعتیاددان بی گذشت هر نفر (۴٪) در آمار قبلی (۲/۳٪))

معتادین ۱ ساله ۲۸٪ درآمد اقیانوس (۱۶٪) و تقریباً (۱٪) ناقص

$$(\forall q/\phi) \Rightarrow (\forall \neg q/\psi) \Rightarrow \phi \Rightarrow \psi$$

($\vee\vee/\perp$) \Rightarrow ($\vee\wedge$) \Rightarrow \perp \Rightarrow \top

$$(\forall x \exists y \forall z) \rightarrow ((\forall x \exists y \forall z) \rightarrow (\exists x \forall y \exists z))$$

$$(\gamma_1/\gamma) \quad \Rightarrow \quad (\gamma_0/\xi) \quad \Rightarrow \quad \xi \quad \Rightarrow \quad \gamma \quad \Rightarrow$$

$$(\forall x/\tau) \rightarrow (\exists y/\tau) \rightarrow \wedge \rightarrow \wedge^2$$

$$(\gamma_{\sqrt{t}}/\lambda) \longrightarrow (\gamma_0/\xi) \rightarrow \xi \rightarrow 1;$$

$$(\forall x/\lambda) \rightarrow (\forall y/\xi) \rightarrow \vee \rightarrow 1 \circ \rightarrow$$

$(\zeta_1 z / s) \gg (\zeta_1 z / \hat{s}) \gg \hat{s} \gg \tau_1 \gg$

(ψ_0/ψ) = " $\psi_0(\varepsilon/\xi)$ " $\rightarrow \psi_0 \text{ لـ} \psi \text{ لـ} \psi_0$ "

وهو ينبع من مفهوم العدالة التي يتحقق في المجتمع.

۷- نوع درمان: نوع درمان برباپیه ترک نا لهانی استوار بوده و عیناً مشابه درمان ۴ مورد
قبلی انجام شده است. علل اعتیاد نیز عیناً مانند ۴ مورد قبلی بدست آمده است.

اختلافات بیش و کم زیادی از نظر چند درصد ارقام بدست آمده در دو دسته بیماران مشاهده شد که دسته ۱ دسته ۲ بود که داده شده است، گذاشت شده این دو دسته از


آنکه تعداد سوارد کمتر بوده پائین تر است و بر عکس در دسته دوم که ۴۷ سوره بوده و موضوع

چون در آمارگیری هرقدر تعداد موارد بیشتر باشد نتایج بحقیقت نزدیکتر است برای یافتن روشی احتساب پروندهای موارد اولیه پس از آن چنان دارای نتایج معنی‌تر و معتبر‌تر است.

ارقام قطعی تر و نزدیکتر به حقیقت ما جمع سوارد را منظور داشته چند درصد هارا تعیین می‌کنیم تا دنباله آنرا تغییر داشتیم نه این.

۱۲۹ و ۳۰ دو دسته موارد را جدا گانه رسم می کنیم تا سهنتی ها باهم قابل قیاس و سنجش

بتوانیم بطور کلی بانتایج قبلی مقایسه کنیم.




از این ارقام و آمار و نمودارچون چند درصد تعیین کیم به نتایج زیر میرسیم :

۱- سن بیماران : ۲۰-۱۵ سالگی اعتیادی نبوده - بین ۲۰-۲۵ سالگی $\frac{۱}{۱۸}$ ٪


بین ۲۵-۳۰ سالگی $\frac{۶}{۱۴}$ ٪

بین ۳۰-۳۵ سالگی $\frac{۹}{۱۸}$ ٪ بین ۳۵-۴۰ سالگی $\frac{۷}{۲۶}$ ٪ بین ۴۰-۴۵ سالگی $\frac{۵}{۱۰}$ ٪



از ۵۰ سال بیلا $\frac{۹}{۵۰}$ ٪



این ارقام نتیجه‌ای که قبلاً در دو دسته بیماران ۴۲ مورد و ۴۷ مورد گرفته شده تأیید می‌کنند زیرا نسل فعال کشور بین ۰-۲۵ ساله می‌باشد و خطری که اعلام شده بود با این بررسی پیشتر جلب نظر می‌کند و از نظر اقتصادی عمومی سنتله‌ای است حاد که باید از نظر جامعه‌شناسی و سردم‌شناسی و اقتصادی سورد توجه خاص قرار گیرد (به نمودار ه مراجعه شود).



۲- از لحاظ تأهله: در دسته ۴۲ حدود ۴۷٪ و در دسته ۴۷ حدود ۶۲٪ و در دسته ۱۱۶ مورد ۵۳٪ متأهل بوده‌اند و اگر توجه شود که تعدادی از روشن کردن وضع خود از نظر تأهله خودداری کرده‌اند و نیمی از خودداری‌ها را جزء متأهله‌ین احتساب کنیم رقم بزرگی است که چون سسئول خانواده و فرزندان سیاشند از نظر تأثیر آثار وضعی اعتیاد در ارکان خانواده بسیار قابل توجه است و باید اینجا نیز از روانپردازی و روانشناسی اجتماعی کمک گرفت.



۳- از نظر پایه تحقیقات : شماره معتادان دیپلمه بالا تعداد بیشتری را نشان میدهد و این نتایج قبلی را تأیید میکند. و خطری که جهان جوانان روشنگر را تهدید میکند بزرگ است و باید مورد توجه قرار گیرد و اجتماع برای پژوهش این نسل جوان تحقیلکرده بسیار خرج کرده و از آن زیربنای اجتماع را باید بسازد و این اعتیاد در زیر بنای اجتماع سنتی و خلل وارد میسازد بدین جهت است که اگر این بررسی آماری فقط این نتیجه را نشان میداد

بسیار سهم بود و باید سئولان اجتماع توجه کنند که پایه های اجتماع آینده براین پیتای سست ولرzan وحشت آور است.

تمام مساعی باید صرف شود که اقلال جوانان تحصیلکرده را در شرایطی بگذارند که درپیهای اعتیاد باشند (رجوع شود به نمودار ۶).

۴- نوع اعتیاد : اعتیاد بهروئین در دسته ۲ ۴ مورد که مربوط به سالهای ۴۱ و ۴۲ است باعتیاد به تریاک کاسلا برابر بوده است (۴۰٪/۴٪) درصورتیکه در دسته ۴ ۷ مورد که مربوط به سالهای ۴۴ و ۴۵ میباشد اعتیاد بهروئین ۵/۶۷٪ و اعتیاد به تریاک ۶/۲۵٪ بوده است و این معلوم میکند که پندریج از اعتیاد تریاک کاسته و براعتیاد بهروئین افزوده میشود و این خطری است بزرگتر که کل موارد نیز آنرا تأیید میکند پس مبارزه با هروئین فعلاً لازمتر است و بهنتیجه بهتری خواهد رسید زیرا کترول قاچاق هروئین برآمد آسانتر است زیرا تریاک بیشتر از راه تدخین انجام میشود وسائلی میخواهد و بیوئی که متصاعد میکند باعث کشف میشود و مردم گرفتار ازیم کشف خودداری میکنند. درصورتیکه هروئین وسیله ای نمیخواهد آسانی و بدون آنکه کسی توجه کند مصرف میشود. پس مبارزه با هروئین باید سرلوحه فعالیت و جلوگیری از اعتیاد باشد.

۵- دفعات اعتیاد : بررسی آماری نشان میدهد که در دسته ۴ مورد، برای بار اول ۳/۵۲٪ اعتیاد پیدا شده است و در ۶۱٪ مورد ۱/۴٪ اگراین ارقام توجه شود ظاهرآینظر میرسد که تعداد کمتری تازه مبتلا شده‌اند و مخصوصاً در دسته ۴ ۷ مورد برقم ۱/۳۵٪/بررسیم که بسیار ما را خوشبین میکند که افراد تازه کمتر دیگر دچار میشوند. ولی کاهش رقم ۳/۵۲٪ به ۱/۴٪ نشان دهنده این است که البته تعداد اعتیاد تازه کاسته میشود ولی نه به نسبت قابل توجهی درهحال اگر رقم کل را هم درنظر بگیریم در عرض ۶ سال به نسبت ۱/۱٪ از اعتیاد تازه کاسته شده است کاهاشی است قابل توجه ولی بسیار پائین تراز کاهش مورد آرزوی اجتماع.

اینکه باید دید براثر چه عواملی در عرض ۶ سال اعتیاد تازه ۱/۱٪ کمتر شده است. بنظربررسد سروصدائی که برای مبارزه با این بیماری بوسیله مطبوعات و سخنرانیها که جمعیت بهداشت روانی برای اندام خود در این کاهش بی تأثیر نبوده باشد ولی این سروصدایاد وسایل است خاموش شده است ویم این میروند که دوباره تعداد افراد تازه معتمد بالا رود. حق این است که سئولان ابرو مخصوصاً مطبوعات قلمفرساً پیرامون مضراعتیاد را همچنان شدیداً تقویت نمایند و سئولان امور برای بهترین مقالات در این زمینه چوائزی منظور دارند که این مبارزه مطبوعاتی شدیداً تاپایان اعتیاد ادامه پیدا نماید. البته ما تنها ارتقابیغات مطبوعاتی

را کافی نمی‌دانیم ولی یکی از عوامل مهم مبارزه با اعتیاد می‌باشد که چون باعوامل آسوزش و پرورش، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصادی توأم گردد بی‌شک به نتیجه مشتبه و مطلوبی خواهد رسید. (رجوع شود به نمودار شماره ۷).

۶- مدت اعتیاد: با توجه به نمودار شماره ۸ معتادان جدید هر ساله رقم ۵۰٪ را نشان میدهد و بکماله ۲۵٪ پس از سالهای ۱۴ و ۴۲ و ۴۳٪ تازه گرفتار شده بودند و در سالهای ۱۴ و ۱۵٪ که این حکایت از کاهش اعتیاد تازه دارد و چون هر ۱۱ مورد را در نظر بگیریم سی‌پنجم رقم متوسط قریب ۵٪ است یعنی ربع از معتادان تازه و در مدت یک‌سال و کمتر گرفتار شده‌اند و این رقم معلوم می‌کند که خطر اعتیاد به نسبت ربع جمع معتادان هرسال اضافه می‌شود و این نتیجه استنتاج قبلی را تأیید می‌کند که نشان داده بود به نسبت ۱۱٪ از اعتیاد تازه کاسته شده است ولی خمناً معلوم می‌کند کاهش بآن سرعت لازم نیست اگرچه تعداد بتلابیان جدید ضعیف‌کم می‌شود ولی باید سرعت این نتیجه بیشتری پیدا کند تا مبارزه با اعتیاد به نتیجه مطلوب خود برسد (نمودار شماره ۸).

خلاصه

بررسی ۷۷ مورد اعتیاد سربوط به سالهای ۱۴ و ۱۵ نتیجه‌ای را که قبل هنگام بررسی ۲۴ مورد اعتیاد بدست آمده بود تأیید می‌کند و علاوه برنتایجی که در آن هنگام گرفته شده و در نمودار هشتم ساله نامه دانشکده پزشکی طبع گردیده و با بررسی جدید تأیید گردیده است نکات زیر نیز بدست می‌آید:

۱- آگهی‌هایی در سجلات و مطبوعات روز بچشم بیخورد که بعضی همکاران مدعی ترک اعتیاد در طی چند روز یا یک هفته می‌باشند علاوه بر اینکه این آگهی‌ها خلاف واقعیت و شائون پزشکی است از نظر علمی نیز بی‌اساس است زیرا آخرین بررسی‌های بهداشت جهانی درباره اعتیاد حکایت دارد که باید معتادان را به مدت ۵-۹ ماه تحت نظر بگیریم متوجهانه با وجود این بسیاری از معتادان دویاره از نو گرفتار می‌شوند.

قبل اشاره شده است که اصولاً معتادان دچار اختلال شیخیتی حالت پسیکونورز و یا پسیکوپاتی می‌باشند. درمان باید متوجه تصحیح حالات مذکور باشد و این بیشترین روش درمانی است. قطع دارو باید در میانه‌ای انجام شود تا فعالیت‌های بیمار و منبع تهیه دارو تحت سراقت شدید باشد و بیمار نتواند مطلقًا به ماده مورد اعتیاد دسترسی پیدا کند و باید حتماً بیماریستی شود تا علاوه بر رفع اختلالات بدنی تحت روان درمانی و نوتوانی قرار گیرد. قبل از هرچیز باید میل ترک اعتیاد را در معتادان بوجود آورد و مطلقًا اجبار فایده ندارد و گرنه

سرانجام پس از چند هفته تاچند ماهی بازشروع خواهد شد و این جز باروان درمانی و ماندن چند ماه در مؤسسه مخصوص اسکان پذیر نمی باشد.

سازمان ملل مدت ۵ - ۹ ماه را توصیه کرده است و این مدت در ایران ما در شرایط فعلی عملی نیست ولی باید تا آنجا که ممکن است دوران بستری را طولانی تر کرد. روش‌های درمانی مورد بحث ما نیست. و روش خاصی که این بیماران درمان شده‌اند طبق روش خاص بیمارستان می‌مینست است که قبلاً توضیح داده شده است.

- از نظر اتیولوژی عموماً معتادان دارای یک زیسته روانی پسیکوبات یا نوروتیک هستند که در روی این زیسته شکلات اجتماعی و شکست‌های زندگی . تماس با معتادان و شرایط ناساعد و مخصوصاً فعالیت پی گیر و بیشتر قاجاقچیان اثر کرده موجب اعتیاد می‌شود .

- معتادان بیشتر بهروئین دچار هستند و بنا بر این خط مشی بیارزه با اعتیاد باید بزرگی سیاره شدید قاچاق هروئین انجام شود.

- تعداد معتادان متاهل بیشتر از مجرد است و این پایه خانواده را که رکن اصلی اجتماع است متزلزل می‌سازد.

- معتادان را باید بیمارانلی کرد نه فاسد و اویاش و با همدردی و ایجاد محیط صمیمی پانها کمک کرد تا براعتیاد خودشان تسلط پیدا کنند.

- ترک هیچ اعتیادی بدون روان درمانی مناسب و مطلوب اسکان پذیر نیست^{۱ و ۲}.

۱- برای اطلاع و توضیح بیشتر رجوع شود به پایان نامه شماره ۱۱۴ سال ۱۳۴۶ آقای منصور دانش پژوهی که در آنجا هر ۱۱ مورد رامفصل بررسی گرده‌ایم.

۲- به کتاب «همه‌گیرشناسی بیماریهای روانی» تألیف آقایان دکتر بهرامی و دکتر بطحانی مراجعه شود.