

تازه‌های میکروپولوژی

دکتر عزیزه وحدت

چند داروی جلدی جهت درمان پیماریهای ویروفی

۱- هلنن آنتی بیوتیک جدیدی است که از پنیسیلیوم فونی کولوزم بدست می‌آید و ریاضی از ویروس‌ها خصوصاً ویروس پلیومیلیت بسیار مؤثر است. آزمایش‌های لازم در روی بیمونها انجام شده است حیوانات را ابتدا با ویروس پولیومیلیت نمونه E. به بیماری سبتلا نموده می‌س آنها را توسط آنتی بیوتیک نامبرده معالجه نموده‌اند. باید دانست که این آنتی بیوتیک از لحاظ ترکیبات شیمیائی شبیه نوکلئوپروتئین هاست.

۲- گلی اوتوکسین این آنتی بیوتیک از کفک‌های مختلف تهیه می‌شود در روی بعضی از ویروسها مانند ویروس سرخک، ویروس گریپ دسته A و بولیوویروسها بسیار مؤثر است چگونگی اثر این آنتی بیوتیک در ویروس‌های مختلف بخوبی معلوم نیست ولی بنظر می‌آید که از شد ویروس‌ها در داخل سلول چلوگیری مینماید آزمایش‌های مختلفی که در حیوانات آزمایشگاه انجام شده است بسیار رضایت‌بخش بوده و نشان میدهد که میتواند در معالجه بعضی از بیماریهای ویروسی مورد استفاده قرار گیرد. در معالجه گریپ ممکن است این دارو را بصورت آنژوسل بکار برد.

۳- مطالعات عمیق و دامنه‌داری جهت بررسی اثرات U.I.D. در ویروس‌ها که دارای A. D. N هستند انجام شده است این مطالعات چگونگی اثرات U. I. D. را در روی این دسته ازو ویروس‌ها معلوم نموده، روش تهیه و سنتز ترکیبات شبیه بازرا که در این دسته از ویروسها مؤثر باشد معلوم مینماید. چون فقط این دسته از داروها در ویروس‌هایی که دارای A. D. N هستند مؤثر است باین وسیله علاوه بر معالجه بیماریهای آن میتوان ساختمان امید نوکلئیک ویروس‌هارا نیز مطالعه نمود و بعلاوه میتوان جهت جدانمودن انواع ویروسها آنرا بکار برد.

۴- اخیراً مواد شیمیائی مختلفی سنتز شده است که از لحاظ ساختمان شیمیائی کاملاً متفاوت می‌باشد ولی میتواند سنتز R. A. را در ویروس‌ها ازین برد. مهمترین آنها عبارتست از: اول - آلفا آمینو اتیل پیریدین اول - آلفا آمینو اتیل پیریدین دوم - پیریدین اتیل گوانیدین (سولفات).

سوم- بتا (آلfa پریدیل) اتیل آمین.

آزمایش‌های مختلفی که در حیوانات انجام شده است نشان میدهد که ترکیبات نابوده اثرات خدوپروری قوی دارند و بیتوانند در علاجه بیماریهای ویروسی سورداستفاده قرار گیرند.

اقتباس :

- 1) Shope : An antiviral substance from penicillium funiculosum. Inquiry into the mechanism by Which helenine exerts its antiviral effect: J. Exp. Med. 1966 p. 213.
- 2) Larin - Antiviral activity of gliotoxin chemo - therapia (Basel) 1965. p. 11-23.
- 3) Pasca - Derivativees of 2 - aminoethyl guanidine and of a eugenol as virus inhibitors. Nature 1965 T 208, p. 408.
- 4) De Lavergne - Action de la 5 Iodo - 2 - desoxyuridine (I U R) sur quelques virus a A. D. N. en culture cellulaire Rev. Immunol. 1965, T, 29, p. 241.

مسئول تصحیح و چاپ : علی اصغر نصیریان

از این شماره نامه دانشکده پزشکی ۳۰۰ نسخه در چاپخانه دانشگاه تهران
چاپ شده است

There is no doubt that Smegma, a non - cornified granular cells with epithelial structure , is a carcinogen material. We have heavy concentration of smegma in childhood, particularly in early days of life.

In Persia circumcision is done usually when the child is 3-5 years old and sometimes in the period before the puberty, 10 - 14 years of age. This, we believe, could well be the account for a rather high incidence of penile carcinoma among Moslems population in Persia (at least in Tehran Region) .