

مسخنی چند در باره بیوپسی

بیوپسی یکی از طرق مهم تشخیص و معالجه بیماریها است . لغت بیوپسی معمولاً به نسجی اطلاق میشود که بواسطه عمل جراحی برداشته شده برای آزمایش نسج شناسی فرستاده شود .

اولین بیوپسی را به پوست شناس (Dermatologist) معروف فرانسوی برنر (Besnier) نسبت می دهند ولی در حقیقت ویرشو (Wirshow) نخستین فردیست که اهمیت و اصول آنرا گوشزد نموده بعداً پاپانیکولا (Papanicolaou) طریق تجدیدی برای کشف زودرس سرطانها پیشنهاد نموده که امروز متداول است . از بیوپسی بطور خلاصه در سوارد زیر میتوان استفاده نمود، رجوع شود به جدول شماره ۱ .

تشخیص	نوع ضایعه خوش خیم بد خیم	اولیه ثانویه عود	نوع - درجه - سواعتیت - انتشار ^۲
پیش آگهی	از لحاظ کار عضو زندگی بیمار		
معالجه	حذف موضعی ^۴ حذف کلی ^۵ پرتو درمانی - شیمی درمانی - درمان توأم و بالاخره معالجات دیگر		

انواع بیوپسی - بیوپسی اقسام مختلف دارد ولی شایع ترین آنها بقرار زیر است :

- I- Incisional biopsy II - Excisional biopsy III - Needle - biopsy
VI- Bite biopsy V- Cytological biopsy

* رئیس بخش جراحی بیمارستان رازی

۱- Grade

۲- Location

۳- Extension

۴- Local excision

۵- Radical Surgery

I - بیوپسی قطعه‌ای Incisional biopsy در این‌طریقه قطعه‌ای از ضایعه مورد بحث را بر میدارند این نوع بیوپسی‌ها در سواردی بکار می‌رود که ضایعه بزرگ است و برای اتخاذ تصمیم مقتضی تشخیص قطعی لازم است. برای اینکار از Frozen section یا Permanent section استفاده می‌کنند. در اینموقع برای دقت بیشتر بهتر است از نقاط مختلف عارضه قطعات کوچکی برداشته شود.

II - بیوپسی حذفی Excisional biopsy در این‌طریقه عارضه مورد بحث را باستداری از نسج سالم کلاً برای آزمایش بر میدارند.

III - بیوپسی تکه‌ای Bite biopsy در این‌طریقه قطعه کوچکی از نسج را با اسباب مخصوصی در جریان داخل بینی (اندوسکوپی) بر میدارند (باید دانست ارزش تشخیص اندوسکوپی بدون بیوپسی بستگی به مهارت و تجربه متخصص مربوطه دارد).

IV - بیوپسی سوزنی Needle Biopsy از این‌طریقه در موارد زیر استفاده میشود:

الف - ضایعه در عمق و دوردست قرار گرفته باشد.

ب - ترس از بهبود و ترمیم ضایعه.

ج - ضایعات خیلی پیشرفته باشد.

V - بیوپسی سیتولوژیک Cytological Biopsy - در این‌طریقه با روش‌های مختلف مثل شستن حفره‌ها و غیره عناصر سلولی را بدست می‌آورند همانطوری که گفته شد طرق دیگری نیز وجود دارد لکن قسمت‌های ذکر شده متداول بوده و برای تشخیص و معالجه کارهای روزمره کاسلاً کفایت می‌کند. باید دانست بیوپسی در حقیقت یک جراحی کوچک است که در بخش‌های آموزشی غالباً به دستیاران تازه کار یا کارورزان محول میشود بدون اینکه اهمیت آن بانها گوشزد شود در حالی که میدانیم سرنوشت بیمار به نتیجه صحت آن بستگی دارد بنا براین لازم است اهمیت آن از لحاظ رعایت آسپسی و دقت در برداشتن و بالاخره حفظ و نگهداری آن گوشزد شود.

عوارض: عوارض بیوپسی را بدو دسته فوری و دیررس میشود تقسیم کرد.

عوارض فوری: ظاهراً شایع‌ترین عارضه آرتریتیک است (نسبت به داروهائی که موضعی جهت بیحسی بکار می‌رود) ولی در حقیقت عوارض سمی دارو (بعلت مصرف بیش از اندازه) بیشتر دیده میشود بنا براین در موقع تجویز باید حداقل دارو را بکار برد بشرطی که در انجام عمل ایجاد اشکال نکند. علائم حساسیت بدرجات مختلف از خارش متوسط و

کهیتر تاشوگ آنافیلایکتیک ممکن است دیده شود و مرحله آخری اورژانس حقیقی است و ممکن است منجر به کلاپس و ازوتور کامل شده باعث توقف قلب شود.

برای جلوگیری از این عارضه بایستی هر بیمار با سابقه آسم مورد توجه قرار گیرد بخصوص در مواردی که قرار است بیمار اندوسکوپ (ازوفاگسکوپ یا برونکوسکپی بشود) چه این بیماران خیلی بیشتر نسبت به داروی موضعی حساسیت نشان میدهند. بنابراین قبل از شروع به تجویز دارو بایستی وسائل لازم را در دسترس قرار داد تا در صورت لزوم بتوان از عوارض حاصله جلوگیری نمود.

پدیده‌های آلرژیک متوسطاً معمولاً با تجویز داخل وریدی داروهای آنتی هیستامینیک نظیر: دایریل (Diphenhydramine hydrochloride) میشود کنترل کرد در حالی که تظاهرات سمی معمولاً پیشرونده بوده منجر به تشنج میشود، این تظاهرات با اسپاسم و جمع شدن عضلات دوردان شروع، کم کم دامنه تنفس کوتاه شده کلاپس عروق محیطی پیش میاید و بالاخره منجر به توقف قلب میشود.

هر آینه این حادثه پیش آمد کرد باید فوری اقدام به تجویز اکسیژن کرد و برای کنترل تشنج از تزریق داخل وریدی داروهای خواب آور کوتاه مدت (Short acting barbiturate) بمقدار لازم استفاده نمود چه تجویز زیاد خود این داروها باعث می شود که دامنه تنفس بیشتر کوتاه شود.

خونریزی: یکی دیگر از عوارض مهم بیوپسی است - در صورتی که سطحی انجام گرفته باشد از خونریزی حاصله با فشار دست باسانی میشود جلوگیری کرد. در صورتیکه خونریزی بعلت اختلالات انعقادی باشد باید آنرا اصلاح نمود.

بیوپسی های سوزنی طحال و کبد و کلیه خیلی بدترت ممکن است تولید خونریزی شدید بکنند که محتاج به عمل شوند.

پنموتوراکس: یکی دیگر از عوارض فوریت است که ممکن است در جریان بیوپسی جنب یا قفسه سینه پیش آید بنا براین همیشه پس از بیوپسی سینه یاربه یا غده جنب لازم است از قفسه سینه بیمار رادیوگرافی بعمل آید.

سوراخ شدن (Perforation) سوراخ شدن احشاء مجوف یکی دیگر از عوارض فوریت این عارضه معمولاً در جریان اندوسکوپي مثلاً بیوپسی قولون یا مری یا مثانه پیش میاید. عوارض دیررس: شایع ترین عارضه دیررس عفونت است که در بیوپسی سطحی و هم بیوپسی

عمقی ممکن است دیده شود. بنابراین برای جلوگیری از آن باید احتیاطهای لازم را از لحاظ ضد عفونی بعمل آورد.

انتشار سلولهای سرطانی: در اینجا این مبحث پیش می‌آید که بیوپسی چطور باعث پخش سلولهای سرطانی میشود. هرآینه در جریان عمل بیش از حد لزوم به نسوج صدمه وارد شود بدون شک جریان خون و لنف باعث پخش و انتقال سلولهای سرطانی خواهد شد. از اینجا اهمیت سلایمت در حین عمل و توجه بنسج معلوم میشود.

نکاتی که رعایت آنها در بیوپسی باعث موفقیت و عدم توجه بآن سبب پشیمانی خواهد شد: لنف بیجسی ناقص- بیجسی ناقص و ناکامل سبب میشود که بیوپسی بطور ناقص و ناکافی انجام گیرد و این موضوع بخصوص در بیوپسی‌های اندوسکوپیی مصداق پیدا می‌کند چه نقص بیجسی سبب میشود که بیمار حالت تهوع داشته باشد و یا در جریان عمل سرفه بکند نتیجتاً حوزه دید محدود شده برداشتن بیوپسی غیرمتمم خواهد شد.

ب- ناکافی بودن تکه برداشته شده- کوچکی قسمت برداشته شده اشکل دیگری است برای صحت تشخیص و این موضوع در بیوپسی تکه‌ای (Bite biopsy) که مرسوم سری و برنش است شایع تراست بنا براین در اینموقع برای صحت تشخیص و دقت بیشتر بهتر است چندین تکه برداشته شود.

ج- ثابت کردن ناصحیح- ثابت کردن ناصحیح هم یکی دیگر از علل عمده تشخیص ناقص و ناصحیح است چه این عمل باعث Autolyse نسج قبل از رسیدن به آزمایشگاه خواهد شد (برای ثابت کردن از محلول ده درصد فرمول ریابوئن میشود استفاده نمود. محلول بوئن ثابت کننده خوبی است لیکن قابلیت نفوذش از فرمول کمتر بوده بعلاوه رنگین است درحالیکه فرسل قابلیت نفوذش خوب بوده ارزان نیز می‌باشد بعلاوه با افزودن یک گرم نمک طعام به هرصد کیلوگرم محلول ده درصد قابلیت نفوذ آن بهتر میشود بنا براین بهتر است برای قطعات کوچک از بوئن و قطعات برای بزرگ از فرمول استفاده شود).

د- عدم رعایت سلایمت در برداشتن نسج- باید بیوپسی بانریش و سلایمت انجام شود چه خشونت باعث صدمه دیدن ساختمان سلولی و تغییر شکل آن میشود بنابراین بهتر است همیشه نسج را بخصوص در صورتیکه کوچک باشد به محض برداشتن داخل محلول ثبوت

قرار داد (غالباً نسج رالای گاز آلوده به سرم نمکی قرار میدهند) تمدت هر قدر هم کوتاه باشد ممکن است سبب اتولیز شود و یا اینکه در جریان جمع کردن وسایل عمل با اشیاء آلوده دور انداخته شود).

د- ظروفي که برای نگهداری بیوپسی بکار میرود باید بقدر کافی حجیم و مخصوصاً دهانه آن گشاد باشد تا دخول و خروج نسج در ظرف، بدون فشار انجام گیرد (بخصوص باید توجه داشت که نسج بعلت جذب ماده ثبوت حجمش افزوده میشود).

و- برچسب زدن - یکی دیگر از کارهای مهم برچسب زدن بیوپسی است. بجا خواهد بود که جراح عامل خودش این کار بظاهر بی اهمیت را باضافه شرح کامل بیماری و مدت آن و ناحیه برداشته شده را مفصلاً و خوانا بنویسد و از ارجاع آن به پرستار یا کمک خودداری نماید چه سهل انگاری در اینکار غالباً مانع تشخیص صحیح پاتولوژیست خواهد شد.

نکات مهم در طرز برداشتن بیوپسی: چون شرح و بسط بیوپسی تمام اعضاء واحشاء در اینجا باعث اطاله کلام میشود لذا اقسام و طرق مهم آنرا ذکر می کنیم.

۱- دستگاه پوششی - وسیع ترین قسمتی است که از آن بیوپسی بعمل می آید و بیوپسی قطعه ای طریقه ای است که بیش از سایر طرق از آن استفاده میشود. بیوپسی پوست ساده و کم و بیش سهل است جز در نواحی مخصوص مثل کف دست - بینی - گوش - کف پا که بعلت کمی خاصیت ارتجاع (آلاستیسیت) پوشاننده و سرست زخم ایجاد اشکال می کنند (چه اگر جراح سلاحتله زخم را کرده محافظه کارانه اقدام کند عمل ناقص خواهد بود و اگر وسیع بردارد سرست و پوشانیدن مشکل خواهد شد) در این مورد در صورتی که ماهیت عارضه مورد شک بوده باید قطعه کوچکی برای تجزیه برداشت بعد بسته به نتیجه آزمایش عمل را محدود و یا وسیع انجام داده از گوف استفاده نمود.

توبره های Naso - pharynx ممکن است بگردن منتشر شوند بدون آنکه ضایعه اولیه جلب توجه بکند بنا بر این لازم است در موارد پیدایش عوارضی در ناحیه گردن این نواحی دقیقاً مورد معاینه قرار گیرد.

در اندوسکوپي بخصوص برونکوسکوپي و Oesophagoscopie معاینه کننده بعلت تنگی میدان دید اغلب از نسج سالم تکه کوچکی را میتواند بردارد بعلاوه جراح بعلت ترس از خونریزی و سوراخ شدن قادر نیست تعداد بیشتری بیوپسی بردارد بعلاوه پس از اولین بیوپسی خونریزی مانع برداشتن تکه دیگر میشود در حقیقت سبباً تشخیص منگی به بیوپسی اولیه است.

بنا بر این بهتر است قبلاً بانور کافی تمام قسمت‌های عضو دقیقاً بررسی شود و قسمت‌های سالم از قسمت‌های بیمار تفکیک و قسمت‌هایی که باغذا یا چیز دیگر آلوده شده شستشو و پاک سپس اقدام به برداشتن بیوپسی شود. در صورتیکه قطعاً برداشته شده خیالی کوچک باشد بهتر است بانوک سوزن‌سج را از پنس بیوپسی جدا کرده داخل مایع ثبوت قرار داد.

ضایعات سری معمولاً توأم با التهاب مزمن است بعلاوه قطعات غذا جلوتر از محل ضایعه قرار دارد و توصیه می‌شود که قبلاً قطعات غذا و غیره باشندن واسپیراسیون برداشته شود.

بیوپسی ناحیه متعدد و قولون — در صورتیکه بیمار طبق معمول آماده شده باشد بهتر است پس از Proctoscopic بیوپسی بعمل آید. ضایعات رکتوم در صورتی که پائین تر از — Reflection صفاق قرار داشته باشد بدون ترس از سوراخ شدن می‌شود بیوپسی نمود درحالیکه در ضایعات واقع در برگشت صفاقی باید خیلی دقت بعمل آورد و بایستی بیوپسی پس از لاپاراتومی و Colotomy بعمل آید.

یکی از اعمالی که بطور شیوع در ناحیه گردن انجام می‌دهند بیوپسی غدد لنفاوی Scalene است که اشتهاً بیوپسی چربی اسکالین نامیده می‌شود.

در اینجا جراح بایستی غده را از داخل چربی‌ها جدا کند و بهتر است بدو قسمت تقسیم کند قسمتی را جهت کشت و تحقیق وجود باسیل اسیدوفاس (Acido - fast bacill) و قارچ و قسمت دیگر را جهت آزمایش بافت شناسی ارسال دارد. باین طریق می‌توان از بیوپسی نتیجه رضایت بخشی بدست آورد.

پستان — ماهیت ضایعات پستان را بیکی از طرق زیر تحقیق می‌کنند :

ترشح نوک پستان در صورتی که خونی نباشد بایستی از لحاظ سلولی مطالعه شود. در صورت خونی بودن بایستی حتماً با جراحی بیوپسی بعمل آید چه معمولاً عارضه یک پایلوم داخل سجرائی است (Intraductal papilloma)

بعقیده‌ها هر بیمار مبتالی به تومر مشخص و سنت پستان بایستی بایهوشی عمومی تحت عمل جراحی و بیوپسی باطریقه Frozen Section و در صورت بدخیمی عارضه تحت درمان Radical - mastectomy قرار گیرد.

در مواردیکه ضایعات پستان کیستیک بنظر میرسد بایستی پونکسیون بعمل آورده

نتیجه را جهت آزمایش سیتولوژیک فرستاد و در صورت منفی بودن نتیجه بزل بایستی بیمار را جهت Frozen - Section به بیمارستان روانه نمود.

در مواردیکه ضایعه رابطه نزدیک با جدار قفسه سینه دارد در موقع بیوپسی نباید نگران هموتوراکس یا هموتورا کس شد چه معمولاً ضایعه بقفسه سینه چسبندگی دارد و فضای جنبی بطور طبیعی بسته است.

بیوپسی استخوان - در ضایعات استخوانی دقت زیادتری باید انجام گیرد چه ممکن است حتی استخوان بلافاصله متصل به ضایعه آزاری نشان ندهد. لذا حتماً باید از محل آزار یافت برداری بعمل آید.

با پیشرفت شیمی درمانی در معالجه تسکین سرطان لوزالمعده بایستی قبل از شروع به درمان تشخیص قطعی داده شود چه در غیر اینصورت امکان دارد پانکراتیت مزمن تحت درمان قرار گیرد.

برای تشخیص میشود از بیوپسی سوزنی Duodenal - Tran استفاده نمود و باین طریق از ایجاد فیستول نیز جلوگیری می شود (گواینه که فیستول های پس از بیوپسی در صورتی که ضایعه با دقت تشریح و شکاف بیوپسی زیاد عمیق نباشد و بعد نیز محل بریدگی را با بخیه های غیر قابل جذب با دقت ببوشانند بندرت دیده میشود).

بیوپسی کبد - هسته های کبدی بایستی بیوپسی شوند.

هرآینه جراح در جریان عمل جراحی روی قولون سیگموئید هسته ای در لب راست کبد حس کند بهتر است با کمک دست از داخل شکم از جدار قدامی با سوزن Vini - Silverman بدون صدمه زدن به احشاء مجاور و ترس از خونریزی داخلی، بیوپسی بردارد.

بیوپسی معده - در موارد برخورد با قرحه سوراخ شده در صورتی که بتوان دقیقاً محل قرحه را تعیین کرد (مربوط به معده یا اثنی عشر) بخصوص در صورتی که بیمار در سنین سرطان باشد بایستی از قرحه بیوپسی برداشت در صورت بدخیم بودن عارضه بایستی در همان جلسه گاسترکتومی بعمل آورد.

هرآینه وضع عمومی بیمار جز سرمت سوراخ اجازه کار دیگر را ندهد بایستی از سه قسمت مختلف قرحه بیوپسی برداشت سپس قرحه را دوخت. در صورتی که نتیجه بیوپسی دال بر بدخیمی عارضه بود باید در یک جلسه دیگر گاسترکتومی برای بیمار انجام داد.

دستگاه تناسلی - دستگاه تناسلی زنها یکی دیگر از نواحی است که بدخیمی در آن

شایع است بنا براین تمام زنهایی که سنشان از ۲ گذشته است بایستی در معاینه مقرر سالیانه واژن و دهانه رحمشان، در صورت برخورد به عارضه مشکوک بیوپسی بعمل آورد. در غیر این صورت آزمایش Papanicolaou انجام میشود و در صورت مثبت بودن نتیجهٔ آزمایش باید Conization و دیلاتاسیون و کورتاژ بعمل آورد.

REFERENCES

- ۱- The Surgical Clinics of North America Vol 42 - No 2. April, 1962.
- ۲ - بخشنامهٔ جناب آقای دکتر آرمین استاد محترم و رئیس بخش آسیب شناسی دربارهٔ برداشتن بیوپسی
- ۳- آزمایش سیتولژیک - پلی کپی توسط خانم دکتر صغری آزرمی .