

عو ارض دیررس آفاسنیو وزهای لاترولا لارال رو ده

در سالهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره عوارض دیررس آناستوموزهای لاترولا لارال در جراحی رو دهها داده شده است و از همه مهمتر اوپرسرو اسیونهایی است که بخصوص درباره علائم انسدادی و تشکیل کیسه‌های بزرگ و از همه شایع تر اختلال عملی دهانه آناستوموز انتشار یافته است.

در تولید این اتساع و پیدا شدن کیسه‌ها در قسمت انتهای آناستوموز عقیده براین است که جدا کردن فیبرهای عضلات حلقوی احتمالاً موجب استاز مواد و گشاد شدن قسمت پروکسیمال رو ده می‌شود.

نشاردائی و حرکات دودی در روی قسمت بالائی (پروکسیمال) آناستوموز چنانچه در ابتدای ارتتصور بیرون باعث عوارض مذکور در فوق نمی‌شود بلکه از روی تجارب بالینی و مشاهدات آزمایشگاهی در روی سک کم کم روش شد که طول قسمتی از رو ده پروکسیمال (که بالای آناستوموز قرار دارد) معولاً بوسیله جراحی انوازینه شده و تو رفته است و از محل دهانه آناستوموز پائین تر قرار گیرد خیلی در تولید ناحیه اتساع یافته مؤثر است.

علائم بالینی - بطور کلی هرگاه علائم مبهم شکمی مزمنی در بیماری که سابقه دیگر آن استوموز رو ده بصورت اورژانس داشته دیده شود باید کلینیشن را بیاد این سندروم بیاندازد. بخصوص عن اگر در پرونده بیمار قید شده باشد که نوع آن استوموز لاترولا لارال بوده است و یا بطور کلی در پرونده نوع آن استوموز مشخص نشده باشد.

علائم معمولی که بیمار بعد از دراجعه مینماید یا پرشک در عاینه آنها را بپیدا می‌کند بطور خلاصه عبارتنداز:

دردهای پارکرین - تهوع - استفراغ - اکلوزیون‌های کامل یا غیر کامل سکرر . و نیز گاهی ملنا و یاتب‌های دورای همراه با مهمل و بی اشتھائی و خستگی تنها علائم تنظاهر کننده بیماری می‌باشند چنانچه عمل جراحی در کودکان یا جوانان انجام شده باشد ثابت ماندن وزن یا عدم رشد جسمانی فکر پر شکر را باید متوجه این سندروم نماید.

بیشتر این علائم بسبب استاز وعفونت درناحیه متسع روده گاهی نیز بعلت وزن زیاد این کیسهه پرازمواد داخل روده انسداد کامل بوجود میآید.

زمانی بسبب اتساع شدید وعفونتی که همیشه دراین قسمت وجود دارد زخمهائی در روده پیدا میشود که ممکن است سنجار به خونریزی شدید وحتی سوراخ شدن روده گردد. بطور کلی در مقابل یک ساقه آنستوموزقبلي وعلائم مبهم شکمی گاهی یک عکس ساده شکم یاتوم باتفیه باریم اطلاعات ذیقیمتی در اثبات این تشخیص در دسترس طبیب میگذارد از جمله ممکن است یک کیسهه متسع محتوی مایع و گاز زمایان شود یا بعلت فشار روی روده بزرگ یابد احساء دیگر این تشخیص مطرح میشود.

موضوع دیگری که اغلب دراین نوع بیماران دیده میشود دونوع کم خونی میکروسیتر و میکروسیتر است نوع میکروسیتر آن شاید همانظوریکه قبله یادآوری شد بعلت خونریزی در محل اولسراسیون ناحیه متسع پدید آید.

ولی دریاره کم خونی ساکروستیتر بنظر میرسد که وجود ورقابت فلور میکروبی غیر طبیعی دراین ناحیه اتساع یافته در جذب مواد اولیه متابلیک (پروتئین ها و ویتامین ها) نوع دوم کم خونی را پدید میآورند.

درمان این عوارض فقط با برداشتن قسمت معیوب و متسع و آنستوموز بیرون نه مجدد سربسر (ترمینوترمینال) صحیح اسکان پذیر میباشد.

تنها درمان طبی مغاید دراین سندرم درمان کم خونی هائی است که پاتوژنی آنها قبل گفته شد. درمان با تراشه مکلین خوارکی نیز تا از ازادی (بعلت ازین برد میکربهای غیر طبیعی) ازشت کم خونی کامته و بیمار را برای عمل چراخی آماده تر مینماید.

مسئله اغلب این آنستوموزهای لاترولا تراال توسط جراحان آساتور و یا درموارد فوری توسط کسانی که تعلیمات کافی و صحیح نداشته اند انجام میگیرد.

لذا اسکان بروز عوارض ناگزیره درسواردی که یک عمل روده در شرایط فوق الذکر انجام گرفته باشد همیشه موجود است.