

کلید و حاملگی

تحت عنوان کلید و حاملگی سعی خواهد شد اختلالات مهم دستگاه ادراری که در جریان حاملگی، متعاقب زایمان و سقط جنین بوجود می‌آید درینجا مورد بحث قرار گیرد. برای مهولات کار اختلالات کلیوی مربوط به حاملگی را بودسته زیر تقسیم مینمائیم:

بخش اول - اختلالات کلیوی در جریان حاملگی .

بخش دوم - آنوری‌های متعاقب زایمان - سقط جنین وغیره .

قبل از بحث درخصوص اختلالات کلیوی حاملگی این سؤال پیش خواهد آمد خانم کاملاً سالمی که تمام اعضاء بدن منجمله کلیدهای او ازسلامت کامل برخوردار است وقتی حامله شده چه تغییراتی در کلید از نظر عملی و تشریعی بوجود می‌آید. لازم به یادآوری نیست که تقریباً تمام اعضاء بدن در جریان حاملگی دستخوش یک تغییر فیزیولوژی می‌گردد که معمولاً این تغییر درجهت پرکاری است غیراز دستگاه تناسلی ویکی دو عضو کوچک دیگر که تغییرات آنها شامل تشریعی و عملی است در سایر دستگاه‌ها تغییرات نسبی و تشریعی بوجود نمی‌آید بلکه بیشتر تغییرات عملی و بطور کلی یک افزایاد فعالیت است. تمام کوشش اعضاء مختلف مادر درین مدت بارداری همه بخاطر این است که بوجودی بنام جنین درین او بروارانده شود، رشد نماید و بسرحد کمال رسد بعد زایمان انجام خواهد گرفت و بوجود بدنی خواهد آمد و در این موقع اعضاء کار خود را بطور معمول شروع می‌کنند و همه چیز به حال عادی برخواهد گشت جز یکی دو عضو دیگر که خود را برای تغذیه طفل آماده نموده و فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

در جریان حاملگی کلیدهای نیزه‌های پرکاری را دارند آزمایش‌ها و بررسی‌های گوناگون همه ثابت نموده است که کلیدهای تها بر قابلیت خود می‌افزایند و با بعارت دیگر این افزایش کارکلیدهای همراه با تغییرات نسبی نبوده بلکه صرفاً عملی است. در جریان حاملگی فیلتراسیون گلوسرولی و جریان خون کلیوی شدید خواهد شد باشد اذعان کرد که این پرکاری کلیدهای مثل پرکاری سایر اعضاء بدن مادر ابدآ نامطلوب نبوده و هیچگونه ناراحتی و مرضی برای

مادر تولید نخواهد بله کرد همانطور که در بالا ذکر شد بلطفاً اصله بعد از زایمان تمام خواهد شد قبل از پایان دادن باین مقدیه بدو موضوع ذیل باید اشاره شود یکی پیدایش اختلال در توئونیته و نقابخن و انبساط حالب ولگنجه و کالیس ها است که موجب بطی جریان ادرار شده وزینه مساعدی برای پیدایش عفونت ادراری یا پلیونفریت را فراهم خواهد ساخت و این ناراحتی گاهی بجهت فشار رحم روی حالب شدیدتر می گردد.

نتکنند دیگر تغییراتی است که درستابولیسم آب و نمک درین خانم های حامله پیدا نمی شود معمولاً خانمی که حامله می شود بدنش میل به پرآبی و احتباس آب پیدا می کند. خیز کمی سراسر بدن را فرا می گیرد که معمولاً گوده نمی گذارد وینظر میرسد زن چاق شده است پوست بدنه کشیده ویراق می شود پاتوقنی آن کاملاً روشن نیست. بعضی علت آنرا از دیادجنب مجدد آب و سدیم در لوله های ادراری میدانند که شاید هورن ها در اینجا بی ذخالت نباشند باید متذکر شد چنانچه این خیز شدید بود زن حامله باید تحت دقت و بررسی از نظر اختلالات کلیوی حاملگی قرار گیرد.

بخش اول - اختلالات کلیوی در جریان حاملگی

تقسیم بندی های مختلفی بوسیله مصنفوں پیشنهاد شده است که ساده ترین آنها در اینجا سورد بحث قرار خواهد گرفت. طبق این تقسیم بندی اختلالات کلیوی در جریان حاملگی تحت چهار شکل ذیل سورد بررسی واقع می گردد:

الف- نفروپاتی های حاملگی خالص(Toxémies gravidiques pures) است که هیچ گونه سابقه ناراحتی های کلیوی را نداشته و از نظر کلیوی کاملاً سالم بوده و در جریان حاملگی دچار ناراحتی کلیوی می گردد اشکال بالینی مختلفی دارد که بعداً به شرح آنها خواهیم پرداخت.

ب - نفروپاتی های اضافی در جریان حاملگی یا توکسمی اضافی(Toxémies surajoutées) در این شکل بیمارانی قرار دارند که برخلاف دسته اول قبل از حاملگی ناراحتی قدیمی و مزمن کلیوی داشته اند و در جریان حاملگی ناراحتی کلیوی بیمار بروز نموده و یا شدت می یابد و در حقیقت توکسمی حاملگی با آن اضافه شده است.

پ - توکسمی های عود کننده(Les toxémies gravidiques récidivantes) - این شکل بیشتر مورد توجه مصنفوں فرانسوی بوده و در نوشته های آنها دیده می شود شخصوصاً میلیز (Milliez) : صفت فرانسوی در تقسیم بندی های خود بکار بیبرد. این شکل نفروپاتی در جریان حاملگی بروز نموده و با خاتمه حاملگی نفروپاتی نیز پایان می پذیرد.

ت - بالاخره عفونت دستگاه ادراری یا پلیونفریت حاملگی است که در جریان حاملگی

و گاهی متعاقب زایمان بوجود می‌آید.

نکته مهم - قبل از بحث درباره نفروپاتی‌های حاملگی یادآوری یک نکته مهم ضروری است و آن تشخیص و کشف ناراحتی کلیوی حاملگی بطور زودرس است. زیرا وقتی این ناراحتی‌ها در همان ابتدا و شروع بیماری شناخته شد برای میتوان از سخت شدن آنها جلوگیری نموده و تاحدودی از رگوپیر جنین جلوگیری می‌گردد. برای تشخیص زودرس لازم است برنامه زیرا برای هرخانمی که باردار می‌شود بمورد اجرا گذاشت و هر خانم حامله از ماه اول حاملگی تاموقع زایمان تحت نظر و مراقبت دقیق باشد بدین ترتیب که از ماه اول حاملگی تاماه ششم هر ماه و از ماه ششم تاموقع زایمان هر روز باید امتحانات ذیل از یک خانم حامله انجام شود.

۱- توزیع خانم حامله و ثبت آن در کارت مخصوص ، باید توجه داشت که یک اضافه وزن غیرطبیعی باید طبیب را متوجه بروز خیزند بیمار نماید و همان ظور که بعد آخواهیم دید خیزیکی از علائم شایع و گاهی اولین علامت نفروپاتی حاملگی است.

باید دانست که در سه ماهه آخر یک زن حامله نباید هر هفته بیش از ۳۰۰ گرم اضافه وزن داشته باشد اگرچنان بود باید متنوže به پیدایش عارضه مرضی بوده فوراً دستوراتی برای پیش‌گیری از وخیم شدن آن داد و مراقبت و توجه پیشتری را مبذول داشت.

۲- فشارخون گرفته شود و در همان کارت نوشته شود کوچکترین افزایش فشارخون باید سورد دقت قرار گیرد و کارهای احتیاطی را رعایت باید نمود.

۳- امتحان ادرار از نظر وجود آلبومینوری .

این مواظبت و مراقبت از ریکاخانم حامله به ترتیب فوق ممکن است بوسیله یک طبیب یا پزشک متخصص زنان انجام شود در هر حال بمحض پیدایش و بروز کوچکترین علامت سرپی لازم است خانم حامله تحت نظر مداوای یک طبیب کارداران بیماریهای کلیوی قرار گیرد و ضمن مداوا احتمال دارد نیاز بدخالت جراح و متخصص بیماریهای زنان باشد در هر حال باید اذعان کرد که مداوای نفروپاتیهای حاملگی یک همکاری بسیار دقیق و نزدیکی را بین طبیب وجراح زنان ایجاد می‌نماید و این همکاری است که منجر به نجات بموقع جنین و مادر خواهد شد.

الف - نفروپاتیهای حاملگی خالص .

همان ظور که قبل گفتیم این شکل نفروپاتیهای حاملگی عبارت از این است خانمی که هیچ اختلال کلیوی از این نداشته حال در جریان حاملگی دچار ناراحتی کلیوی می‌گردد و در حقیقت اختلالاتی که بوجود آمده همه ناشی از حاملگی وجود جنین در بدن مادر است

که بازیمان و خروج جنین از بدن مادر در غالب بوارد تمام علائم ازین میروند این نوع نفروپاتی یعنی توکسمی حاملگی خالص دارای خصوصیات ذیل است:

عمولاً نزد خانم‌های جوان و در حاملگی اول بروز می‌کند Primivare و شروع بیماری در سدهماه آخر حاملگی است. و بندرت بالا فصله بعد از زایمان دیده شده است. چنانچه حاملگی دوقلو و یا هیدرآمینوس (Hydramnios) و یا مول عیداتی فرم در کار باشد امکان پیدایش نفروپاتی حاملگی زیاد خواهد شد.

علائم نفروپاتیهای حاملگی - سه علامت ذیل میمترین علائم نفروپاتی حاملگی است. و بمجموعه این سه علامت بنام سه‌پایه یا تریاد توکسمی حاملگی نام دارد.

- زیادی فشارخون یا هیدرتوسانیون (Triade toxémique).

- خیز.

- آبومینوری.

درخصوص دو علامت دیگر کلیوی نارسائی کلیوی یا اورمی و دیگری ضایعهٔ ته چشم باید یادآور شد که این دو علامت در جریان نفروپاتیهای حاملگی زیاد جلب توجه خواهد کرد. بندرت در اشکال سخت که همراه اولیگوری باشد ممکن است اوره خون بالا رود و علائم نارسائی کلیه بوجود آید.

دروته چشم بیماران بستنی به نفروپاتی حاملگی خالص عمولاً خاید شدیدی وجود ندارد غالباً یک حالت اسپاسم در شرائین دیده میشود و گاهی در اشکال سخت و اکلامپسی (Eclampsie) این اسپاسم شرائین ته چشم بقدرتی شدید میشود که کوری موقتی عارض بیمار خواهد شد ولی این کوری موقتی وزود گذر بوده و باصلاح و درمان اکلامپسی ازین میرود بطور کلی در جریان نفروپاتیهای حاملگی خالص این دو علامت کلیوی زیاد جلب توجه نمی‌کند و هر وقت زیاد بارز و جلب توجه کرد بیشتر باید فکر نمود که نفروپاتی حاملگی خالص نبوده و از سابق ممکن است یک نفروپاتی قدیمی وجود داشته که حاملگی آنرا شدت داده است.

اشکال بالینی نفروپاتی حاملگی خالص - برحسب شدت علائم فوق و اضافه

شدن بعضی علائم دیگر اشکال بالینی ذیل را بوجود خواهد آورد:

۱- پراکلامپسی سبک (La prééclampsie légère) در اینجا علائم فوق العاده خفیف و شامل دو علامت هم بیشتر خواهد بود. یکی بالارفتن سخت‌صرفشارخون (عمولاً در اطراف ۵ سانتی‌متر جیوه برای ماکزیما و ۱ سانتی‌متر جیوه برای سی‌نیما) و دیگری خیز که

این علامت نیز فوق العاده خفیف بوده و گاهی تنها با وزن کردن مرتب بیمار کشف شده است. این شکل نفروپاتی حاملگی سبک‌ترین و ساده‌ترین آنها بوده و با مختصر تدایر درمانی و مراعات بعضی نکات رژیمی و بهداشتی غالباً رویاصلاح می‌رود و بدون اینکه شدت پیدا کند حاملگی به آخر بیرسد وزایمان انجام می‌شود و پس از وضع حمل و خالی شدن رحم تمام علائم نیازصلاح شده و شفای کامل نصیب بیمارخواهد شد.

۲- پراکلامپسی شدید (La prééclampsie sévère) - در اینجا تقریباً هرمه علامت وجود دارد که واضح و شدید نیز بایشند:

- خیز نسبت شدید و تمام بدن را فراگرفته و گوده می‌گذارد.

- زیادی فشارخون برابر و یا بیش از هفده برای ماکزیما و دهبرای می‌نماید.

- آلبومینوری ساوه یا بیش از ۲ گرم در ۲ ساعت خواهد بود.

این بیماران بخاطر شدت علائم بخصوص فشارخون بالا از یک سری اختلالات عملی از قبیل سرد رد - مگس پران در مقابل چشم‌ها - درد ابی گاستر - تهوع و استفراغ شکایت دارند. حالت عمومی بیماران برخلاف دسته قبل رضایت‌بخش نیست در این دسته باید به شدت تدایر احتیاطی و مداوائی را بکار برد زیرا خطر، هم جنین و هم مادر را تهدید می‌کند.

۳- اکلامپسی (Eclampsie) دارای تابلوذیل می‌باشد.

هرمه علامت بالا یعنی خیز - زیادی فشارخون و بالاخره آلبومینوری وجود دارد مخففاً با یینکه دو علامت دیگر نیز دیده می‌شود و بخاطر پیدایش این دو علامت اضافی است که نام اکلامپسی بخود خواهد گرفت این دو علامت عبارتند از یکی تشنج (Convulsion) و دیگری اغماء که همراه با تشنج غالباً دیده می‌شود. اکلامپسی وحیم‌ترین شکل نفروپاتی گراویدیک است. تشنج و اغماء دائمی بیمار را رنج می‌دهد بیمار باطراف دیگر توجه ندارد گاهی کوری موقعی پعلت اسپاسم‌شدید شرائین ته‌چشم پیدا می‌شود در این شکل نفروپاتی خطربرگ جنین در رحم فوق العاده زیاد است. بعلاوه در هر حمله و تشنج برای مادر نیز خطراتی از قبیل خیز حاد ریه - خون‌ریزی مغزی و نارسائی حاد قلب وجود دارد در چنین مواردی تدایر و مداوای لازم که بعداً بدان اشاره خواهد شد باید بکار رود و غالباً هم بی‌نتیجه خواهد بود و در این قطعی عبارت از خالی کردن رحم است که باید بدون ازدست دادن فرصلت انجام گیرد و چون غالباً اکلامپسی در ماههای آخر حاملگی است و جنین قابلیت زندگی کردن را دارد معمولاً اقدام به تسریع زایمان خواهد شد. و با خروج جنین از بدن مادر تمام علائم اکلامپسی بسرعت درست کوتاهی ازین خواهد رفت و بندرت یادگار از خود باقی می‌گذارد.

دربواردی که نفروپاتی بعداز زایمان ادامه پیدا کند بیشتر باید فکر کرد که نفروپاتی حاملگی خالص نبوده و نفروپاتی قدیمی بوده و در جریان حاملگی بروز نموده و یا شدت یافته و علائم اکلامپسی بآن اضافه شده است.

در جریان نفروپاتی حاملگی یا اکلامپسی پیش آگهی از نظر جنین و از نظر مادر و نحوه زایمان های بعدی مادر باید مورد بحث و دقت قرار گیرد.

آمار نشان داده است که هر قدر نفروپاتی حاملگی شدیدتر باشد پورسانتاز مرگ و میر جنین در داخل رحم زیادتر است. بطوریکه در پر اکلامپسی خفیف میزان مرگ جنین خیلی کم است غالباً با تداویر لازم حاملگی با خر میرمه برعکس در موقعی که اکلامپسی وجود دارد شанс مرگ جنین در داخل رحم زیاد میباشد.

دربواردی که اکلامپسی شدید است مادر نیز از نظر بعضی عوارض درمان نخواهد بود بطوریکه در جریان تشنج و اکلامپسی، عوارضی از قبیل خونریزی، غزی - خیزحداد ریه و نارسائی قلبی مادر را تهدید می کند بهمین جهت دراکلامپسی وقتی جنین قابلیت زندگی داشته باشد یعنی بهسنی رسیده باشد که ادامه حیات در خارج از رحم برای او مقدور باشد باشد باید به حاملگی خانمه داد یا زایمان را تسريع نمود و یا بعلی سزارین می کنندتا بدین ترتیب هم جنین و هم مادر از خطراتی که آنها را تهدید می کنند نجات یابند. چه بسا خود بدن دفاع می کند و در جریان یکی از تشنج ها سقط جنین انجام می گیرد پجه مrede یا زنده خارج میگردد و تمام علائم اکلامپسی بتدربیج بعداز زایمان و خالی شدن رحم رو باصلاح میرونند معمولاً در حدود ۳ هفته بعداز خالی شدن رحم علائم ازین میرونند وشار خون طبیعی میشود و بعضی معتقدند چنانچه بعداز این مدت فشار خون طبیعی نشود نفروپاتی باقی مانده است.

آمار ذیل از پروفسور میلیز (Millicz) از ۸۹ مورد نفروپاتی حاملگی خالص است که پورسانتاز مرگ و میر جنین را داخل رحم بر حسب شدت بیماری نشان می دهد.

تعداد و شکل اکلامپسی	مرگ جنین	نسبت درصد مرگ جنین
۱۱ مورد پراکلامپسی خفیف	.	.
۴۰ مورد پراکلامپسی شدید	۱۵	۳۸ درصد
۱۶ مورد اکلامپسی	۱۶	۴۲ درصد

نکته دیگر قابل توجه اینکه نزد خانمی کددریک حاملگی دچار نفروپاتی حاملگی خالص نیشود زایمان های بعدی چه خواهد شد در پاسخ این سؤال باید متذکر شد که خوشبختانه از خصوصیات نفروپاتی خالص حاملگی این است که وقتی علائم آن بکلی ازین رفت

حامملگی های بعدی بدون عارضه بوده و بقیه جو چه تکرار نخواهد شد و بین درت ممکن است شکل عود کننده در حاملگی های بعدی بخود بگیرد . یکی از مصنفین دو شرح ذیل را گزارش نموده است.

خانمی در اولین حاملگی خود دچار اکلامپسی می شود بعد از زایمان کاملاً خوب می شود در حاملگی دوم و سوم مختصر آلبومینوری وخیز پیدا می شود و چهار حاملگی بعد بدون کوچکترین عارضه می پری شده است.

در شرح حال دیگر خانمی را گزارش می کند که در سن ۲۳ سالگی در اولین حاملگی دچار اکلامپسی می شود بعد از زایمان تمام علائم خوب شده و بیمار شفای کامل پیدا می کند در حاملگی دوم آلبومینوری وخیز پیدا می کند فشار خون بیمار عادی بوده و ماه هفتم حاملگی چنین مرده ساقط می شود و چند ماه بعد از سقط بقدیریغ فشار خون بالا می رود . خیز و آلبومینوری و زیادی فشار خون همانطور ادامه پیدا می کند و روز بروز شدت می یابد بطوریکه در سن ۴۳ سالگی این خانم درنتیجه پیدایش یک عارضه فشار خون فوت می کند پس بندرت ممکن است متعاقب یک نفوropاتی حاملگی خالص در حاملگی های بعدی عارضه تکرار شود و با ادامه پیدا کند.

اشکال غیرمعمول و اضافی - در جریان نفوropاتی حاملگی گاهی آلبومینوری خیابی شدید می شود و تغییرات پرونده ای خون شباخت به سندروم نفروتیک پیدا می کند و بنظر میرسد که نفوropاتی حاملگی یک حالت سندروم نفروتیک بخود گرفته است . وجه بسا در جریان حاملگی ممکن است یک سندروم نفروتیک یا گلومرولیت سامپرانوز پیدا شود که ایدا با حاملگی نیز ارتباطی نداشته باشد و مطابق معمول باید تحت مداوای مخصوص سندروم نفروتیک قرار گیرد.

آسیب شناسی کلمیه در جریان نفوropاتی حاملگی - در نفوropاتیهای حاملگی خالص خاید در گلومرول ها است . تا قبل از پیدایش میکروسکوپ الکترونی بیشتر تصور می شد که آسیب اساسی در سامپران بازال بوده و سلولهای آندوتیال نیز متورم و یک حالت باد کردگی (Turgescence تورژسانس) دارند ولی بعد از بررسی پامیکروسکوپ الکترونی ملاحظه شد که سامپران بازال هیچ نوع ضایعه ندارد و ضایعه اصلی در سلولهای آندوتیال است سلولهای آندوتیال گلومرول متورم و تورژسانس دارند و علاوه بر آن دپوهائی (Dépot) از جنس فبرینوئید بین سامپران بازال و سلولهای آندوتیال دیده می شود .
فیزیو پاتولوژی - گفتند که نفوropاتی حاملگی با سعادت خیز آلبومینوری و زیادی

فشار خون یعنی تریاد توکسیمیک ظاهر می‌شود که در نوع شدید آن تشنج و اغماء با ان اخافه خواهد شد.

تاکنون با پیشرفت هائی که در همه زمینه‌های طب بخصوص درنفوژی انجام گرفته است هنوز پاتوژنی و چگونگی پیدایش نفروپاتی حاملگی و برقراری علائم آن روشن نشده است. آنچه که حاملگی درین ایجاد توکسمی مینماید و این توکسمی ایجاد خیز وزیادی فشار خون و متعاقب زیادی فشار خون خیز مغز و آنسفالوپاتی هیبتانسیو ونتیجند اغماء و تشنج گربانگیر بیمار خواهد شد وبالاخره همین توکسمی درین تولید آسیب کلیه بهمان ترتیب که ذکر شد می‌کند که آلبومینوری نزد بیمار ترجمان آن خایجه گلوبول خواهد بود.

خیز
تشنج و اغماء → زیادی فشار خون → توکسمی (?) → حاملگی
آلبومنوری → آسیب کلیه

توکسمی در جریان حاملگی چیست؟ هنوز باین سوال پاسخ قانون کنندۀ داده نشده است چه عواملی در اثر حاملگی درین بوجود می‌آید آیا ترشح موادی می‌شود از راه اعصاب اثر می‌گذارد آیا هورمن‌های طبیعی بدین در مقدار و ترشح آنها اختلالاتی بوجود آمده هنوز روشن نیست.

بعضی این اختلالات را معلول اختلال در جریان خون رحم وجفت که متجر به ایسکمی در این اعضا و ترشح ماده هیبتانسیوزنمازیدند، برخی معتقدند که ترشح آلدوسترون زیاد شده باشد و ناراحتی‌های بیمار بهمان علت باشد ولی در عمل آلدوسترون ادرار زیاد نیست بعضی سندروم آدابتاسیون و ازدیاد ترشح غده سورنال را در نظر می‌گیرند ولی اندازه گیری هورمنهای سورنال درین هیچ‌گونه افزایشی را نشان نداده است. بالاخره بعضی اختلال درهورنهای جنسی را مقصر دانسته‌اند زیرا غالباً دیده می‌شود که نزد خانم‌های که دچار نفروپاتی حاملگی هستند گونادوتروفین کربوئنیک (Gonadotrophine chorionique) که از جفت ترشح می‌شود خیلی زیاد می‌شود و بر عکس سیزان فولیکولین ادرار پائین است و همچنین پرگناندیول (Pregnandiol) که نماینده پروژسترون در ادرار است کم می‌گردد بهمین جهت بعضی پیشنهاد می‌کنند در نفروپاتی‌های حاملگی خفیف یعنی پراکلامپسی‌های خفیف چنانچه فولیکولین و لوتنین در ادرار خیلی کم شده باشد برای جلوگیری از شدت یافتن آن می‌توان به تزریق این هورمن‌ها اقدام نمود.

درمان

پیش گیری: پیش گیری این بیماری در جریان حاملگی فوق العاده حائز اهمیت است زیرا همینکه نفروپاتی حاملگی خود را نشان داد با تدابیری میتوان از شدید و مخت خطرناک شدن آن جلو گیری نمود برای این منظور لازم است بیماری هرچه زودتر کشف شود بدین ترتیب هر خانم حامله باید از همان اول تحت نظر بوده و نزد او جستجوی علائم نفروپاتی حاملگی ای در بی انجام شود.

شش سال اول حاملگی هر ماه و ماه آخر هر هفته آزمایش ذیل باید انجام شده و ورقه مخصوص که مشخصات خانم حامله در آن میباشد ثبت گردد.

- توزیع خانم حامله .

- اندازه گیری فشارخون .

- آزمایش ادرار از نظر وجود آلبومنوری .

همانطور که در بالا ذکر شد با کوچکترین اضافه وزن غیر معمول و پیدایش خیز و یا افزایش سختسر فشارخون باید بیمار تحت مراقبت دقیق قرار گیرد و برای جلو گیری از شدید شدن آن فوراً باید تجویز رژیم بی نمک نمود بطوریکه روزانه مقدار نمک مصرفی از ۲ گرم نباید تجاوز نماید و این رژیم بی نمک در پیشگیری از شدید شدن بیماری بنحو شایسته مؤثر خواهد بود. رژیم روزانه ذیل دارای کمتر از ۲ گرم کلرور دو سدیم (کمتر از ۴ میلی گرام سدیم)

خواهد بود :

گوشت	۱۰۰	گرم
سبز زمینی	۲۰۰	«
پات بدون تخم مرغ	۱۰۰	«
نان بدون نمک	۱۰۰	«
شیر بدون نمک	۲۰۰	«

بیمار مجاز است بهره مدار از موادی از قبیل برنج - سبزیجات - حبوبات سبز - میوه - عسل - کمپوت - آبلیمو - سرکه - روغن زیتون - قهوه - آب میوه وغیره استفاده نماید. از نوشیدن آب های معدنی مثل آب ویشی و غیره و کنسروها که معمولاً دارای مقدار زیاد نمک هستند باید خودداری گردد.

چنین رژیمی از نظر مقدار سدیم خیلی فقر و مطلوب است ولی مقدار پرتوثین آن ناچیز و کمتر از آن مقداری است که باید یک خانم حامله مصرف نماید مخففاً با یافته غالب اکلام پسی ها و بطور کلی نفروپاتی های حاملگی با هیپوپرتوثین امی (کمبود پرتوثین خون)

هرگاه هستند. و بالا جبار باید بیزان پر تیبد رژیم فوق را افزایش داد گرچه با این ترتیب مقدار سدیم این رژیم زیاد خواهد شد.

آب - آب را نباید محدود نمود زیرا بیماران با اندازه کافی ادرار دارند فقط در او لیگوری شدید باید آب را محدود به بیزان احتیاج بیمار نمود.

دیبورتیک‌ها - در موقعی که خیز زیاد وجود دارد تجویزدیبورتیک‌های سولنایدی از قبیل کلروتیازیدها مجاز است مثلاً باینکه روی فشار خون بیمار نیز مؤثر است دیبورتیک را بطور متابوب باید داد بدین ترتیب که روز داده شود چند روزی قطع گردد و دوباره شروع شود، در موقع تجویزدیبورتیک‌ها باید بدپتاسیم خون بیمار توجه داشت.

داروهای پائین آورنده فشار خون - چنانچه فشار خون بالا بود از تمام داروهای خدف فشار خون میتوان استفاده نمود - رزپرین - هیدرازینوفتالازین - گوانیتیدین هامشل ایسمیلین (Ismilene) و الدموت (Aldomet) وغیره.

برای مداوای تشنج باید از کلیه داروهای مسکن استفاده نمود - لوپینال - برسورهای کلرال (تئیله کلرال ۲ تا ۴ گرم در روز) و از ترکیبات کلرپرومazine ها مثل اسپارین ولار کاتیل برای تمسکین تشنج میتوان بکار برد - تزریق سولفات دومینزی ۰.۳ تا ۰.۳ درصد داخل وریده (هزه ساعت .۰.۶ سانتیمتر-کعب) در پائین آوردن فشار خون و بهبود تشنج مؤثر است.

پونکسیون لمبر و گوفتن خون (در حدود .۰.۴ تا .۰.۵ سانتیمتر-کعب) در پائین آوردن فشار خون و برطرف کردن خیز مغز و اغماء و تشنج بیمار نمی‌باشد. و چنانچه نفوپاتی شدید تشنج واکلامپسی وجود داشت و تدایر فوق چندان تأثیری نداشت لازم است فوراً اقدام به خارج کردن جنبن شود و باحالی شدن رحم تمام ناراحتی های بیمار پایان خواهد رسید.

بطور کلی در مداوای نفوپاتی باید یادآور شد که تدایر درمانی فقط در اشکال خفیف و سبک بیماری مؤثر است و در اکلامپسی واشکال شدید مداوا چندان تأثیری نداشت و درمان اساسی خاتمه دادن بدزایمان است و همانطور که گفته شد چون خوشبختانه بروز اکلامپسی در راههای آخر حاملگی است یعنی در موقعی است که جنبن قابلیت زندگی در خارج را دارد میتوان زایمان را تسریع نمود و یا در بعضی موارد بندرت اقدام به سزارین خواهد شد.

ب - نفر و پاتیهای قدیمی که در اثر حاملگی بروزو باشد یافته‌اند.

در اینجا خانمی است که قبل از حاملگی دچار زیادی فشار خون یا بیماری کلیوی (نفریت) شده که شناخته یا مخفی بوده است. و در جریان حاملگی شدید و یا آشکار گردیده است. در چنین مواردی که نفوپاتی از سابق وجود داشته دارای خصوصیاتی است که بیتوان از نفوپاتیهای خالص حاملگی تمیز داد این دسته از نفوپاتی ها عمولاً نزد خانم هایی که

پیش از .۳ سال دارند ظاهر می شود و غالباً و معمولاً چندبار وضع حمل انجام داده اند (مولتیپار) و شروع آن خیلی زودرس بوده یعنی در بیان های اول حاملگی است. علائم دراینجا عبارتند از: عدم علامت پراکلامپسی (ارقبیل خیز - آلبومینوری - زیادی فشار خون وغیره) و گاهی تابلو اکلامپسی یعنی تشنج نیز با ان علاوه می شود در این شکل نفروپاتی علامت ته چشمی بارز و پیش رفته دیده می شود و آزمایش های عملی کایه مختلط می باشد یعنی غالباً اوره خون بالا است. از نظر پیش آگاهی این نوع نفروپاتی هم برای جنین وهم برای مادر فوق العاده خطرناک است خطر سقط جنین نزدیک بیمار مبتلی به نفروپاتی مزمن خیلی زیاد است و از طرف دیگر حاملگی نفروپاتی مزمن مادر را شدید خواهد نمود. بهمین جهت توصیه می شود خانمی که دچار به یک نفروپاتی قدیمی است حتی المقدور باید از حامله شدن خودداری نماید و چنانچه حامله شد در همان ماه های اول بهتر است فوراً اقدام به سقط شود و چنانچه در ماه های آخر حاملگی باشد و علامت نفروپاتی زیاد شدید نباشد میتوان بیمار را با تدایر لازم حاملگی را حفظ نموده و بد انتها رساند ولی باید اذعان کرد که همیشه خطر سقط جنین و شدت یافتن بیماری قدیمی کلید مادر وجود دارد.

گاهی خانمی قبل از حاملگی دچار زیادی فشار خون بعل مختلف مثل فکو کروموزیتوم می باشد و حاملگی موجب شدید شدن بیماری و برقاری تابلو اکلامپسی می گردد که باین بیماری گرچه نادر است ولی باید توجه داشت. درمان نفروپاتی های قدیمی علامتی خواهد بود و ضمناً علت نفروپاتی مزمن را در نظر گرفت و در صورت امکان مداوا نمود.

پ- نفروپاتی های حاملگی عود گفند (Nephropathies gravidiques recidivantes) این یک شکل نادری است که تا حدودی خواص نفروپاتی های دسته قبل را دارد بروز آن زودرس و در بیان های میانی یعنی چهارم یا پنجم حاملگی است. تابلو اکلامپسی بعد از زایمان خواهد رفت و بیمار بکلی خوب می شود و تا حاملگی بعد هیچ ناراحتی کلیوی ندارد و در حاملگی بعد دوباره تمام علامت ظاهر شده و بعد از زایمان نیز اصلاح می گردد و چون فقط در موقع حاملگی ظاهر می شود بهمین جهت نام نفروپاتی عود گفته دارد البته خطر ازمان بعد از چندبار عود وجود دارد.

ت- عفونت های دستگاه ادراری در جریان حاملگی خیلی شایع هستند و یک خانم حامله همیشه مستعد عفونت ادراری است. پیلوفریت حاد چه در جریان حاملگی و چه بعد از زایمان متعاقب سوند زدن دیده می شود تابلوی بالینی غالباً باتب و لرز و درد پشت و اختلال ادراری و تکرار و سوزش ادرار و بالاخره پیوری و لوکوسیت اوری همراه است. و گاهی علامت

خفیفتر ویماری بی سروصدای است بهمین جهت نزد یک خانم حامله گاه گاهی از نظر عنونت دستگاه ادراری باید امتحان شود و این بررسی شامل کشت ادرار و تعیین میزان لوکوسیت ادرار است، که هر موقع سرشی نشان دهد باید فوراً اقدام به درمان و تجویز آنتی بیوتیک گردد. خوشبختانه امروز با وجود آنتی بیوتیک های مؤثر و تفاوت چنانچه اشکال اختلال مهمی سراه مجاری ادراری نباشد این شکل توبولونفریت بسرعت اصلاح خواهد شد.

بخش دوم - آنوری های حاملگی

بالآخره در پایان این مقاله بی مناسبت نیست که اشاره بآنوری ها و بطور کلی نارسائیهای حاد کلیه در جریان حاملگی ویا متعاقب زایمان و سقط جنین شود.

برای اینکه علل این آنوری ها بهتر روشش شود آماری از آنوری های حاملگی مربوط به سرویس پروفسور هامبورژه و یک بخش زایمان در پایان مورد آن متعاقب سقط جنین بوده و این آمار شامل ۲۰۱ مورد آنوری است که ۹۳ مورد آن متعاقب سقط جنین بوده و بیماران ابتدا چار سپتی سمی پرفرنژنس و همولیز شدید گلبول قربن شده و سپس توبولونفریت حاد و آنوری برقرار گردیده و فقط چند موردی توبولونفریت آنها بعلت خونریزی شدید و شوک و کلابسوس عروقی بوده است.

۸ مورد آنها بعلت نفروپاتی قدیمی و قبلی بوده که حاملگی آنرا شدید نموده و با آنوری منجر شده است و یقیه یعنی ۱۱ مورد آن توبولونفریت حاد بوده که بعلل خون ریزی و یا ترانسفروزیون های ناجور متعاقب زایمان ایجاد گردیده است.

بندرت اسکان دارد متعاقب زایمان آنوری بعلت نکروز کورتیکال کلیه ها باشد

(Necrose corticale)

آنوری بپرعلت باشد این بیماران تابلوی شترکی خواهند داشت که عبارت از نارسائی حاد کلیه همراه با اختلالات شدید آبی والکترولیتی و احتباس مواد ازته (مثل اووه وغیره) است که در بیان واحدی خواهند داشت که عبارت از رانیماسیون یعنی تنظیم آب والکترولیتی های بدنه و در صورت لزوم استفاده از تصفیه های خارج کلیوی مثل کلیمه مینیموعی و دیالیز صفائی میباشد.

خلاصه و نتیجه

خوشبختانه حاملگی در غالب موارد بدون پیدایش کوچکترین ناراحتی کلیوی بپایان میرسد فقط در بعضی موارد که تعدادشان زیاد نیست بنا راحتی های کلیوی همراه خواهد شد. اینگونه ناراحتی های کلیوی را میتوان بدو دسته تقسیم نمود. قسمت اول اختلالات کلیوی در جریان حاملگی است که شامل بیماریهای ذیل میباشد:

- ۱- نفروپاتی های حاملگی خالص که از نظر بالینی برحسب شدت علائم به اشکال پراکلامپسی خفیف ، پراکلامپسی شدید و بالا خرۀ اکلامپسی تقسیم میگردد .
- ۲- نفروپاتی های اضافی در جریان حاملگی یاتوکسمی اضافی است که منظور نفروپاتیها و فشارخون های قدیمی و قبلی است که حاملگی آنها را شدت داده و یا سوجب آشکار شدن آنها میگردد .
- ۳- نفروپاتی های عود کننده است که فقط در موقع حاملگی بوجود آمده و بعد از زایمان تمام علائم ازین سیرود . و در حاملگی بعدی دوباره تمام علائم نفروپاتی و فشار خون ظاهر خواهد شد .
- ۴- عفونت دستگاه ادرار یا پیلو نفریت حاملگی است که در جریان حاملگی و یا بعد از زایمان برقرار میگردد .
- قسمت دوم آنوری های حاملگی است که غالباً آنها توبولو نفریت حاد بوده که متعاقب سطح جنین ظاهر میشود . و در بان آن رانیماسیون و استفاده از تصفیه های خارج کلیوی مثل کلیه مصنوعی و دیالیز صفاقي است . و بندرت خون ریزیها شدید متعاقب زایمان سوجب توبولو نفریت حاد و آنوری میگردد .

Références

- 1- James Hopper, Renal lesions in pregnancy, obstetrics and gynecology- 1961
- 2- Alagille et J. Cronier, Les accidents renaux de la grossesse et de l'avortement 1957
- 3- Fishberg - Hypertension Nephritis 1954
- 4 - Current, Diagnosis, Treatment 1965
- 5 - F. Reubi, Nephrologie clinique 1961