

نامه دانشکده پرستشی «تهران»

شماره پنجم از سال بیست و دوم
بهمن ماه ۱۳۴۳

جستجوها و کارآوریهای علمی

دکتر حمید اعتبراً

دکتر منوچهر رحیمی

تئرالوژی فالو

از کارهای بخش جراحی قفسه صدری بیمارستان بهلوی

تئرالوژی فالو یکی از شایعترین علل سیانوز ناشی از نادنگاریهای سادرزادی قلب و عروق در بچه هاست و نکته قابل توجه این بیماری آنستکه بوسیله عمل جراحی اصلاح پذیر میباشد این بیماری در ۱۸۸۸ توسط Fallot شرح داده شد وسپس بتدريج با تشریح کامل علت سیانوز و مخلوط شدن خون قرمز و تیره (شريانی و وریدی) و سایر نکات فيزيولوژی و فيزيوپاتولوژی این بیماری توسط Taussig قدم بسیار مهمی در راه معالجه این بیماری که فقط و فقط عمل جراحی است برداشته شد.

تشریح مرضی - از نقطه نظر تشریح مرضی این بیماری شامل چهار خابده مهم در

ه استادیار بخش جراحی قفسه سینه

دستگاه قلب و عروق است که عبارتنداز:

- ۱- تنگی شریان ریوی که خود برد نوع است Infundibulaire Valvulaire تامدتها راجع باینکه کدامیک از دونوع فوق بیشتر وجود دارد بحث بود ولی اخیراً برآثر مطالعات و براساس آمار ثابت شده که نوع دوم یعنی Infundibulaire بیشتر است و این مسئله امروزه قطعیت یافته و سورد قبول عامه واقع شده است.
 - گاهی بجای تنگی شریان ریوی آترزی شریان ریوی دیده میشود که در اینصورت انجام هرگونه عمل جراحی اساسی و آناستوموز را غیر ممکن میکند.
 - ۲- ارتباط بین دوبطن: محل ثابت این سوراخ بین دو بطん در زیر محلی است که آئورت و شریان ریوی شروع و از بطنهای خارج میشوند و باین ترتیب ناخنچاری سوم این بیماری ایجاد میشود.
 - ۳- انترپوزیسیون آئورت: بعلت ارتباط بین دوبطن و وضع خاص تشريحی موجود بین این سوراخ و بدأ آئورت متداری ازخون هردو قلب وارد آئورت میشود.
 - ۴- بزرگی (هیپرتروفی) قلب راست. بعلت تنگی شریان ریوی و نیز کار بیشتر قلب راست از نظر انترپوزیسیون آئورت قلب راست بزرگ میشود و گاهی جدار آن مساوی و حتی کلفت تراز بطنهای چپ میگردد.
- غیر از چهار ناخنچاری اصلی که در فوق ذکر شد گاهی (در حدود ۲۰٪ موارد) ناخنچاریهای اضافی دیگری نیز بشرح زیر در ترالوژی فالو ممکن است دیده شود:
- ۱- ارتباط بین دو دهلیز
 - ۲- وجود کانال آرتیل
 - ۳- درطرف راست قرار گرفتن آئورت (Dextroposition) .

علاویم کلینیکی:

بهترین علاویم بالینی این بیماری با اختصار عبارتنداز:

- ۱- سیانوز - که یکی از زودرس ترین و مشخص ترین علاویم است و بخصوص در بیها - ناخنها و گوشها بازتر بوده و با حرکت و یا گریه طفل تشیدید میگردد.
- ۲- ناخنها هیپوکراتیک کدشکل و وضع ورنگ ناخنها کاملاً مشخص و اختصاصی است
- ۳- تنگی نفس که مخصوصاً هنگام حرکت یا گریه طفل شدیدتر شده و در فرم خیلی شدید بیماری حرکت طفل را تقریباً غیر ممکن میکند.
- ۴- در سمع سوافل میستولیک در کانون شریان ریوی شنیده میشود ولی باید دانست که این سوافل در واقعی که تنگی زیاد باشد کمتر بگوش میخورد و هر گاه آترزی شریان ریوی موجود باشد اصلاً شنیده نمیشود.

۵- توقف رشد و نمو طفل.

علاوئم آزمایشگاهی:

این علاوئم بطور خلاصه عبارتند از:

۱- افزایش گلبولهای قرمز که گاه به ۱۱-۹ میلیون در سیلی متر مکعب میرسد.

۲- مقدار هموگلوبین خون بالاست.

۳- همان توکریت بالاست و گاه به ۸۰ - ۷۰ - ۶۰ درصد میرسد.

۴- اکسیژن خون در حال عادی کم و در موقع حرکت و فعالیت کمتر میشود.

در الکتروکاردیوگرافی انحراف محور بستم راست دیده میشود که بعلت هیپرتروفی بطن راست است از نظر رادیوگرافی تصویر تقریباً مشخصی وجود دارد و غالباً رادیوگرافی تشخیص راتسیهیل و گاه مسجّل میکند.

قلب بزرگ شده و بعلت بزرگی بطن راست نوک قلب بالا میاید و تصویر معروف Coeur en Sabot آن کم شده است در ۱/۵ موارد آنورت در طرف راست قرار گرفته است سطوح ریوی بعلت کمی و تقصان جریان خون شریان ریوی شناختی دارد و خطوط مشخص ریوی در رادیوگرافی خیلی کمتر از معمول است. کاتاتریسم کمک بسیار ذیقیمتی در تشخیص بیماری میکند کاتاتراز سوراخ ارتباطی بین دو بطن عبور کرده وارد بطن چپ میشود گاهی ممکن است کاتاتراز را مستقیماً از قلب راست وارد آنورت نمود و گاهی هم ممکن است کاتاتراز وارد شریان ریوی گردد و در هر حال بالاندازه گیری از نمونه های مختلف خون کمک بالازشی به نوع تنگی شریان ریوی میشود.

پیش آگهی - تعیین پیش آگهی در این بیماری بستگی بشدت و ضعف علاوئم موجود دارد در اطفالی که سیانوز بیشتر است غالباً مرگ در سال اول عمر مخصوصاً بین ۴ - ۶ سالگی بسیار زیاد میباشد و علت آن بیشتر.

۱- ضایعات مغزی.

۲- عفونتهای شدید ریوی.

۳- عدم تکافوی قلب میباشد.

در اینجا باید متذکر شویم که لازم نیست تمام بیملرانی را که باین برض مبتلا هستند تحت عمل جراحی قرار داد. هر گاه سیانوز طفل زیاد نباشد بهتر است صبر کرد زیرا گاهی با گذشت زمان و بخودی خود بمنظور میرسد که ببودی نسبی پیدا میشود ولی گاهی هم بر عکس حال طفل مرتباً روبو خاست گذاشته و عمل جراحی فوری را ایجاب میکند.

بطور کلی برای ۳ مبتلایان باین بیماری باید پیشنهاد عمل جراحی نمود ولی ضمناً باقیستی بخود بیمار (در صورت امکان) و بخصوص باولیای بیمار خاطر نشان ساخت که بهیچوجه بعداز عمل جراحی نباید انتظار معجزه داشته باشد و منتظر باشند که حال بیمار بکلی و کاملاً خوب گردد و بهبود باید ولی در عین حال باید بدآنان گوشزد نمود که با عمل جراحی تاحدود ۸۰٪ بهبود در بیمار و علائم پیدا خواهد شد.

نتیجه عمل جراحی را بهیچوجه نمیتوان قبل از حدس زد و بیش گوئی کرد گاهی نتیجه آن فوق العاده درخشان و رضایت‌بخشن است و گاه برعکس نه تنها تفاوتی در وضع بیمار حاصل نمیشود بلکه ممکن است بدتر از اول هم شود و دلیل این امر بعلت وجود تاهنجاری‌های مختلف و انواع آنهاست - بطور مشذل در بیمارانی که تنگی شریان ریوی بخصوص زیاد باشد نتیجه بسیار عالی است و بعکس در آنها که تاهنجاری در وضع آئورت زیاد باشد نتیجه خیلی خوب نخواهد بود.

رویمorfه باوجود شرایط و علائم زیر تاحدی مبتلوان پیش یافته خوب پس از عمل برای بیمار نمود.

۱- سن که معمولاً از ۶ سال بالا و هرچه سن بیشتر باشد نتیجه بهتر خواهد بود.

۲- وجود سوفل سیستولیک شدید در کانون شریان ریوی.

۳- کوچک بودن شریان ریوی و کوچکی ضربان آن.

۴- علائمی که دلالت بر پرتوستیک نامطلوب میکند عبارتنداز.

۱- کم بودن سن بیمار مخصوصاً پائین تراز ۶ سال.

۲- عدم یا خفیف بودن سوفل سیستولیک در کانون ریوی.

۳- کم بودن سیانوز.

۴- عدم قربنکی و تفاوت بین نتایجی که از آزمایشات مختلف پاراکلینیکی و علائم کاریکی بدست آید. با توجه به نکات فوق حتی الامکان باقیستی از اقدام بعمل جراحی دوسوره اطفال کوچک مخصوصاً بعلت کوچک بودن قفسه صدری و عروق احتراز نمود. بهترین من انتخابی جهت عمل جراحی بین ۴-۶ سالگی است.

در خاتمه مختصری راجع به انواع تکنیکهای مخصوص عمل جراحی در این بیماری

ذکر میکنیم:

انواع مختلف تکنیکهای جراحی در این بیماری بطور خلاصه بشرح زیر است:

۱- آناستوموز Potts - Smith که عبارت است از برقرار کردن ارتباط بین آئورت و شریان ریوی چپ. شرط انجام این طریقه وجود آئورت در طرف چپ است.

۲- آناستوموز بین یکی از شاخه های بزرگ آئورت سینه ای و شریان ریوی چپ یا

آناستوموز Blalock در این طریقه معمولاً ارتباط بین شریان تحت ترقه‌ای چپ و شریان ریوی چمپ برقرار می‌گردد.

۳- در صورت امکان (بندرت) اگر شریان ریوی آنربزی نداشته باشد میتوان Broc کرد ولی چون در ۸۰٪ درصد موارد استنوز ازنوع اتفاندیبولر است معمولاً نتیجه خوب نمیدهد
۴- عمل باطیریقه قلاب باز که در این سورد بهتر است ترمیم خایعات داخل قلاب را بسینیں بالاتر موکول کرد تا پجه رشد و نمو کافی برای تحمل این عمل را پیدا نماید.

۵- اخیراً در امریکا اطاوهای عمل مخصوصی درست کرده‌اند که اکسیژن با فشار زیاد در آن جریان داشته موقع عمل از راه پوست ونسوچ مختلف جذب بدن پجه می‌شود واز این راه کمک مؤثری به طفل می‌شود نکنه مهم در اینجا این است که تمام کسانیکه از این اطاق عمل بیرون می‌آیند قبل باید تدریجاً وارد اطاوهایی با فشار اکسیژن کمتر شوند تا از نظر اکسیژن زیاد باصطلاح Decompression پیدا کنند.

ابسر و اسیون اول

علیرضا فرزند قاسم ۷ ساله در تاریخ ۱۵/۷/۴۳ از بیمارستان کودک به بخش جراحی قفسه صدری بیمارستان پهلوی فرستاده می‌شود بیمار بعلت تنگی نفس کبودی زبان و لبه‌ها و انتهایا و ناراحتی موقع راه رفت در بیمارستان بستری شده.

این علائم از بدو تولد وجود داشته و بتدریج تشدید یافته است خمناً پای چپ طفل نیز دچار یک اکسیسم می‌باشد.

در معاینات بالینی علاوه بر مشاهدات بالا سوفل سیستولیک در مزوکارد و بخصوص کانون شریان ریوی موجود بود میانوز صورت لبها و بینی و هیبوکراتیسم انگشتان جلب توجه مینمود سایر دستگاه‌ها سالم بودند. فشار خون $95/60$ mmHg نبض ۱۲۰-۱۰۰ در دقیقه.

فورمول خونی بیمار: ۶۲ سکمانته

۲۶ لنفوسيت

۵ منوسیت

۰ ائوزینوفیل

۲ باقیانه

هماتوکریت ۱۴٪ - آزمایش ادرار طبیعی بود.

E.C.G هیپرتروفی بطن راست را نشان میداد و رادیوگرافی نیز حکایت از بزرگی قلب راست مینمود بیمار با تشخیص تراولوزی فالو تحت عمل جراحی توراکوتومی چپ قرار گرفت و آناستوموز - Blalock انجام گردید و نتیجه از روز بعد از عمل بسیار عالی بود.

ابسرواسیون دوم :

اعظم فرزند ابوالفضل ۵/۴ ساله بعلت سیانوز لب و اطراف چشم و هیپوکراتیسم انگشتان و تنگی نفس در ۱۱/۴/۴ به بیمارستان بیهاری مراجعه میکند طبق اظهار نزدیکان طفل سیانوز ازه ماهمگی خورد توجه اولیای طفل واقع شده و قبل از آن بحساب رنگ پوست گذاشته میشده است. هنگام معاینه متوجه سو福 سیستولیک وارگانیک طفل میشوند. فشار خون ۷۵/۴۵ آزمایشات پاراکلینیک از این قرار بوده است.

سدیمان تاسیون	۴ میلی ساعت اول و ۶ ساعت دوم
هموگلوبین	% ۹۰
گلبول سفید	۸۰۰۰
مشتمیت / لنفوسيت	۰/۶۰٪
گلبول سرخ	۶/۰۰۰۰۰
ادرار عادی	

در رادیوگرافی قلب en Sabot و آئورت در طرف راست.

بیمار در تاریخ ۲/۴/۴ به بخش جراحی قفسه صدری بیمارستان پهلوی منتقل و پس از چند روز تحت عمل جراحی قرار میگیرد.

توراکوتومی چپ و آناستوموز Blalock آئورت در طرف راست.

ابسرواسیون سوم

عفت حسین ۴ ساله در تاریخ ۱۰/۱/۴ در بیمارستان بستری میشود علت مراجعه سیانوز خورت، میخیزد و تنگی نفس ویقاری در شب بود سیانوز از بد و تولد موجود بوده است.

زایمان بیمار بستختی انجام گرفته - بیمار آنیک و چهادش کمتر از سن وی نشان میداده (قریباً دوسال) انگشتان سیانوزه و هیپوکراتیک - نبش ۴. سو福 سیستولیک موجود - سایر دستگاه‌ها طبیعی E.C.G هیپرتروفی بطن راست رانشان داد.

فورمول شمارش بیمار نزدیک به طبیعی است.

بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت (توراکوتومی چپ) ولی ملاحظه گردید که شریان ریوی چپ بیمار کوچک و ناچیز است و مناسب برای آناستوموز نمیباشد لذا قفسه سینه بدون انجام کاری مشتبه شد.

ابسرواسیون چهارم

سعود محمد باقر ع ساله در تاریخ ۱۷/۷/۲۲ بعلت کبودی رنگ و تنگ نفس در بیمارستان بستری میشود. انگشتان بیمار سیانوزه و ناخنهاي هیپوکراتیک موجود بود. طفلحتی در وضع عادی نیز تنگی نفس داشت .
در امتحانات بالینی یک سوغل سیستولیک شدید در کانون شریان ریوی بگوش میخورد سایر دستگاه ها طبیعی بودند.

E.C.G نیز هیپرتروفی بطن راست را نشان میداد .

آزمایش خون بیمار بشرح زیر بود .

۷۰۰۰۰۰	گلبول سرخ
۸۴۰۰	گلبول سفید
۴۸	سگمانته
۴۰	لنفوسیت
۲	منوسیت
۱۰	اُنوزینوفیل
٪۱۰۰	هموگلوبین بیمار

بیمار تحت عمل جراحی توراکوتومی چپ قرار گرفت و آناستوموز Blalock گردید نتیجه عالی بود .

ابسرواسیون پنجم

سیاره بکتاش ۶ ساله در تاریخ ۱۶/۸/۴۳ به بیمارستان پهلوی مراجعه و در بخش جراحی قفسه صدری بستری گردید علت مراجعه سیانوز دائمی بود که موقع فعالیت تشدید شد میگرید مخصوصاً سیانوز شدیدی در لبها و سرخی مخصوص و تنگ کونه ها و نیز انگشتان هیپوکراتیک در بیمار موجود بود در ابتلاء به سیاه سرفه و سرخک یرقان و اریون وجود داشته در امتحان بالینی سوغل شدید سیستولیک بخصوص در کانون ریوی بگوش میخورد سایر دستگاه ها طبیعی بودند الکتروکاردیوگرافی هیپرتروفی بطن راست رانشان میداد آزمایش خون بیمار بشرح زیر بود .

۴	منوسیت
٪۶	لنفوسیت
٪۸	سگمانته



بعد از عمل



قبل از عمل

مربوط با پروتیون اول

