

خون شناسی و ابسته باعثی (ایمونو هماقلوژی)

دکتر حسن بیردامادی *

خون شناسی و ابسته باعثی از سال ۱۹۰۰ یعنی همزمان با کشف گروههای خونی توسط «لانداستاینر» مبنی بر وجود آنتی زنهای بر سطح گوچهای سرخخون بوجود آمد و از آن پس پیوسته در این زمینه پیشرفت‌های شایان توجهی در سه جهت مختلف انجام گردید بدین ترتیب که باز هم گروههای خونی نوینی بوسیله نامبرده کشف شد و انتی زنهای مخصوص دیگری مانند عامل های Rh, N.P. و همچنین M، و نتیجه شناخته شد و نتایج بسیار مهمی چه از نظر پزشکی و یا پزشکی قانونی بیارآورده و از آن پس بر اثر پیشرفت‌های علمی و فنی جدید روش‌های نوینی برای آشکار ساختن پادتنهای مخصوص که گاه در برابر گوچهای سرخ خون پیدا می‌شود (روش کومبس مورانتوریس) بدست آمد و در حقیقت فهرست انتی زنی گوچهای خون انسان مشخص گردید و در نتیجه سیستمهای مختلف مانند سیستم لوتران . کل . دوفی . کبد . جی . رایت و غیره به میان آمد .

بدیهی است از این کشفیات و اطلاعات نوین فواید بسزائی در جهات مختلف یعنی در رُتیک، در زیست‌شناسی و کیفیات و مشخصات تراودهای مختلف و اقام گوناگون نوع انسان بدست آمد و این پیشرفتها و اطلاعات مخصوصا در پزشکی تاثیر بسزائی نموده است و درمان بوسیله انتقال خون که روزگاران پیشین رویائی بیش نبود حقیقت و صورت عدلی بخود گرفت و انتقال خون جزو کارهای روزانه درآمد و خطرات آن بکلی از میان رفت و اگر در نظر گرفته شود که در چریان جنگ جهانی ۱۹۱۴-۱۹۱۸ انتقال خون بدون درنظر گرفتن شرایط لازم و صلاحیت انتقال خون از نظر عوامل ABO انجام می‌گرفت در اینصورت راه درازی که در چریان این مدت طی شده است بخوبی معلوم می‌شود امر ورزه کسی که بکار انتقال خون اشتغال دارد میتواند بیشتر عوامل خونی را که تاکنون شناخته شده است نادیده پنداشته و انتقال خون را با درنظر گرفتن عوامل ABO و Rh اجرا کند - باسال ۱۹۴۰ یعنی یکسال پس از کشف عامل Rh علت پیدایش بیماری مخصوص نوزادان (اریتروblastوز) که در آن گوچهای سرخ نوزاد بر اثر پادتن مخصوص که در نتیجه حلول تدریجی خون جنین بخون مادر و بازگشت واژر حلال سرم مادر بر

* استاد بخش سرم شناسی و ایمونولوژی دانشکده پزشکی

گویچه های سرخ نوزاد شناخته شد و بعد از آن نیز همه جنبه های تصادم و تضاد مخصوصا آنچه که وابسته بعوامل ABO بود بخوبی معلوم گردید و دامنه اطلاعات حتی بر پزشکی قانونی وسعت یافت و انکار یا اثبات فرزندی بر اثر شناسائی و تطبیق انواع و اقسام عوامل خونی بچه و مادر و پدر فرضی امکان پذیر گردید.

سال ۱۹۴۶ پیش فتهای در جهات دیگر خون شناسی از طرف برخی از کارشناسان مانند نورمان - دودولوت انجام شد زیرا اینکارشناسان ثابت نمودند که در مواد دیشمار کم خونی های وابسته بخود اینمی (انوایمونیزاسیون) بیمار در برابر گویچه های سرخ خود او است در اینجا باید گفت که هر چند موضوع خود اینمی از مدتها پیش توسط برخی از کارشناسان از جمله ویدال و شوفار بمیان آمد بود اما هنوز در آغاز مان اختلالات حاصل از آن چندان جنبه های اینمی شناسی بخود نگرفته بود. در این اواخر کومبیس ثابت نمود که ممکن است شخص برضد گویچه های سرخ خودش در پاسماهی خود دارای پادتن گردد و هر چند امروز هم کیفیت و ماهیت پدیده خود اینمی بخوبی شناخته نشده است اما بهرجهت اهمیت آن در پزشکی برای همه مسلم و ثابت گریده است.

ایمی وابسته بخون شناسی بتازگی از دونظر اهمیت شایان بخود گرفته است زیرا علت حقیقی برخی از انواع پورپوراهای ترومبوپنیک و لوکوپنیها که مجھول مانده معلوم گشت و ثابت گردید که این عوارض وابسته بوجود و پیدایش پادتن معین مخصوص در برابر گویچه های سفید و یا پلاکتهای خونی همان بیمار است. و حتی چنین بنظر میرسد که لوپوس اریتمی پراکنده وابسته باختلالاتی از اینگونه یعنی وابسته بخود اینمی باشد، میتوان گفت که امروزه خون شناسی اینمی دو قسم میشود. یکی مربوط بشناسائی انتی رژنهای مخصوص در خون اشخاص دارای گروههای مختلف خونی است و دیگر مربوط بشناسائی انتی رژنهای غیر اختصاصی است که سبب خود اینمی میشود. باید فراموش کرد که تحقیقات نوین برخی از کارشناسان نشان داده است که این وضع مرتبط دیگر نباید خیلی هم قطعی تلقی شود زیرا ممکن است بدن در برابر انتی رژنهای گروهی موجود در سلولهای خود حالت حساسیت بخود گیرد اما این فرضیه هر اندازه هم که در جای خود شایان توجه باشد دشواری های وابسته بخود اینمی را که هنوز هم وجود دارد حل نمیکند.

بالاخره سومین راه هنگامی پیدا شد که معلوم گردید برخی از هموزپاتیها علت و منشاء آلرژی دارند و حتی برخی از کارشناسان نشان دادند که چگونه برخی از مواد خارجی ممکن است در بدن بیمار و ناتندرست سبب پیدایش حساسیت شده و بر اثر پدیده های وابسته بایمی پورپورا ایجاد کند. نتایج نظری و عملی این نکات بتازگی اهمیت اصلی خود را نشان داده است و حتی ممکن است در آینده معلوم شود که تعداد زیاد از

موارد حساسیت سبب بمواد مختلف وابسته بوجود همانگونه مکانیسمها باشد بنا براین میتوان گفت که خون شناسی وابسته بایمنی دانش نوینی است که همه وسایل تحقیق و تشخیص آن هنوز هم در حال شروع است و هرچند تتابع آنها قطعی استولی دارای حدودی نامعین است.

خون شناسی وابسته بایمنی وایمنی شناسی .

خون شناسی وابسته بایمنی برآستی یاک قسمت شیرین و جالب اینمنی شناسی عمومی است که فواید آن بخوبی شناخته شده واز این جهت جای دارد که دراین مورد مختصری از آن یادگردد بطور خلاصه اینمنی عبارت از حالت مقاومتی است که بدن دربرابر مواد خارجی مخصوصاً آنهایی که منشاء حیوانی دارند پیدا میکند . این مقاومت گاه در نتیجه وجود پادتن (اتنی کوریاتی بادی) از همان آغاز زندگی نوزاد همراه است اما این گونه حالت مقاومت بیشتر وابسته بعوامل اینمنی یعنی وجود پادتن نیست بلکه ترکیبات مخصوص پروتئین خون انسان مخصوصاً دراین میان نقش مهمی دارد . در برابر اینمنی طبیعی باید اینمنی حقیقی ویاحالت مقاومتی را که در نتیجه ورود مواد پروتئیدی و غیر پروتیدی، یعنی لیپیدی و ساکاریدی (اتنی زن) بین میرسد و واکنشهای اختصاصی بدن در برابر آن مواد و پیدایش موادی بنام پادتن (اتنی کور - آتنی بادی) را قرارداد .

دراینجا باید گفت که بی شک پادتن هم درآبگونه بیرون سلولی و هم درون سلولی یافت میشود و برخورد اتنی زن با پادتن که در بدن ساخته و پرداخته شده است منتهی بخشنی شدن اتنی زن میگردد یعنی این واکنش سلولی بی سر و صدا و بی بروز اختلال در بدن صورت میگیرد و بهترین مورد مثال آن حالت مقاومتی است که پس از بهبودی از یک بیماری میگردد و یا پس از مایه کویی در بدن پیدا میشود .

دربرابر اینگونه حالت های مقاومت اکتسابی که دربرابر اتنی زن بی سر و صدا و بی واکنش بدن انجام میشود باید نوع دیگری از تظاهرات را که کم و بیش پرسروصدرا همراه با واکنشهای سخت بدن مانند انفیلاکسی است یادآوری کرد .

درآلرژی گاه اتنی زن فقط از مواد خارجی تشکیل یافته است اما غالباً ترکیبی از ماده خارجی است که با پروتئینهای همان بدن ترکیب شده و اتنی زنی مرکب از یک پادتن ویا الرزن که منشاء خارجی دارد و به پروتئینهای درونی بدن ملحق گردیده است از آن ترکیب بوجود میآید که دربرابر آن پادتن در بدن تشکیل میگردد .

مقدار این پادتن گاه زیاد است که بحال آزاد درآبگونه های بیرون سلولی وجود دارد و قسمتی از آن بسطح سلولهای حساس بدن پرایش پیدا میکند اما گاه پادتن تنها درون سلول یافت میشود . در اینجا باید یادآوری کرد که برخورد ترکیب اتنی زن و پادتن چسیده بسطح سلولی است که سبب پیدایش شوک کم و بیش شدید و موضوعی میگردد در آلرژی تجربی که میتوان آنرا با نافیلاکسی تغییر نمود جنبه های عمومی اختلالات بیشتر

است و بر حسب نوع حیوان عوارض در بافت و اندام مخصوص متمن کر میگردد . در آلرژی هومورال انسانی که میتوان وجود پادتن را درخون نشان داد حالت شوک کم و بیش عهود مبت پیدا میکند اما بیشتر در اندام مخصوص مانند شش (در موارد آسم) و پوست (در موارد اکر ما) متمن کر میگردد .

در نوع بافتی آلرژی انسانی که نمیتوان وجود پادتن را در سرم خون شان داد اختلال همیشه در اندام شوک که بدان پادتن چسیده است متمن کر است . اینمی نیز با نوع گذران یا نایپیدار و ناگذران یا پایدار تقسیم میشود . در اینمی گذران پادتن از بدن شخصی که دارای آن است بدیگری انتقال میباید و اینحالات انتقال در اینمی اکتسابی فوری و در آلرژی با تأخیر با نجاح میرسد و گاهگاه اصلاً انتقالی صورت نمیگیرد و چنین بنظر میرسد که مدت نهفته‌گی ارتباط مستقیم با چسیدن ذرات مولکول بر سطح سلولها داشته باشد . و بهترین مثال آن آزمایش پرانتیس کوستراست که در آن پس از تزریق سرم بیمار شخص تندرست باید چند ساعت صبر کرد تا بر اثر ورود آلرژن همان واکنش آلرژی در بدن شخص دویم بوجود آید .

نباید فراموش کرد که اختلافات بسیار میتوان در میان اینگونه حالات مختلف اینمی مشاهده نموده اکنون بدینیم در این میان خون شناسی چه نصیبی برده است و این موضوع در اینمی شناسی چگونه موقعیتی بخود گرفته است ؟ در این مخصوص باید چهار جور پدیده را در نظر گرفت بدین ترتیب :

۱- پدیده‌های وابسته پادتهاي ناجور.

چنانکه معلوم است سلولهای بدن انسان دارای انتی‌زندهای هستند که برخی از آنها بویژه ، مخصوص نوع انسان است و برخی دیگر مشترک میان انسان و چند دسته از حیوانات است از این‌گذشت درخون انسان پادتهاي ناجوری یافت میشود که در برابر سلولهایی که دارای مبداء حیوانی هستند بوجود می‌آید و اکشنهای وابسته بعوامل ناجور هر چند بیشتر جنبه‌های نظری و فرضی دارد با وجود این در برخی از بیماریها مخصوصاً منون کلئوز عفونی حائز اهمیت است .

۲- پدیده‌های وابسته پادتهاي گروههای (ایزو و انتی کورها)

در جریان انتقال خون و یا در ضمن آبستنی‌های ناجور توارثی (جنین Rh مثبت - مادر Rh منفی پدر Rh مثبت همانطور که در اینمی اکتسابی امکان پذیر است بدن میتواند، پادتهاي در برابر گویچه‌های سرخ جنین که سبب پیدایش آن گردیده است بازد و پادتهاي که در بدن مادر بوجود آمده است با انتی‌زندهای خون جنین (گویچه‌های سرخ خون) برخورد میکند اما این برخورده برخلاف معمول بی‌رسودا انجام نمیشود بلکه وضع و موقعیت مخصوص انتی‌زندهای موجود در سطح گویچه‌های سرخ سبب از هم یاشیدن آنها شده و از آن نتایج و خاتمه بار پدیدار میگردد .

بعلور کلی عوارض وابسته بانتقال خون بدو دسته تقسیم می‌شود:
اول - عوارض مستقیم . که خون دهنده دارای مواد زیان پخش بر گویچدهای سرخ خون گیرنده باشد (خون دهنده خطرناک) .

دوم - عوارض غیرمستقیم که پادتن موجود در خون گیرنده برای گویچدهای خون دهنده زیان پخش است (خون گیرنده گان خطرناک) .
بیماری همولیز دهنده نوزاد وابسته بدیرخورد انتیزن موروثی از پدر موجود در خون نوزاد و پادتهای موجود در پلاسمای خون مادر است و پادتها نیز بر اثر مجاورت تدریجی با خون نوزاد پیدا شده است .

هر چند غالباً این برخورد وابسته با انتیزن Rho-D رزووس با پادتن آن است اما انتیزن‌های دیگر نیز ممکن است اینگونه عوارض را بیارآورند و بتازگی نشان داده شده است که عوارض همولیز وابسته بگروههای ABO نیز امکان پذیراست .
در مخصوص پلاکتهای خونی و گویچدهای سفید همچنان وجود گروههای مخصوص بمنظور می‌رسد و از اینجهت بر اثر انتقال خون ممکن است پادتهای مخصوص و متناسب با آنها بوجود آید و حتی برخی از پرپوراهای ترومبوپنیک نوزاد همچنان وضع و منظره بیماری همولیز دهنده را دارد .

۳- پدیدهای وابسته پادتهای خودی

گذشتند از این ممکن است اختلالاتی در تیجد خود اینمنی (انتوایمونی زاسیون) پدیدار گردد خود اینمنی عبارت است از حالتی که در آن بدن ازراه اصلی خود منحرف شده و جنبه‌های افراطی بخود می‌گیرد زیرا در اینحالت پادتن بر ضد سلولهای همان بدن بوجود می‌آید و نظر باینکه خون بافتی است که باسانی میتوان آن را از بدن بیرون کشید بسیار برای بیشتر ف این گونه بررسیها مفید است .

در کم خوبیهای وابسته بایمنی بر حسب اینکه بهترین میزان گرمی موثر بر آزمایش چه میزانی باشد پادتها را بدسردو گرم دستبندی نموده‌اند و چنین بنظر می‌رسد که برخی از آنها وابسته به پیدایش اختلال مخصوص باشد و تاثیر فوق العاده بافت ریکولر مخصوصاً لنفوئید و برخی از آنها مانند سینه پهلوی غیرعادی وابسته بپروس مخصوصی باشد که آزا سینه پهلوی علائمی خوانند . اختلالات دیگر ایدیوپاتیکی و کم خونی همولیتیک شکل مخصوصی از آن است و هموگلوبینوری حمله‌ای وابسته بدسرخوردگی علائم بالینی مخصوص بخود دارد .

در جریان این چند سال اخیر معلوم شده است که عوارض وابسته پادتن‌های خودی ممکن است سبب پیدایش پورپورا و برخی از اثواب اگرانولوسیتوز گردد و حتی چنین بنظر می‌رسد که لوبوس اریتمی نیزیک عارضه وابسته بخود اینمنی باشد .
با این مقدمات معلوم می‌شود که خون شناسی وابسته بایمنی تازه خودنمایی می‌کند بطوریکه امروزه در بیشتر آزمایشگاه‌های تشخیص‌های پزشکی جستجوی پادتن‌های خودی که ظاهرًا سبب عوارض وابسته بخون شناسی است جزو کارهای روزانه درآمده

است و پادتهاي خد عروقی درپولی آرتیریت گره دارو درپورپورای روماتیسمی مانند بدست آمده است و در آنیه نیز ممکن است پادتهاي دیگر شناخته شود.

۴- پدیدهای وابسته پادتهاي آلرژی.

اختلالات وعوارض آلرژی که وابسته بخونشناسی اینمی باشد با حالات و کیفیات معمولی آلرژی کاملاً منطبق نمیگردد و هنوز معلوم نشده است که آیا همان عوارض مانند پورپورا و اگرانولوپیتوز داروئی که در آنها پادتهاي موثر بر پلاکتهاي خونی و یا گوچدهای سفید خون یافت میشود و فقط در مجاورت همان مواد بر آنها موثر است وابسته بپدیدهای آلرژی باشد.

میتوان گفت که پلاکتها و گوچدهای سفید در اینگونه موادر معادل اندام شوک هستند و در آن خصوص باید گفت که مکانیسم پیدایش این حالات دقیقاً و برآثر دردسرس بودن خون کاملاً مشخص و معلوم گردیده است.

این مکانیسم بیشک دارای جنس و ماهیت آلرژی نیست و احتمالاً فقط وابسته به سلولهای خونی است و بطور خلاصه نکتهای که اساسی بودن پدیدهای وابسته بخونشناسی اینمی را نشان میدهد این است که برخورد با سلولهای که از آن انتیزن دارند چنان اثر میکند که غالباً مستقیم و یا غیرمستقیم اثرات آن آشکار میگردد و درنتیجه عوارضی که گاه بسیار سخت و خطرناک است از آن برخورد بروز میکند.

مأخذ و مدارک :

- 1 - Bordet J. Traite de l'Immunite dans les maladies infectieuses I vol. Masson et Cie Paris 2em edition, Paris 1939.
- 2 - Landsteiner K. The Specificity of Serological Reactions I vol. Harvard University, Presse Cambridge 2 ed. 1946.
- 3 - Topley, W.W.G. and Wilson, G.S. Principles of bacteriology and immunity, Arnold, London, third edit, 1946.
- 4 - Boyd, W.C. Fundamentals of Immunology, Interscience Publishers New-York, London, third edit, 1956.
- 5 - Kabat, E.A. et Mayer, M. Experimental Immunochemistry, C. Thomas Springfield, 1948.
- 6 - Sherwood, N.P. Immunology, C.V. Mosby, Saint Louis third edit, 1951.