

از کارهای بخش میکروب شناسی

دانشکده پزشکی تهران

بررسی مقاومت تعدادی از استافیلو ککهای کو آ گولاز مثبت تهران نسبت به پنی سیلین و بعضی از آنتی بیوتیکهای دیگر

نگارش

دکتر فرج الله شفا

مصدی کرسی میکروب شناسی

مجله ده :

وقتی پنی سیلین تازه در انسان بکار رفت در حدود ۱۲٪ استافیلو ککها نسبت
 بآن مقاومت داشتند (۲۵-۹-۱۴) با وجود این اغلب پزشکان درمان کننده معتقد بودند که
 این مسئله اشکال مهمی در درمان بیماریهای استافیلو ککی بوجود نخواهد آورد (۲۳-۷)
 ولی در عمل مشاهده شد که از دیاد مصرف پنی سیلین مخصوصاً در بیمارستانها باز یاد
 شدن انواع مقاوم استافیلو کک همراه بوده (۲۱-۶-۱۳-۲-۵-۲۰-۱۲-۷-۴-۱۷) .
 دقیق ترین بررسی هائی که تا کنون در این زمینه انجام گرفته است بررسی های
 «باربر» و همکارانش می باشد (۲-۵-۳-۴) که در لندن صورت گرفته است .
 در یکی از این بررسی ها (۵) استافیلو ککهای کو آ گولاز مثبت یکی از
 بیمارستانهای لندن از سال ۱۹۴۶ تا سال ۱۹۴۹ مورد آزمایش قرار گرفته و ثابت شده
 است که در سال ۱۹۴۶ تعداد ۱/۱۴٪ آنها نسبت به پنی سیلین مقاومت داشته اند .
 در سال ۱۹۴۷ این رقم به ۰/۳۸٪ و در سال ۱۹۴۸ به ۰/۵۹٪ رسیده است .
 در نقاطی که پنی سیلین بحد و فور مصرف میشود امروزه در حدود ۶ تا ۹۰٪
 استافیلو ککهای کو آ گولاز مثبت نسبت بآن مقاومت پیدا کرده اند .

در بیشتر نوشتجات پزشکی این نکته ذکر شده است که انواع مقاوم استافیلوکوک در بخشهای بیمارستانها که پنی سیلین زیاد مصرف میشود فراوانترند (۲۶-۳-۲۳-۱۳). لیکن باید دانست که اولاً امروزه این آنتی بیوتیک هادر خارج بیمارستان نیز بحدوفور استعمال میشود.

ثانیاً انواع مقاوم بوسیله ناقلین آنها که نسبتاً زیادند در همه جا بین مردم منتشر میشوند (۱۹-۷-۱۸).

یکی از بررسی های دقیقی که در باره انتشار انواع مقاوم استافیلوکوک در میان نوزادان بعمل آمده است بررسی مارتیم (۱۹) میباشد که در بخش زایمان بیمارستان سنت مری منچستر در انگلستان انجام گرفته است. نامبرده ترشح بینی و مدفوع ۱۳۰ نوزاد سالم را برای بدست آوردن استافیلوکوک کشت داده و در ترشح بینی ۰/۶۲ و مدفوع ۰/۵۰ آنها استافیلوکوک پیدا کرده است.

باوجود اینکه بیچیک از نوزادان نامبرده و مادرانشان پنی سیلین تزریق نشده بود ۵/۵۰ استافیلوکوکهای بینی و ۵/۵۸ استافیلوکوکهای مدفوع نسبت به پنی سیلین مقاومت داشته اند.

استافیلوکوکها نه فقط نسبت به پنی سیلین مقاوم شده اند بلکه نسبت بسایر آنتی بیوتیکهای متداول نیز مقاومت پیدا کرده اند.

چون در ضمن تهیه آنتی بیوگرامهایی که ببخش میکرب شناسی دانشکده پزشکی تهران مراجعه میشد مشاهده گردید که تعداد زیادی از استافیلوکوکها نسبت به پنی سیلین و بعضی از آنتی بیوتیک های دیگر مقاومت دارند تصمیم گرفته شد تحقیقی در این باره انجام گیرد و نتیجه آن بنظر همکاران محترم میرسد.

وسائل و روشهای کار:

۱- استافیلوکوکهای مورد آزمایش از مچ دست و بینی پرستاران بخشهای مختلف بیمارستانهای وابسته بدانشکده پزشکی بدست آمده است.

۲- کو آ گولاز تست با پلاسمای سیترا ته خر گوش و کشت ۴ ساعته استافیلو کک در لوله انجام گرفته و نتیجه آن ۳ ساعت بعد از گذاشتن در گرمخانه ۳۷ درجه حرارت خوانده شده است .

۳- برای تهیه آنتی بیو گرام از دیسکهای کارخانه بی بی ال (۱) با حدا کثر مقدار استفاده شده است .

نتایج

جدول زیر درجه حساسیت و مقاومت پنجاه سوش استافیلو کک کو آ گولاز مثبت را نسبت به پنی سیلین ، ده آنتی بیوتیک دیگر و تریپل سولفا نشان میدهد .

کامل مقاوم		بطور متوسط مقاوم		کمی مقاوم		حساس		مقدار	آنتی بیوتیک
تعداد	٪	تعداد	٪	تعداد	٪	تعداد	٪		
۵۴	۲۷	۱۶	۸	۱۲	۶	۱۸	۹	۱۰ واحد	پنی سیلین
۲۲	۱۱	۲۰	۱۰	۴۲	۲۱	۱۶	۸	۵ میکرو گرم	اورتومایسین
۲۲	۱۱	۲۰	۱۰	۴۲	۲۱	۱۶	۸	۳۰ <	تتراسایکلین
۲۲	۱۱	۲۰	۱۰	۴۲	۲۱	۱۶	۸	۳۰ <	ترامایسین
۰	۰	۱۰	۵	۲۲	۱۱	۶۸	۳۴	۳۰ <	کلر آمفنیکل
۴۸	۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۲	۲۶	۵۰ <	دی هایدر و استر پتومایسین
۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۱	۷۸	۳۹	۳۰ <	کانامایسین
۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۱	۷۸	۳۹	۳۰ <	نتومایسین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰	۱۵ <	اریترومایسین
۶	۳	۱۲	۶	۵۰	۲۵	۳۲	۱۶	۱۰ <	باسیترا سین
۱۸	۹	۷۸	۳۹	۲	۱	۲	۱	۳۰ <	پلی میکسین ب
۱۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱ میلی گرم	تریپل سولفا

از جدول نامبرده نکات زیر نتیجه میشود :

۱- در حال حاضر بیش از ۱۸٪ استافیلو ککهای کو آ گولاز مثبت بیمارستانهای

وابسته بدانشکده پزشکی تهران نسبت به پنی سیلین حساسیت کامل ندارند بقیه یا مقاومت کامل دارند (۰/۰۵۴) یا مقاومت متوسط (۰/۰۱۶) و یا مقاومت کم (۰/۰۱۲).

۲- در استافیلوکوکهای مورد آزمایش درجات مختلف مقاومت (از حساسیت کامل تا مقاومت کامل) نسبت به پنی سیلین، اورنومایسین، تتراسایکلین، ترامایسین، کلر آمفنیکل و همچنين باستیراسین و پلی میکسین ب دیده میشود و این خود نشان میدهد که استافیلوکوکها بتدریج نسل به نسل بیوتیکهای نامبرده مقاومت کامل پیدا میکنند نه يك مرتبه.

۳- نسبت باستریتومایسین تقریباً نیمی از استافیلوکوکها (۰/۰۵۲) کاملاً حساس و نیم دیگر (۰/۰۴۸) کاملاً مقاومند و انواعی که کم یا بطور متوسط مقاوم باشند وجود ندارد.

۴- نسبت به آنتی بیوتیکهایی که کمتر استعمال میشوند مانند اریترومایسین، نئومایسین و کانامایسین هنوز مقاومت کامل یا متوسط پیدا نشده است و تقریباً اکثر استافیلوکوکهای مورد آزمایش نسبت با آنها مخصوصاً اریترومایسین حساسیت دارند.

۵- استافیلوکوکهایی که نسبت یکی از تتراسایکلینها مقاومت پیدا کرده اند نسبت بدوتای دیگر نیز مقاوم می باشند (مقاومت متقابل کامل).

۶- استافیلوکوکهایی که نسبت به نئومایسین مقاوم شده اند نسبت بکانامایسین هم تا حدی مقاوم هستند (مقاومت متقابل نسبی).

بحث

۱- مبداء و چگونگی پیدایش انواع مقاوم.

امروزه مسلم شده است که :

اولاً با کتری های مقاوم در اثر تأثیر داروهای ضد میکروبی بوجود نیامده اند بلکه در اثر موتاسیون خود بخودی پیدا شده و در اثر مجاورت با آنها برگزیده شده اند توضیح آنکه در هر ۱۰ میلیون تا ۱۰ میلیارد نسل يك عدد با کتری بوجود می آید که در

يك يا چند صفت با سايرين تفاوت دارند مثلاً نسبت بيك آنتی بیوتیک مقاوم می باشد . حال اگر آن آنتی بیوتیک در مجاورت این باکتری وجود داشته باشد افراد حساس از بین میروند و آن يك باکتری مقاوم باقی مانده تولید مثل میکند و جای باکتری حساس اولی را میگیرد .

ثانیاً- استافیلو ککهای حساس در بدن انسان و حیوان هم ممکن است تحت تأثیر پنی سیلین یا سایر آنتی بیوتیکها با انواع مقاوم تبدیل شوند (۱۶-۲۲-۱-۱۱-۱۵-۲-۵-۱۲) یا بعبارت دیگر اگر با انسان یا حیوان پنی سیلین تزریق نمایند استافیلو ککهای حساس از بین میروند و استافیلو ککهای مقاوم که در اثر موتاسیون تولید شده اند برگزیده میشوند .

ثالثاً- استافیلو ککهایی که در طبیعت وجود دارند و نسبت به پنی سیلین مقاوم می باشند همگی پنی سیلیناز ترشح میکنند و حال آنکه استافیلو ککهایی که در آزمایشگاه بر اثر کشت روی محیط پنی سیلین دار مقاومت پیدا کرده اند پنی سیلیناز ترشح نمیکنند بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ترشح پنی سیلیناز تنها دلیل بر مقاومت استافیلو ککها نسبت به پنی سیلین نیست و عوامل دیگری هم از قبیل تغییر متا ولیسم یا قابلیت نفوذ باکتری ها و غیره در این امر دخالت درند .

۴- مقاومت متقابل (۱)

وقتی يك باکتری نسبت بيك آنتی بیوتیک مقاوم شد نسبت به آنتی بیوتیکهای مشابه آن نیز مقاومت خواهد داشت مثلاً اگر استافیلو کک نسبت به اورنومایسین مقاوم شد نسبت به تتراسایکلین و ترامایسین هم مقاوم خواهد بود و این نکته با اندازه ای قابل اعتماد است که از روی آن میتوان تا حدی ساختمان شیمیایی آنتی بیوتیکهایی که فرمولشان نامعلوم است پی برد .

آنتی بیوتیکهایی که از حیث ساختمان شیمیایی بیکدیگر شباهت دارند و مقاومت

متقابل کامل یا نسبی ایجاد میکند باینقرارند :

تتراسیکلین ، کلروتتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین مقاومت متقابل کامل

استرپتومایسین و دی هایدرواسترپتومایسین « « «

کانامایسین و نئومایسین « « «

استرپتومایسین، نئومایسین، کانامایسین و اولئاندومایسین « « نسبی

اریترومایسین و کاربومایسین « « «

۳- اپیدمیولوژی

بعلت فراوانی انواع مقاوم استافیلوکوک مخصوصاً در بیمارستانها و انتقال آنها از پرستارها و نازقلین به بیماران بستری مسئله مهمی در اپیدمیولوژی استافیلوکوک و عوارض بیماریها بوجود آمده است. باین معنی که اگر دقت کافی بعمل نیاید ممکن است استافیلوککهای مقاوم بیماریها و عوارض صعبالعلاج و حتی کشنده ای ایجاد نمایند بهمین جهت امروزه توجه کلیه پزشکان و متخصصین بهداشت باین امر مهم حیاتی معطوف شده و درصد چاره جوئی برآمده اند. (۱۰)

۴- موارد استعمال درمانی

در درمان بیماریهای استافیلوککی نکات زیر را باید در نظر داشت :

- الف - قبل از شروع بدرمان حتماً باید يك آنتی بیوگرام تهیه کرد و از میان آنتی بیوتیکهای مؤثر آنرا که از همه متداول تر است بکار برد .
- ب - ناممکن است باید از استعمال آنتی بیوتیکهای جدید مانند وانکومایسین و نووبایوسین خودداری کرد و آنها را برای موارد ضروری نگاهداشت .
- ج - اگر استافیلوکوک مورد آزمایش نسبت بیک آنتی بیوتیک مقاوم بوده از استعمال آنتی بیوتیکهایی که مقاومت متقابل دارند صرف نظر کرد .
- د - آنتی بیوتیکها و سولفامیدها را نباید بعنوان پیش گیری بکار برد .

شماره ویژه

۱- پنجاه سوش استافیلوکوک کو آگولاز مثبت از بینی و پشت دست پرستاران بخشهای مختلف بیمارستانهای وابسته بدانشکده پزشکی گرفته شده و مقاومت آنها نسبت به پنی سیلین، تتراسایکلینها، کلرامفنیکل، دی هیدرواسترپتومایسین، اریترومایسین، نتومایسین، کانامایسین پلی میکسین ب و تریپل سولفات تعیین شده است. پورساتاژ استافیلوکوکهای که در حال حاضر نسبت به داروهای نامبرده حساسیت کامل دارند باینتقرار است.

اریترومایسین /۰۸۰۰

نتومایسین /۰۷۸

کانامایسین /۰۷۸

کلرامفنیکل /۰۶۸

دی هایدرواسترپتومایسین /۰۵۲

پنی سیلین /۰۱۸

تتراسایکلینها /۰۱۶

پلی میکسین ب /۰۱

۲- موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفته اند:

الف- مبدأ و چگونگی پیدایش انواع مقاوم.

ب- مقاومت متقابل.

ج- اپیدمیولوژی بیمارستانی.

د- موارد استعمال درمانی.

Prevalence of drug resistant staphilococci in Tehran University Hospital Wards

F. Shafa , M.D , Ph.D.

1- Fifty Coagulase positive stains of staphylococcus isolated from the nose and wrist of Hospital nurses have been examined for sensitivity to penicillin, tetracyclines ; chloraphenicol , dihydrostreptomycin, Erythromycin, neomycin kanamycin, bacitracin, polymixin B, and triple sulfa. the percentages of fully sensitive strains at the present time are as follow .

Erythromycin	100./.
Neomycin	18./.
Kanamycin	78./.
Chloramphenicol	68./.
Dihydrostreptomycin	52./.
Penicillin	18./.
Tetracyclines	16./.
Polymixin B	1./.
Triple sulfa	0./.

2- The following topics have been discussed :

- a) The possible origin and mechanism of drug resistance .
- b) Cross resistance
- c) Hospital epidemiology of staphylococcus
- d) Clinical implications of staphylococcus drug resistance

References

- 1- Anderson , D.G., Howard , L.G. and rammel kamp , C.H.(1944) Penicillin in the treatment of chronic osteomyelites. Arch . surg. 49, 245 .
- 2- Barber , M. (1947) Staphylococcal Infection due to penicillin resistant strains Brit .M.J.2,863 .

- 3- Barber , (1947) , coagulase – positive staphylococci Resistant to penicillin, J. Path . and bact . 59,373.
- 4- Barber , M.; Hayhoe , F.G.J. and whitehead , J.E.M. (1949) penicillin - resistant staphylococcal infection in maternity Hospital Lancet 2,1120,
- 5- Barber, M.) and Rozwadowska Dawzenko, M. (1948) Infection by penicillin -resistant staphylococce . Lancet 2 ,641.
- 6- Berger , K. (1949) Ueber die Haufigkeitszunahme penicillin resistenter pathogener Kokken wien . med . wehnschr . 99 , 536 .
- 7- Beigelman, P.M., and Rantz , L.A. (1950) The clinical importance of coagulase- positive, penicillin, resistant staphylococcus aureus new England J. Med . , 242 ,353 .
- 8- Bloomfield, L. Kirby, W.M.M. and Armstrong . C.D. (1944) A study of "penicillin failures » J.A.M.A,126 ,683.
- 9- Bondi Jr., A., and Dietz , C . C . (1945). penicillin resistant staphylococci . Pros. Soc . Exper .Biol and Med . , 60 ,55 .
- 10- Brown, J.,W., (1956). Hygien and Education within hospitals to prevent staphylceoccic infections . J.A.M-A , 166,1185 - 1191 .
- 11- Buchman, J. and Blair, J.E.(1945). penicillin in the treatment of chronic osteomyelitis . Arch .surg .51,81.
- 12- Finland , M . , Frank , P.F. , and wilcok , C. (1950) in vitro susceptibility of pathogenic staphylococci to seven Antibiotics with note on changing resistance of staphylococci to penicillin . Am. J. clin. Path. 20, 325.
- 31- Forbes . G.B . (1949) : Infection with penicillin resistant staphylococci in Hospital and general practice . Brit . M . J . 2, 569 .
- 14 - Galardo , E. (1945) Sensitivity of Bacteria from infected wounds to penicillin . II . Results in one hundred twelve cases . war. Med . 7, 100 .

- 15- Hirsh ,H. L., Dowling ,H.F. , and Robinson , J . A . (1948) .
organisms resistant to penicillin obtained from patient. *Asch. int. Med.* 82,310.
- 16- Lyons, C.(1943). Penicillin therapy surgical infections in U.S. Army .(1942) *A.M.A.* 123 ,1007.
- 17- Martin , R. , chabbert , y., Sureau .B ., and Demoures , C.Un
problème d'actualité pénicillinothérapie : Les staphylocoques
producteurs de pénicillinase (1950)*presse Med* 58, 197.
- 18-Martin, T.D'M. and whitehead, J.E.M.(1949) Carriage of peni-
cillin - resistant staph. pyogenes in Healthy Adults. *Brit .M.J.* 1,
173 1
- 19- Martyn , G. (1949) . staphylococci in the Newborn . their
Coagulase production and resistant to penicillin and streptomycin .*Brit . M.J.*, 1,170 .
- 20 - Nichols , D.R . and Ncedham , G.M. (1949). Aureomycin in
the treatment of penicillin- resistant staphylococcic bacteremia
Proc ,staff Meet ., Mayo clin ., 24 ,309 .
- 21- North , E. A., and christie, R. (1945) . observations on the
sensitivity of staphylococci to penicillin *M.J. Australis* , 2,44 .
- 22- Rammelkamp , C.H.and Maxon ,T. (1942) . Resistance of
staphylococcus aureus to the action of penicillin *proc .soc .Exper
Biol and Med.* 51,336.
- 23- Rountree , P.M. and thomson , E.F.(1952) *Lancet* , II , 262
- 24- Spink , W.W., Hall , W.H ., and Ferris , V . Clinical signifi-
cance of staphylococci with natural or acquired resistance to the
penicillin , (1948) *J.A. M.A.*, 128.555 .
- 25- Spink, W.W., Feeris. V ., and Vivino , J.J . (1944) . compara-
tive in vitro resistance of staphylococci to penicillin and sodium
sulfathiazole. *pre. soc. Exper. Biol. and Med.* 55,207.
- 26- Voureka, A.and Hughes, W.H: (1949) Frequency of penicillin
resistant staphylococci *Brit.,M.,J.*, 1,395