

از کارهای انسنیتو پارازیتو لورزی و مالاریولورزی

طرح مطالعه بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان

مطالعات مقدماتی درباره دلمک (عنکبوت سمی) در ایران (*)

نگارش

مهندس احمد زینی

حشره شناس

در بعضی نقاط ایران مخصوصاً در استان نهم عنکبوت‌های سمی بنام دلمک وجود دارد که نیش آن تولید عوارض و فاراحتی‌های قابل توجهی از نظر پزشکی مینماید. ابوعلی سینا در کتاب خود از رتیل یادی‌ملک یادی‌لمک یاد کرده و ذکر مینماید که آبده‌اش سمی است و بدون شک کامد دلمک از یکی از دو نام اخیر مشتق است مطالعات ماروی عنکبوت‌های سمی دلمک در سال ۱۳۳۷ در استان نهم (سبزوار - شاندیز - طرق به و خادر مشهد) انجام گرفته و در سال جاری نیز در همین استان ادامه دارد ولی انتشار آن محدود باین استان نیست و در هر حال از نظر اهمیتی که برای روشن ساختن انواع حشرات ایران و بررسی بیماری‌های بومی دارد بطور خلاصه در این نوشته توضیح داده می‌شود.

انواع دلمکها:

از نظر افراد محلی دلمک بطور مشخص بنوع خاصی اطلاق نمی‌شود انواع عنکبوت‌هایی که از طرف اهالی خراسان (سبزوار - شاندیز - طرق به - و خادر مشهد) بنام دلمک نامیده می‌شوند توسط هیئت حشره شناسی انسنیتو در ایستگاه تحقیقاتی سبزوار صید و توسط استاد محترم آفای دکتر افشار بتر تیب‌زین تشخیص داده شده‌اند:

سیاه	نوع	لارو و کتوس (۱)	لیکوزا (۲)	قهوه‌ای
------	-----	-----------------	------------	---------

۱ - در اجرای این برنامه از اعتبارات طرح بیماریهای منتقله بوسیله بندپایان وزارت بهداشت و اعتبارات عمرانی سازمان برنامه و دانشکده پزشکی استفاده شده است.

۲ - Genus : *Latrodectus* ۲ - Genus: *Lycosa*

زرد تحت راسته ارتروگناتا(۱) که انواع لاترود کتوس و


لیکوزا مهر و شرح داده می‌شوند:

۱- لاترود کتوس از تیره تریدی‌ایده(۲)- فوق تیره ارزیوپوئیده آ(۳)- راسته-

آرائیده آ(۴) کلاس آراکنیدا(۵) و شاخه بندپایان: ارتروپود(۶) می‌باشد.

طول بدن در حدود یک سانتی‌متر و گاهی بیشتر بدن کمی بزرگ‌تر از عنکبوت‌های

معمولی ولی پاهای کوتاه‌تر می‌باشد.



لاترود کتوس ماده

۱- Suborder : Orthognatha

۲- Family : Theridiidae

۳- Super family : Argipojdea


۴- Order : Araneidae

۵- Class: Arachnida

۶- Phylum : Arthropoda

رنگ لاترود کتوس کاملاً سیاه و در پشت آن یک یا چند لکه سفید یا قرمزو وجود دارد و یا ممکن است مانند نمونه خر اسان بطور یکنواخت سیاه باشد.

گزش لاترود کتوس در بعضی فصوص بخصوص در هوای گرم سمیت شدیدی دارد و سه نزد انسان و برخی حیوانات اهلی فوق العاده خطرناک و مؤثر و حتی ممکن است مهلك باشد. در جای گزش نزد انسان خال کوچک سرخ رنگ که کمی ورم کرده است دیده



لاترود کتوس نر

میشود و در وسط خال مزبور دو منطقه قرمن وجود دارد که جای فرو رفتن یک زوج ضمایمدهانی (۱) جانور میباشد.

سم آن از نظر شیمیائی یک آلبومن (۲) و شدیداً نور و توکسیک است عالم ظاهری پس از نیش سمی معمولاً شامل دردهای شدید شکمی بالارفتن فشار خون، عرق ریزی فراوان - استفراغ و خستگی و کوفتگی عمومی میباشد.

معمول این عالم شدید در پایان ۲۴ ساعت از بین میروند.

اطلاعاتی که در حال حاضر در دست است برای بررسی مرک و میر افرادی که بواسیله دلمک نیش زده شده‌اند کافی نیست ولی طبق بعضی گزارشها نسبت آن زیاد است.

۳- ژانر لیکوزا :

از تیره لیکوزیدم (۳) و مانند لاترود کتوس از فوق تیره ارزیوپوئیده آ است. منطقه انتشار این ژانر نیز وسیع بوده و نگک آن قهوه‌ای روشن و یاقوه‌هایی تیره میباشد. اندازه آن بزر گتر از لاترود کتوس و مسمومیتش کمتر از آن میباشد انواع لیکوزیده در ایران زیادند و بعضی‌ها عوارض مسمومیت تولید میکنند.

همیت آن از نظر تولید تکروز (۴) و خیم میباشد که در محل مورد گرش ایجاد میشود.

آنچه در سبزوار (منطقه خرم آباد جوین) در سال ۳۷ صید شده بارنگ قهوه‌ای تیره با پاهای روشن بوده است.

منطقه انتشار :

منطقه انتشار دلمک یا لاترود کتوس (۵) وسیع بوده و در کشورهای ترکیه - ازبکستان - قفقاز - ترکستان - ایران و شمال آفریقا و آمریکا (ایالات جنوبی آمریکای شمالی تا برزیل - آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی) انتشار دارد.

حتی در آمریکا بعلت خطرات حاصله از نیش بعضی از گونه های لاترو و کتوس سرم ضد آن ساخته شده است.

در ایران تا کنون از استانهای آذربایجان و خراسان از تهران و از بوشهر جمع آوری شده است.

یو الوژی دلمک :

دلمکها تخمرا بوده و جانور ماده تخمها را که ممکن است تعداد آنها به زارها بر سر در داخل پیله های مخصوص که می تند ریخته وزیر سنگها و خاکها قرار میدهد. در مهرماه ۱۳۳۷ تعداد زیادی از این پیله ها از منطقه شاندیز و طرق به مشپرد جمع آوری گردید. تخمها در مدت زمستان داخل پیله ها بوده بمحض مساعد شدن هوا از نظر درجه حرارت نوزادان از این پیله ها خارج می شوند. دلمکهای بالغ در فصل سرما زیر سنگها و خاکها بسر میبرند.

حد اکثر فعالیت دلمکها در فصل تابستان و هنگام درد گندم است و فعالیت و خطر دلمک نسبت مستقیم با گرمی هوا دارد.

اهمیت دلمکها :

دلمکها در چراگاهها - دشتها - کوهستانها - طویله ها و در مزارع زیر ساقه های گندم زندگی می کنند و حتی در خاکهای هم یافت می شوند (۲).

انسان در موقع در گندم و گاهی در موقع عبور از محلهای آلوده هنگام شب مورد حمله قرار میگیرد و برخی حیوانات اهلی مثل شتر - اسب - الاغ و سایر دامها موقع چرا یا خوردن علف در طویله مورد حمله واقع شده و بهمان جهت دلمک بنام شتر زنه نیز نامیده می شود. گاهی گرش دلمک با امارزدگی اشتباه می شود و اهالی فکر می کنند که حیوان در اثر گرش مار از بین رفته است.

طرز درمان:

معالجات گرش دلمک را بدو قسم تقسیم می کنیم :

* - آقای دکتر افشار استاد محترم دانشگاه در تهران در منزل خود که در مرکز شهر میباشد دلمک صید کرده اند.

۱- معالجاتی که افراد بومی انجام میدهند:

۲- معالجات بواسیله پزشک.

۳- معالجات بومی:

افراد روستائی برای معالجه گردن دلمک از طرق مختلف استفاده مینمایند. روش‌هایی که در زیر ذکر می‌شود مربوط با فراد دهات استان نهم می‌باشد و ممکن است در سایر استانهای ایران روش‌های دیگر معالجه نیز انجام گیرد که اطلاع صحیحی از آنها در دست نیست.

منظر کردن:

روشی است که توسط افراد خاص مورد اعتقاد اهالی با مالیدن آب دهان یا استفاده از دعا وغیره بکار برده می‌شود. این معالجات ممکن است در مورد بعضی از امراض ساده و یا در موافقی که مریض خود بخود در حال خوب شدن است در اثر تلقین مفید واقع شود.

شیردادن:

بسخن گزیده شده مقدار زیادی شیر داده سپس داخل توری بزرگ قرارداده با یک طناب از درختی آویزان نموده بشدت تاب میدهند تا اینکه شیری را که خورده است استقراغ نماید. این عمل بدفعات متعدد تکرار می‌شود بطوری که ممکن است در حدود ۱۰۰ لیتر شیر بشخص مریض خورانیده باشند.

۳- معالجات پزشکی:

طرق مختلف درمان که فعلاً انجام می‌گیرد و یا میتوان انجام داد بر ترتیب زیر می‌باشد:

برای معالجه گردن دلمک در آمریکا سرمخصوصی درست شده است که پس از گردن بشخص مریض تزریق می‌شود. تزریق پرمنگنات یک در هزار در تردیک محل گزیدگی و کمپرس الکل یا پرمنگنات.

تجویز داروهای توئی کاردیاک و تریپکللو کونات کلسیم داخل وریدی استفاده از داروهای آرام کننده.

تربیق کافئین یا کامفر و تجویز داروی ها مدر.

خلاصه و نتیجه :

در ایران عهکبوتهای سمی بنام دلمک در استانهای آذربایجان - خراسان و در تهران و بوشهر تا کنون شناخته شده که از زانرهای لاترود کتوس و لیکوزا بشمار رفته و دارای نیش سمی و ایجاد عوارض هسمومیت و گاهی مرگ می‌نمایند. ادامه مطالعات درباره انتشار و انواع دلمک‌ها بررسی آثار کلینیکی و عوارض حاصله از گزش آنها برای روش نمودن مسئله دلمک لازم است و بدین وسیله کمک و همکاری کلیه پزشکان و افراد علاقمند تقاضا میگردد.

تشکر

از کمک و همکاری و راهنمائی های ذی قیمت جناب آقای دکتر افشار استاد محترم دانشگاه بدين وسیله تشکر مینماید.

هدایت و مأخذ

۱- دکتر جلال افشار : حشره شناسی پزشگی و کشاورزی ایران

چاپ دانشگاه

۱۳۳۱

۲- دکتر عزیز رفیعی : انگل شناسی (بندپاییان) چاپ دانشگاه

۱۳۳۲

۳- دکتر ناصر انصاری و دکتر احمد متقالي : انگل شناسی

۱۳۳۳

(جلد سوم) چاپ چهار

۴- دکتر جلال افشار : اطلاعات شخصی.

۵- د.ی. خارتیونف : نمونه نادر عنکبوت لاترود کتوس در ترکمنستان

کارهای انتستیتووزولوژی توصیف انواع چدید حشرات برای فون

اتحاد جماهیر شوروی - جلد ۱۸

از انتشارات آکادمی علوم اج.ش.س. لینینگراد - مسکو

۱۹۰۰