

دو قلو و چند قلو ها در انسان و حیوانات

نگارش

دکتر محمدعلی مولوی

رئیس درمانگاه دانشکده پزشکی

دو قلو ها در انسان از نظر شباخت یا اختلاف بین آنها فوق العاده جالب توجه است. در دوقلوهای حقیقی نزدیکان و حتی مادر آنها را اشتباه می‌کند. موضوع دوقلو و چند قلو دارای اهمیت علمی نیز می‌باشد مطالعه و مشاهدات این موجودات است که از لحاظ وراثت کمکهای زیادی بمامیکند و اهمیت بسزائی در ژنتیک انسانی دارد. در انسان مقایسه و مقابله دوقلوهای حقیقی و کاذب اهمیت نسبی وراثت و محیط را در رشد نمواش خاص سمکن می‌گرداند بخصوص دوقلوهای حقیقی یا مونوزیگوت که جداگانه و در نقاط مختلفی بزرگ شده باشند از این لحاظ (اثرات محیط) فایده فوق العاده‌ای دارند.

حیوانات پست معمولاً در هر آبستنی یا تخم‌گزاری عده‌زیادی هم نظیر خود را تولید می‌نمایند حشرات و عنکبوت‌ها، ماهی، ذو حیاتین، خزندگان و پرندگان از نظر عده تولید مثل متغیر بوده و تعداد آنها از پستانداران زیادتر است. هر چه ارگانیسم پیچیده‌تر باشد عده سولود‌ها کمتر است. در بین پستانداران جوندگان معمولاً عده زیادتری بچه بوجود می‌آورند مانند سگ و گربه که در یک شکم ۸ - ۱۲ بچه بوجود می‌آورند یک سگ شکاری در آمریکا ۱۶ بچه آورده و همه آنها را شیر میداده است. حیوانات مزرعه بجز خوک معمولاً تعداد کمی بچه بوجود می‌آورند دوقلوهای حقیقی در خوک همراه با اطفال دیگر بدنیا می‌آید.

در اغنام و خوک و سگ میتوان تولید بچه‌های زیاد یعنی دو یا عده زیادی بچه را که بوسیله دوپدر بوجود آمده‌اند دیداین موضوع میتواند بعنوان کنترل در مطالعه چند نژاد بما کمک کند حتی این موضوع در انسان نیز میسر است (بوجود آمدن دو طفل را در یک مادر بتوسط دو پدر ژول گرن در یک خانم سوئدی مشاهده کرده است) شلاً یک ساده گاو یک جفت گوساله دوقلو زائیده که آنها بهم شبیه نبودند

این ماده گاو بوسیله دو گاونر بارور شده است طرف راست مربوط به یک پدر (شبیه او از نظر شکل ورنگ) و دیگری شبیه پدر دیگر بوده است.

همانطور یکه ذکر شد اگر رنگ و خصایص باز نورد مطالعه قرار گیرند و با گوساله هائی که پدرهای مختلف دارند (دریک شکم) می تواند اطلاعات مفیدی از نظر وراثت (که از لحاظ فیزیولژیکی در زندگی داخل رحمی مساوی بوده اند) قرار دهد .

دو قلوها و مولودهای متعدد که در حیوانات مزرعه در گوسفندها و بز بطور مساوی دیده می شود یک امر عادی است در برخی از گوسفندها (اقسام گوسفند) ثابت شده است دو قلو بیشتر دیده می شود . در گوسفندان معمولی دوقلوها کمتر از یک پنجم تمام مولودها میباشند لذا انتخاب گروهی که دوقلو بیشتر بیار می آورند از نظر اقتصادی سهم خواهد بود . مانند دوقلو و چند قلوها وابسته بمقدار شیر گوسفند است که بتواند دو یا چند بره را سیر کند حتی گوسفندانی را پیدا کرده اند که ۴ قلو و ۵ یا ۶ قلو زائید است که ممکن است همه آنها زنده بمانند دوقلوها یا از میان اینها یک تخم بوده (حقیقی) یا از دواوول و دو اسپرماتوزئید بوجود می آیند (دوقلوی کاذب) این موضوع را از روی شباهت این حیوانات و یا عدم تشابه آنها با ثبات میرسانند بزرگاله هائی را نیز ذکر کرده اند که ۳-۴-۵ قلو زائید اند که حقیقی یا غیر حقیقی بوده اند در حیوانات اهلی درشت تر دوقلو کمتر دیده میشود .

دو قلو در انسان

ندرت فرزندان متعدد در یک آبستنی در انسان باعث جلب توجه بدان گردیده است . آمار سرشماری در آمریکا نشان میدهد که کثرت دوقلوها در اینکشور یک هشتاد و هشتم است یعنی در روی ۸۸ زایمان یک تولد دوقلو میباشد . نسبت آن در سایر نقاط متفاوت میباشد . در بعضی قسمتهای آلمان یک تولد دوقلو در ۸۲ تا ۸۵ زایمان دیده می شود . در ژاپن نسبت آن خیلی کمتر بوده و در ۳۰۱ تولد فقط یک زایمان دو قلو دیده میشود . باید در نظر داشت که دوقلوها مرک و میور بیشتری دارند بواسطه نارسی و خونریزی وغیره تلف می شوند . دوقلوها ممکن است بهم شبیه بوده و یا نباشند (مانند دو برادر و دو خواهر معمولی) درین دوقلوهای متولد شده تقریباً ۳۳ درصد

بهم شباهت کامل دارند یعنی یک سوم تمام دوقلوها حقیقی میباشد تشخیص دوقلو وابسته بدرجه شباهت آنها میباشد. دوقلو های شبیه از یک نیم مجزا می شوند یعنی از یک نیم بوجود می آیند (یک نیم که از یک نطفه مرد وزن ایجاد گردیده) و تقسیم ناگهانی و بعدی آن باعث ایجاد دو فرد شبیه بهم می شود بنابراین ژنوتیپ آنها مساوی است بعارت دیگر ژنها و ساختمان آنها کاملاً با هم یکی است (۱) و حتماً از یک جنس می باشد در صورتی که دوقلو های کاذب (دروغی) ممکن است از دو جنس مختلف باشند دوقلو های غیر حقیقی یا فراترnel (۲) یادوتخیل و یا (دیزیگو تیک) هستند. یعنی دواوول بوسیله دونطفه گشته شده می شود لذا صفات ارثی آنها با هم فرق دارد و ژنوتیپ آنها نیز با هم متفاوت است حتی ممکن است دارای دو پدر باشند دوقلو های برادری یا غیر حقیقی از لحاظ ظاهر مانند برادران و خواهرانی است که در موقع مخالف بوجود آمده باشند و شباهت آنها مانند دو برادر و خواهر غیر مشخص است جنس نیز در آنها یکی بوده یا متفاوت میباشد.

یک اصل مهم برای بنا نهادن قاعده کلی تشخیص مبدء دونوع دوقلو از روی نسبت جنسی که ما بین دوقلوها یافت می شود موجود است. یعنی : دو جنس مذکور - دو جنس مؤنث و یک جنس مذکور و یکی مؤنث لذا نسبت آنها ۱:۱:۱ می باشد با فرض اینکه تقریباً یک سوم تمام دوقلوهای متولد شده شبیه هم بوده و بالنتیجه از یک جنس هم میباشد ۱۶ درصد آنها نر و ۱۶ درصد آنها ماده میباشد و یک سوم نر و یک سوم ماده و دو سوم نر و ماده است یا ۱۶ درصد نر ۱۶ درصد ماده و ۳۲ درصد نر و ماده میباشد یا اگر دوقلوهای مشابه دادای یک نسبت یک یک بوده و یک سوم تمام دوقلوها را تشکیل بدند دوقلوهای ناهمانند دارای یک نسبت جنسی ۱:۲:۱ بوده و دو سوم تمام دوقلوها را تشکیل بدند ترکیب تمام این نسبتها تقریباً ۱:۱:۱ (نسبت جنسی جفت‌های توأم) خواهد بود تحقیقات سسلم راجع به نسبت جنسی این موضوع را تأیید میکند اگر فقط در مبدء یکنوع توأم وجود داشت نسبت جنسی میباشد ۱:۲:۱ باشد .

مبدء منوزیگو تی دوقلوها - مبدء دوقلوها درین مهره داران که انسان هم

(۱) isogenique

(۲) fraternel

جز و آنست با یک مطالعه جالب توجهی در دسته‌ای از سخت پوستان توسعه یافته است و نشان داده اند که در این حیوانات ممکن است یک تخم به دو وسه و یا چهار قسمت و یا بیشتر تقسیم گردیده و چهار حیوان مستقل و شبیه ایجاد کند.

مبدئی نوزیگوت بودن دوقلو بواسطه حالاتی است که در گوسفند و خوک دیده شده و مسلم گردیده است. نویمان (۱) گزارش میدهد که پیدایش دو جنین از یک تخم در انسان بواسطه تقسیم زودرس تخم یا زیگوت بد و یا چند قسمت است تقسیم تخم در حوالی روز ۱۰ - ۱۲ صورت می‌پذیرد. در ۱۹۴۴ تحقیقات جامعی راجع به تقسیم شدن یک تخم بد و یا چند قسمت در خارج از بدن یا کشت تخم در آزمایشگاه شده است. دانشمندان (رالک و من کن) (۲) که تخم حیوان را در مرحله دوسلولی یعنی پس از ۵/۴۰ ساعت تماس اول با اسپرم اتوژنید گرفته بودند ناگهان مشاهده کردند که پس از زمان کوتاهی یکی از آنها بدو قسمت می‌شود هر چنداین مشاهده در انسان صورت نپذیرفته ولی این تخیل را در ما ایجاد می‌کنند که حوادث در انسان بیش از سایر پستانداران دخل و تصرف می‌کنند.

دلاپلی مشابهت دوقلوها

برای تشخیص دوقلوها از هم باید در مطالعه آنها اختصاصات و علائم موجود باشد معمولاً دوقلوها وقتی بهم شبیه باشند تفکیک آنها از هم بسیار مشکل است چنان‌که مردم و والدین نمی‌توانند که دوقلوی حقیقی را از هم باز شناسند گاهی برای شناختن دوقلوهای کاذب نیز دقت بیشتری لازم است تا چه رسد به دوقلوهای صادق بهر حال.

برای تفکیک دوقلوهای حقیقی از غیر حقیقی آزمایشهای متعددی ضرورت دارد.

در دوقلوهای صادق و همانند قد، وزن، سیما، دستها انگشتان یکی است موها نه تنها از نظر رنگ کاملاً شبیه است بلکه نرمی و جهه موها نیز بکسان است.

در این دوقلوها رنگ ایریس (عنیبه) کاملاً بکسان بوده، توزیع موها در نقاط مختلفه و اندامهای تحتانی و فوقانی باید نظیر هم باشد بالاخره دندانها کاملاً شبیهند اگر بینظمی و بی‌ترتیبی در دندانها مشاهده شود در هر دو دوقلوها مشاهده خواهد شد گروههای خونی برادران و خواهران دوقلوی حقیقی نیز مطابق هم است.

(۱) Neumann

(۲) Rack-menkin

اخصاصات ذره بینی خطوط انگشتان (داکتیلو گرافی) و کف دستها اکثر آشنا است. شباخت کامل بهم دارند شباخت یکدست دوقلوها بهم از شباخت دو دست یکنفر نسبت بهم بیشتر است ممکن است شباخت دوقلوها بصورت تصویر آئینه‌ای باشد یعنی پیچش موها در یکی مخالف دیگری باشد خال یکطرف در یکی و خال در دیگری در طرف مقابل باشد در حقیقت تقارن معکوس موجود است ممکن است معکوس شدن اعضاء گوارش و قلب و غیره نیز در کار باشد معکوس شدن تقارن را در بین نظمی‌های دندانی و چپ دستی و راست دستی وغیره نیز میتوان دید این معکوس شدن تقارن گاهی حجت دو قلوی حقیقی را تشکیل میدهد ولی فقدان آن دوقلو بودن حقیقی را رد نمیکند.

تأثیرات و راثت در بروجود آمدن دوقلوها

چند زائی و زائیدن دوقلوها در خانواده‌های خاصی دیده میشود و ارث در آن دخالت کامل دارد ععملاً زنی که در خانواده خود چند زایمان دوقلو داشته باشد احتمال بارآوری دوقلو در آن بیشتر است در یک چهار قلوی سوئیسی مشاهده کرد که هر یک از افراد خانواده او چند بار دوقلو زائیده است تصویر میرود یک عامل نهفته در بروجود آوردن دوقلو دخالت دارد حتی توارث آبستنی‌های متعدد از پدر نیز بارث میرسد ولی چگونگی ارث آن فعلاً معلوم نیست.

در دوقلوهای کاذب اوولاسیون متعدد وجود دارد یعنی زن هر ماه دو یا چند اوول ایجاد میکند در این پای اوولاسیون هم ارث دخیل میباشد.

برخی تصویر سی کنند که دوقلو زائی از مرد بارث میرسد بدین معنی که نطفه بعضی سردان باعث میشوند که تخم یا اوول دوسلول تشکیل بدهد و هر دو آنها بعداً بتوسط اسپرمهای مختلف بارور شوند این دوقلوها دارای صفات ارثی مشابه از طرف مادر خواهند بود البته برخی از صفات مشخصه پدر را نیز خواهند داشت جنس آنها ممکن است مؤنث یا مذکور (از یک یا دو جنس) باشد احتمال دارد که انواع مشابه و غیر مشابه از لحاظ شباخت و اخصاصات فیزیکی نیز باشند. مطالعات دقیق در روی ۱۹۹۱ جفت دوقلو در ۸۵ خانواده نشان داده است که دوقلوهای همانند در خانواده‌های که دوقلوهای غیر مشابه نیز دارند بیشتر از خانواده‌هایی که ندارند دیده میشود از این موضوع نتیجه گرفته‌اند که از لحاظ ژنتیک دو زن بهم پیوستگی دارند که در یک اتوزوم قرار گرفته‌اند

و تولید دوقلوهای منوزیگوت و دیزیگوت را تحت تأثیر قرار میدهند از روی تحقیق های دیگری که در روی ۱۱۳ دوقلوهای مختلف انجام گرفته تصور میروند که دوقلوی توأم وابسته به ارث پدری صحت ندارد.

خصایص فیزیکی و روانی دوقلوها

مطالعه خواص و خصایص فیزیکی و روانی دوقلوها برای روشن ساختن توارث اهمیت بسزائی پیدا کرده است و فن جدیدی رادرزنیک تشکیل میدهد. کاملاً آشکار است که دوقلوهای همانند درابتدا باهم اختلافی ندارند و اختلافات بعدی آنها اثرات محیط وارث را برای ما روشن میکند و بعلاوه مقایسه دوقلوهای غیر مشابه نیز در اینجا دخالت دارد. تحقیقات چندی راجع بفعالیت قلب دو قلوها (با الکتروکاردیو گرافی) شده است مؤلفین ۱۰۶ جفت دوقلورا که ۳۵ جفت آن منوزیگوت و ۳۵ جفت دیگر هتروزیگوت یا دیزیگوت بوده‌اند مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته اند که دوقلوهای مومنوزیگوت تفوق قابل ملاحظه‌ای در الکتروکاردیوگرام نسبت به دیزیگتوها از خود نشان میدهند. چنین نتیجه‌ای اگر واقعاً دارای اساس صحیح باشد موضوع توارث را تقویت میکند چونکه دوقلوهای حقیقی یا یک تخمی ایزوژنیک هستند وارث مشابهی برده‌اند شاگردیکی از دانشمندان ژنتیک که در قسمت استخوانی شدن استخوانهای اطفال کار میکرد مشاهده کرده است که عوامل ژنتیک نظم و ترتیب وزمانهای استخوانی شدن زانیز کنترل میکنند قسمتی از این دلائل بوسیله رادیو گرافیهای که از دست چهار قلوهای حقیقی هارلاک (۱) برداشته شده فراهم شده است تصاویر دست استخوانها و محلهای استخوانی شدن این چهار خواهر کاملاً بهم شبیه بوده است با مقایسه و انتظارات قبلی این موضوع بقدره وفق میدهد که عمل توارث را در ترتیب زمانهای استخوانی شدن مسلم میگردد.

مطالعه دیگر راجع بساختمان مغز است برای این منظور مغز دوقلوهای منوزیگوت و دیزیگوت را بلا فاصله پس از فوت آنها مورد معاينه قرار داده‌اند و چون شباهت در چین و شکنجهای مغز دوقلوهای حقیقی بسیار است لذا بنظر میرسد توارث در شکل مغز نیز دخالت میکند. مطالعه دیگر راجع به آزارهای پوستی و

جوشهای صورت است که در دوقلوهای صادق اختلافات ناچیزی دارد در صورتیکه در ۱۲ جفت دوقلوی کاذب اختلافات فاحشی در این خصائص دیده شده است.

تصادفات هر پی در دوقلوها

راجع به سل مطالعات زیادی بعمل آمده و چنین نتیجه گرفته شده است که در حساسیت ابتلاء باین بیماری توارث دخیل است بطوریکه اگر یکی از دوقلوها مبتلا باشد ۷۰ درصد موارد دیگری نیز مبتلا است در صورتیکه این توافق در دوقلوهای همانند ۲۵ درصد بیشتر نیست بعلاوه اعضاء مبتلا شده در دوقلوهای همانند یکسان است مثلاً دوقلوهائی دیده شده است که سل در یک زمان درقطعه فوقانی ریه چپ دیده شده است یا سل کلیوی در هر دو موجود بوده است ... (برای بررسی مفصل این قسمت بکتاب اوژنی نگارنده مراجعه فرمائید) موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفته وجود تومرها در دوقلوها است بین ۱۰۵ جفت دوقلو که ۶۲ جفت آنها حقیقی و ۴۳ جفت کاذب بوده اند دیده شده است که در ۶۲ جفت مشابه ۶۰ آنها دچار یک گونه تومر در محل خاص بودند اختلاف زمان شروع غده از ۶ ماه تا ۱/۵ سال بوده است در دوقلوهای نامشابه در کمتر از ۳۸ مورد هر دو مبتلا شده اند و تومور فقط ۲۰ درصد موارد در یک جنس بوده است ، شروع زمان تومر هم بین ۳ تا ۸ سال اختلاف داشته است لذا عوامل ارثی نه تنها در پیدایش یک نوع تومر دخالت میکند بلکه در زمان ظهور آنها هم دخیل است .

شرايط روانی هادی و غیر طبیعی دوقلوها

از نظر امراض روانی نیز دوقلوها را مورد مطالعه قرار داده اند معمولاً دیده میشود که وقتی یکی از دوقلوهای همانند یک حالت روحی (پسیکوز) از خود نشان میدهد بیشتر اوقات دیگری نیز همان وضع روحی را هویدا میسازد . در مورد جنون زودرس حمله مرض معمولاً در یک سن شروع میشود . شیز . فرنی در دوقلوهای مشابه ۶۸ درصد موارد موافق هم است (هر دو مبتلا یند) در صورتیکه در غیر مشابه ها ۱۴ درصد این توافق وجود دارد .

جنایت در بین دوقلوها

بررسی جنایات در بین دوقلوها مطالعات جدیدی را ایجاد کرده و نشان داده اند که کمی بیش از نصف افراد در دوقلوهای نامشابه جانی شده اند ولی در بین

جفتهای مشابه $\frac{2}{3}$ آنها یکنوع جناحت را سرتکب میشوند ولی باید درنظر داشت برخی عوامل در این احصائیه دخالت میکند بدین معنی که فردی از دوقلوهای نامشابه ممکن است یک دوره زندگی جناحتکارانه نشان دهد ولی از محکومیت فرار کند. جفتهای مشابه دوقلو ها اغلب یک گونه جناحت را سرتکب میشوند. برخی مدعی هستند که عوامل ژنتیک در تعیین رفتار اینگونه جانی ها اهمیت فراوانی دارد.

قدرت و قوافلایی نسبی دوقلوها

خصائص گوناگونی که در شخصیت و وضعیت روانی افراد مهممند برای مطالعه انتخاب شده‌اند، برخی از آنها را در دوقلوهای مشابه و غیر مشابه مورد مطالعه قرار داده‌اند آزمایش‌های مناسب برای اندازه گرفتن حساسیت، محبت و علاقه، انگیزه، قدرت و توانائی برای یافتن منظور بکار برده شده است نتیجه آن در دوقلوهای حقیقی ۹۴ درصد یکسان و موافق بوده و در غیر مشابهین نقطه ۲۶ درصد توافق وجود داشته است. امتحانات مختلف در اردوهایی که برای دوقلوها ترتیب داده شده بود ثابت کرد که عوامل ارثی بیش از محیط در خصائص آنها دخیلند. راجع بقدرت دوقلوها ممکنست اختلال جریان خون در یکی باعث توقف رشد در اثر کاهش تغذیه بشود یعنی رد و بدل شدن از خون جفت در هر دو مساوی نباشد حتی اختلال شدید این جریان خون باعث مرگ یکی از آنها بشود. در حال حاضر دلیل محکمی راجع باینکه آیا ظرفیت و توانائی یک دوقلو بیشتر یا کمتر از افراد عادی است وجود ندارد.

تأثیرات محیط و اثر در دوقلوها

مراحل متعددی که از توارث در دوقلو مورد مطالعه قرار گرفته نه تنها برای کسب اطلاعات راجع با امراض و مشابهات وغیره بوده بلکه از آن برای قدرت اثرات محیط و توارث استفاده شده است. دوقلوهایی که جداگانه بزرگ شده‌اند (در دو محیط کاملاً متفاوت) مورد بررسی فرار گرفته و نتایج جالبی بدست داده است همچنین برای کمال این آزمایش دوقلوهای کاذب را که در دو محیط مختلف پرورش یافته‌اند مطالعه کرده و با گروه اول مقایسه کرده‌اند. نتیجه آزمایشها این شده است که دوقلوهای مشابه بیش از دوقلوهای نامشابه در اغلب خصائص بهم شبیه هستند. وقتی که اختلافاتی بین دوقلوهای مشابه که با هم بزرگ شده‌اند بتوان یافت ممکن است آنرا وابسته بعوامل

قبل از تولد بدانند معدالک اگر اختلافات اولیه‌ای که برتری یکی را بر دیگری بر ساند موجود باشد آنوقت ایرادی نمیتوان گرفت این خصیصه ممکن است به مرور زمان بر جسته تر و آشکار تر شود زیرا هر دو یک طریق نسبت بهم یکسان عمل نشان میدهند بنابراین اختلافات شخصیتی دو قلوها ممکن است با سن آنها واضح تر گردد عوامل محیطی در ایجاد اختلافات بین دو قلوهای مشابه که جداگانه تربیت شده باشند عمل مهمی دارد. اگر دو قلوهای مشابه را در محیط‌های جداگانه و متفاوت تربیت کنیم اثر محیط ممکن است در آنها اختلافاتی پر جسته تر از اختلافاتی که در دو قلوهای غیر مشابه که باهم بزرگ میشوند ایجاد کند معدالک اثر محیط چندان قابل ملاحظه در دو دو قلوی مشابه که دوراز هم تربیت شده‌اند چندان قابل ملاحظه نیست البته در مواردی هم اثر محیط واضح و مهم است.

از روی محاسبات و تناسب متقابل (۱) میتوان اختلافات محیطی و ارثی را دریافت نزدیکترین بستگی متقابل یا کرلاسیون بین تعلیمات و نتیجه مرتبه آن در شخص در حدود ۹۱٪ است ولی تعلیم و تربیت هوشی این کسر ۶۴٪ تا ۷۹٪ و بین محیط اجتماعی هوش و ذکاآوت ۴۲٪ تا ۵۳٪ میباشد. اختلافات محیطی در دو قلوهای مشابه مجزا در روی وزن، استعداد و رفتار بطوری تأثیر میکند که اختلافات ژنتیکی برادران و خواهران را تحت الشعاع قرار دهد.

بنظر میرسد که سطح تربیت رفتار بوسیله محیط کم و بیش تغییر کند. معمولاً توانائی واستعدادهایی که در یک فرد ایجاد می‌شود برای اینکه بتواند حواجع شخصی را برآورد و یا مسائل شخصی را حل کند قابل سنجش و اندازه‌گیری بوده و بستگی متقابل با محیط نشان میدهد. اختلافات در اندازه شخصیت دو قلوهایی که مجزا از هم تربیت شده‌اند یک بستگی غیرقابل ملاحظه و بی اهمیتی نسبت به اختلافات محیط دارند هنوز جواب کامل در شخصیت سهم نسبی اختلافات محیطی و ژنتیکی تنها با استناد موقعیت‌های محدودی که در دست بوده نمیتوان داد. بهر حال تعلیم و تربیت نتایج سهمی در هوش اطفال دارد یعنی نتیجه تعلیمات و تدریس ارزش زیاد دارد معدالک باشد انست که محیط هر گز نمیتواند تغییراتی ایجاد نماید که از استعداد ژنتیکی که یک فرد بطور سرشی دارد تجاوز کند.

چند قلو در انسان

تولد پنج قلو های دیوون در کانادا توجه مردم را به مولود های متعدد در انسان جلب کرد در ۱۹۴۱ یک پنج قلوی دیگر نیز در برزیل متولد گردید ولی بیش از دونفر آنها زنده نماندند. در آرژانتین نیز در ۱۹۴۳ یک پنج قلوی دیگر بوجود آمد همچنین تولد ۶ قلو و ۷ قلو (در مکزیک ۶ دسامبر ۱۸۶۶) چند بار مشاهده گردیده است. وفور دوقلوها قریب $\frac{1}{85}$ و فور سه قلوها $\frac{1}{2}$ و چهار قلو $\frac{1}{3}$ و کثرت پنج قلو $\frac{1}{85}$ یعنی تقریباً یکبار در یک بیلیون تولد و کثرت ۷ قلو یک جنین در روی ۸ بیلیون $\frac{1}{15}$ و نیم است از روی آمارهای زیاد دریافته اند که وفور چهار قلو در سیاه پوستان امریکا دو برابر چهار قلوهای سفید پوستان است. برخی از مؤلفین گزارشات راجع به ۶ قلوها و ۷ قلوها را قبول نکرده اند زیرا بنظر آنان بسیار نادر میباشد و برای قبول آنها مدارک محکمی باید در دست داشت.

ولی راجع به پنج قلوی دیوون (۱) مطالعات دقیقی از لحاظ شباهت، وضع روانی، رشد شده است شباهت بہت آور و عجیب این ۵ قلو منوزیگوت بودن آنها را نشان می دهد.

ما بین سالهای ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۰ تو انتهای ۷ بار جنین چهار قلو (۲۸ نفر) مشاهده نمایند چهار قلوهای دیگری نیز درج شده است که بیش از یک یا دونفر آنها زنده نمانده اند ارزش مطالعه ۴ قلوها نظیر ۵ قلوها است ولی چون تعداد چهار قلو شایع تر است انواع مختلف آنها نیز زیادتر میباشد (منوریگوت یا دیزیگوت) چهار قلوها ممکن است از یک تخم یا دو تخم و یا سه تخم و بالاخره از ۴ تخم بوجود آمده باشند در حالت اول شباهت کاملی بهم داشته در حالات دیگر شباهت کامل نخواهد بود. چهار قلوهای زیادی با مشخصات هر یک مشاهده شده است که از توصیف جزئیات آنها صرف نظر می کنیم.

بنظر میرسد که توارث در ایجاد چند قلوها نیز مؤثر باشد یعنی زایمان دو قلو و چند قلوها در بستگان آنها زیاد تر است مثلاً در یک خانواده دو خواهر دوقلوی مشابه بوده اند و پدرشان نیز دو برادر دو قلو بوده اند بعلاوه چند بار جنین دوقلو (۴ بار) در خانواده آنها بدنبال آمده و نیز یکبار سه قلو در همین فامیل متولد گردیده است

تصویر می‌کنند که بارآوری دوقلوهای مشابه با توارث رابطه دارد ولی اثر آن در دوقلوهای ناشابه کمتر است زیرا بنظر دسته از دانشمندان اولین تخم که در رحم جایگزین شد ورقه‌های رحم را سوقتاً برای پذیرفتن جنین‌های دیگر مقاوم می‌سازد مطابق این نظریه اگر باروری دیگری بلشد (تخم دیگری تشکیل گردیده باشد) جایگزینی آن مدتی به تأخیر می‌افتد این مدت بزیگوت ثانوی مهلت میدهد که تقسیم شود چنانکه نشان داده‌اند تخم ممکن است بین ۰ تا ۸ ساعت متوجه تقسیماتی بشود. بعد از تقسیم شدن یک دوقلو یا چهار قلو یا چند قلو جایگزینی ثانوی صورت می‌پذیرد بدین‌تر تیپ دوقلوهائی که دو تخم بوده یا جنین‌های متعدد بوجود می‌آیند، طریقه برای تعیین مبلغ چهار قلو وجود دارد:

۱) یا همگی منوزیگوتند یعنی هر چهار نفر آنها از یک تخم بوجود آمده‌اند و حتماً همگی از یک جنس خواهند بود.

دوم - دی زیگوتی یعنی سه نفر مشابه یعنی منوزیگوتی و یک نفر یک تخمی که بطور ثانوی بارور شده و بوجود آمده است ممکن است هر چهار نفر آنها پسر یا هر چهار تن دختر و یا سه تن مذکور و یک تن مونث وبالاخره سه مؤنث و یک تن مذکور باشند البته از همه این انواع عملاً مشاهده شده است.

سوم - ممکن است که تخم مشابه (دو بدو) یعنی هر تخم به دو قسم تقسیم شده از لحاظ زنیتیکی بنظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی افتاده باشد واز لحاظ عملی وبالینی نیز چنین چهار قلوئی دیده نشده است.

چهارم - نوع سه تخمی حالتی است که یک جفت مشابه از یک تخم دو تخم دیگر هر کدام از یک تخم جداگانه ایجاد گردیده‌اند.

پنجم - نوع چهار تخمی یعنی هر فرد از یک تخم جداگانه بوجود آمده باشد بعبارت دیگر چهار اول جداگانه با اسپرم‌ماتوزئید ترکیب شده باشند.

از دوقلوها برای تعلیم و تربیت نیز استفاده می‌شود بدین معنی که آموختن یک متد در هر یک از دوقلوهای حقیقی بما اجازه میدهد که چه طریقه برای آموزش یک درس یا زبان و ریاضیات وغیره بهتر است همچنین در تعلیمات بدنی و آموختن حرفة‌های دیگر از دوقلو استفاده می‌نمایند.