

پاک مورد «دورو» در غده تیروئید

نگارش

پروفسور یحیی عدل و دکتر منوچهر صدیق

استاد کرسی جراحی دانشکده پزشکی دستیار بخش جراحی بیمارستان سینا

تا کنون وجود ترماتودهارادز روده ها، مجاری صفراوی و ریه گزارش داده اند ولی وجود این پارازیت در غده تیروئید بسیار باعث تعجب بوده و تا آنجا که ما اطلاع داریم تا کنون شرح حالی که دال بر این عارضه باشد ارائه ننموده اند. اصولاً از نظر سیکل حیاتی ترماتدهائی که در لوله گوارش، کبد و ریه زندگی میکنند از طریق دستگاه گوارش با انسان منتقل میشوند. باین ترتیب که با خوردن سبزی یا مواد آلوده دیگر که متاسر کر (۱) پارازیت بر روی آنها جایگزین شده شخص مبتلا می شود.

جالب توجه اینست که دوو هائیکه در ریه زندگی میکنند از جدار روده گذشته وارد فضای صفاقی میشوند و آنجا پس از عبور از دیافراگم به نسج ریه راه مییابند.

در هر حال چطور و از چه راه ممکن است «دورو» به غده تیروئید راه پیدا کند بر ما مجهول است. ذیلاً شرح حال بیماری را که مبتلا به دوو تیروئید بوده است از نظر میگذرانیم. لازم بتذکر نیست که قبل از عمل جراحی بهیچوجه حدس وجود چنین عارضه ای زده نمیشد.

شرح حال :

بیمار زن ۳۵ ساله ای می باشد که از سه ماه قبل مبتلا بناراحتی های بلع شده و بالنتیجه بطیب مراجعه نمود. بلع غذاهای سفت به سختی صورت گرفته و تقریباً غیر ممکن بود. بطوریکه بیمار تنها میتواند غذاهای مایع آبکی را مصرف کند. ادامه این وضع باعث لاغری و نحیفی وی گردید. عسرت بلع روز بروز بیشتر شده و سیالوره نیز بناراحتی وی افزوده گردید.

در معاینه فیزیکی بیمار برجستگی کوچکی با قوام خود غده تیروئید در انتهای تحتانی لوب راست تیروئید در محاذات سوراخ فوقانی توراکس حس می‌شد.

در مقابل این علائم رادیوسکوپي و رادیوگرافی مری بعمل آمد کلیشه های رادیوگرافی بخوبی تنگی مری را در محاذات سوراخ فوقانی قفسه صدري در ناحیه سرویکوتوراسیک و انحراف آنرا بسط جلو و چپ نشان میداد. نکته جالب توجه این بود که در مخاط داخلی مری در این ناحیه علائمی که دال بر بیماری آن باشد وجود نداشت.

بر رویهم قبل از عمل جراحی حدس وجود فشاری از خارج بر روی مری زده شد و با این تشخیص بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت.

عمل :

در عمل جراحی برای رسیدن به مری در گردن لوب راست غده تیروئید را بیک طرف زده و برای دسترسی بیشتر قطب تحتانی لوب راست را برداشتیم. در این موقع در زاویه مری و تراشه بر روی ورید تحت چنبری تومری باندازه گردوی درشت دیده می‌شد. با احتیاط بسیار زیاد شروع به تشریح تومر نمودیم. رنگ خاکستری تومر در این موقع نوع آنرا ظاهراً يك غده لنفاوی ملتهب معرفی می‌کرد. ولی بعد با کمال تعجب مشاهده شد که تماس ادوات جراحی بجدار تومر باعث انقباض آن می‌گردد. و حتی موقعی که تماس با آن نباشد حرکاتی در درون تومر بنظر می‌رسید. مثل اینکه موجود ذیروحي در آن محبوس باشد. حال دیگر حتم داشتیم که بایستی انگلی در داخل تومر باشد. بالاخره تومر در آورده شد در داخل تومر دووی به طول پنج سانتیمتر دیده می‌شد این دوو تا مدت ۲۰ دقیقه پس از خروج از کیست زنده بود و حرکات خود را ادامه میداد. بر روی مری بهیچوجه سوراخ و فیستولی با تومر دیده نمی‌شد.

امتحان آسیب شناسی جنس جدار کیست رانسج تیروئید و پاراتیروئید نشان داد پس از گذاردن درن طبقات مختلف نسوج گردن دوخته شد.

بیمار پس از دوازده روز بهبودی کامل یافت بطوریکه تغذیه معمول را از سر گرفت و علائم عسرالبلع بکلی برطرف شد. رادیوگرافی بخوبی عود مری را بحالت اولیه و رفع تنگی آنرا نشان داد.