

از کارهای بیمارستانی دانشکده پزشکی اصفهان

یک نوع التهاب مفصل زانو در نتیجه تابس

نکارش

دکتر مصطفی راسخ
و
اکبر حاجی دائمی

بیماره ۴ ساله با اسم (ح - ت) در تاریخ ۲۹/۹/۳۲ که بازانوی متودم پای چپ و دردهای تیر کشنده در هر دو پا که خود بیمار آنرا بفروبردن خنجر شبیه میکرد و در عرض روز چند نوبت تکرار میشد به بیمارستان مراجعه و بستری شد.

پس از گرفتن شرح حال بیمار، ابتلاء به سیغیلیس را در ۲۰ سالگی که با بردازی زخم‌های روی آلت و سقف دهان و گوشه لبه‌ها خودنمایی کرده و همچنین ابتلاء مال پروردان کف پائی (۱) در ۲ سال قبل بدون درد در پاشته پای چپ مکشوف گردید.

شروع درد پا از ۲۵ سالگی یعنی ۵ سال پس از ابتلاء به سیغیلیس بوده و ظهور تورم در مفاصل زانوی چپ از ۴۵ روز قبل شروع شده که ابتدا تمام پای چپ بیمار متودم و بعد تورم متوجه مفصل زانو میشود توضیح آنکه این درم بدون درد مفصلی و تنها ناراحتی بیمار در موقع راه رفتن بوده بطوریکه پای چپ او دیگر در اختیارش نبوده حرکات اضافی دیگری داشته و ضمناً در موقع راه رفتن نیز کراکمان (۲) احساس میکرده است.

در معاینه فیزیکی بیمار علائم زیر دستگیر شد.

درم مفصل زانوی چپ که با هر گونه مانوری بدون درد بود. هیپرتروفی انتهای تحتانی استخوان ران و انتهای فو قانی تیبیا وجود در رفتگی (۳) کاملاً واضح و بدون درد مفصل زانو (۴) احساس کراکمان در مفصل وجود آگروستوز (۵) مفصلی -

۱ - mal perforant plantaire


۲ - craquement

۳ - luxation

۴ - genou · varus - genou · valgum

۵ - Exostoses

حرکات غیر طبیعی مفصلی (حرکت نزدیک و دور کننده (۱) ساق روی ران) آتونی (۲) در عضلات پای چپ - کوتاه بودن پای چپ از راست وجود مایع (۳) داخل مفصلی که پس از بزل مایعی غلیظ و کشدار و خون آلود داشت . وجود شوک کشککی (۴) سیکاتریس زخم‌های قدیمی (سیفیلیسی) روی آلت افزایش کثیر الاضلاع اتکا، در ایستادن - وجود نشان رومبرک (۵) - مشبت بودن مانور فورنیر (۶) خیره شدن پاها در حین راه رفتن - محکم زدن پاشنه پابزمین در موقع راه رفتن - آردگای روبرتسن تنبیل - میوزیس در هر دو مردمک آلوشیری - نیستا گموس - آنیزو کوری (۷) دیسیدهتری (۸) در پاها - وجود علامت وستفال (۹) خفت احساسات سطح داخلی ساق پای چپ نسبت به لمس و درد و حرارت .



تنها وجود دو علامت یکی دردهای تربان و فولگوران (۱۰) در پاها و دیگری تورم بدون درد و همراه با درفتگی مفصل زانو تو انشت توجه مارا به التهاب تابسی مفصل جلب نماید که پس از تحقیقات زیاد در سابقه بیمار توأم با امتحان خون B.W + ++ وجود سیفیلیس آشکار و پس از امتحانات دقیق فیزیکی و کشف علائم مربوط به بیماری تابس و امتحان رادیو گرافی مفصل تشخیص مسجّل شد .

۱ - abduction, adduction ۲ - atonie

۳ - épanchement ۴ - Choc rotulien

۵ - Romberg ۶ - manoeuvre de Fournier

۷ - Allochirie-nystagmus-anizocorie

۸ - dysmétrie ۹ - Westfal ۱۰ - trébran, fulgurant