

نتیجه ۳۴۳ آزمایش بافت شناسی

در پیشماریشناسی زنان

دکتر جلال هجیمیان و دکتر جهجا انشاه صالح

دستیار بیمارستان زنان استاد کرسی بیماریهای زنان

در کشور ما برخلاف تمام کشورها هنوز مسئله آمار و اهمیت آن مورد توجه قرار نگرفته است و این نقص شاید درمورد بیمارستان دانشکده پزشکی که مرکز آموزش دانشجویان میباشد قابل اغماض نباشد.

در بیمارستان زنان تا آنجا که ممکن بوده از بیماران، بیماریهای مختلف، مرگ و میر وغیره آمارهای بشکل گرافیک تهیه و در دسترس میباشد. ولی در اینجا نیز تا کنون آمار دقیق و علمی که از نظر آموزشی ارزش داشته باشد تهیه نشده است و ما سعی داریم از اکنون اقدام نموده تا آنجا که ممکن است این عیب را بر طرف سازیم.

آماری که در زیر از نظر خوانندگان میگذرد در بوطه آزمایشهای بافت شناسی مرضی است که از دیماه ۱۳۲۹ در دفتری ثبت و نتیجه آن پس از رسیدن جواب در مقابل آن نوشته میشده است. آمار پائین از روی دفتر مزبور خلاصه شده است:

از دیماه ۱۳۲۹ تا شهریور ۱۳۳۱ یعنی در حدود ۲۰ ماه در بخش جراحی بیمارستان زنان ۳۴۳ آزمایش آسیب شناسی توسط آزمایشگاه آسیب شناسی دانشکده پزشکی انجام شده است. بیمه‌ارانی که در بخش بیوپسی شده اند اغلب از درمانگاه وابسته به بخش اعزام شده‌اند. بیماران بیشتر از افراد طبقه متوسط یا طبقه سوم میباشند بیماران مبتلا به سرطان بیشتر در وضع پیشوفته مراجعه نموده و بسیاری از آنها از شهرستانها پس از آنکه درمان‌های مختلف دیگران بدون اثر مانده است باین بخش اعزام شده از اینرو بیشتر آنها غیرقابل عمل بوده و برای درمان مجبور بودیم از رادیوم یا اشعه α استفاده کنیم.

برخلاف مبتلایان به خونریزی زهدان بیشتر ساکن تهران بوده و نسبتاً زود مراجعه کرده اند.

در بخش، سرویسیت‌های مشکوک فوری بیوپسی می‌شوند همچنین خونریزی‌های که علت واضح نداشته و برای درمان احتیاج بکورتاز داشته باشند مخصوصاً اگر بیمار بیش از یکبار به کورتاز احتیاج پیدا کند ماحصل کورتاز برای امتحان بافت‌شناسی به آزمایشگاه آسیب‌شناسی دانشکده فرستاده می‌شود. بدون استثناء پولیپ‌های دهانه‌زهدان آزمایش بافت‌شناسی می‌شود و هر گاه بیمار مسن باشد و یار حم بزرگ و مشکوک داشته باشد توأم با برداشتن پولیپ از بیمار کورتاز تشخیصی بعمل می‌آید. در نتیجه همین احتیاط ما یک مورد سرطان اینسیتو (۱) در بیمار مبتلا به پولیپ دهانه رحم و یک مورد لیومیوسارکوم (۲) در بیمار مبتلا به خونریزی زهدان برخوردهم.

در بیمارانی که احتیاج بعمل دارند در هنگام عمل اگرسجی از نظر تشخیص مورد توجه باشد برای آزمایش فرستاده می‌شود و با این عمل ما یک مورد کوردیو اپی‌تلیوما (که قبل از نظر کلینیکی مورد توجه مابود) یک مورد لیومیوسارکوم و یک مورد اپی‌تلیوما کلاندولر رحم برخوردهم همچنین در مورد تخدمدان نیز یک مورد اپی‌تلیوما ژرمیناتیف (۳) و یک مورد اپی‌تلیوما پاپیلر (۴) پیدا شد.

مراجعه بیماران مبتلا به سرطان پستان و عمل آنها در این بخش نیز جالب است.

ولی متوفانه بیماران اغلب هنگامی بما مراجعه می‌کنند که کانسر آنها مسلم است و یا با تشخیص کانسر که در خارج بیوپسی شده‌اند برای عمل بستری می‌شوند با وجود این از ۱۲ مورد امتحان بافت‌شناسی در غده پستان پنج مورد سرطان بوده است که سه مورد آن با بیوپسی اگستانپورانه (۵) تشخیص محرز و فوری عمل شده‌اند. نکته که ذکر آن بی مورد نیست قلت وجود آنسدومنتریوز (۶) در آمار ما

۱ - Insitu ۲ - Leiomyosarcome

۳ - Epithelioma germinatif ۴ - Papillaire

۵ - Extemporane ۶ - Endometriose

میباشد. با مراجعت به مطبوعات خارجی بخصوص امریکائی و توجه به اهمیتی که پزشکان کشورهای دیگر به این بیماری میدهند ما پیوسته مترصد بیهودگاری مزبور بوده و با کوچکترین نشانه قطعه مشکوک را برای آزمایش بافت شناسی فرستاده ایم ولی فقط یک مورد آندومتریوز و یک مورد آندومتریوم داشته ایم.

از ۳۴۳ مورد بیوپسی در حدود ۳۰٪ مورد مربوط به دستگاه تناسلی زن بوده و ۱۰ مورد بافت برداری از نقاط دیگر بدن شده است.

از ۳۰٪ مورد ۶۲ مورد یا ۲۰/۲۶ درصد سرطان بوده است از این قرار:

جدول شماره ۱۵

شماره تعداد بهم مجموع	نسبت سرطان کانسر	نوع امتحان	شماره
۲/۶ درصد	۳	بیوپسی از مخاط رحم	۱۱۵
۴۲/۵۹	۴۶	بیوپسی از دهانه رحم	۱۰۸
۴/۳۳	۱	آزمایش از پولیپ دهانه رحم	۶۳
۱۰	۲	آزمایش از بافت رحم	۲۰
۱۴/۲۸	۲	آزمایش از تومورهای تخدمان	۱۴
۴۱/۶۶	۵	آزمایش از تومورهای پستان	۱۲
۲۵	۱	آزمایش از ضایعات مهبل	۴
۲۳/۲۳	۱	آزمایش از ضایعات فرج	۳
۰	۰	آزمایش از پیشاپراه	۳
۲۰/۲۶	۲۰	غدد لنفاوی	۴
۰ درصد	۴	آزمایش از ضایعات خارج از دستگاه تناسلی	۱۰
			۳۱۶
		آزمایش‌های بدون جواب	۲۷

برای درمان سرطان دهانه رحم که قسمت بزرگی را تشکیل میدهد مغلوب به عمل جراحی متول شده سپس بیمار را تحت درمان با اشعه X قرار میدهیم.

اخيراً در روش عمل تغيير قابل توجهی داده شده است بدین معنی که توأم با برداشتن رحم و ضمائم آن پaramتر مخصوصاً اطراف عروق بزرگ را که محل متاستاز های لنفاوی است بادقت تراشیده همچنین تاعمق حفره سدادی پیشرفت و چربی و غدد لنفاوی آن ناحیه را کاملاً خارج می‌سازیم.

تابعهال چهار بیمار را بطريق فوق عمل کرده ایم که درسه مورد غدد لنفاوی ناحیه سدادی عاری از متاستاز بوده ولی درمورد چهارم که متأسفانه دختر بسیار جوانی است غدد لنفاوی ناحیه مزبور مبتلا شده بود.

درمواردی که بعلتی عمل ممکن نباشد بیماران را تحت درمان رادیوم تراپی و رادیو تراپی توأم قرار میدهیم و امیدواریم بتوانیم با مقایسه در طریق فوق نتیجه عملی از نظر انتخاب یکی از دو طریق برای درمان انواع کانسرهای دهان زهدان اتخاذ کنیم.

نتیجه :

۱ - خونریزی های رحمی باعت نامعلوم خوش خیم بوده و علت آنها یکی از انواع هی پرپلازی مخاط رحم میباشد. ولی وجود دو مورد سرطان جسم رحم ما را متوجه لزوم امتحان بافت شناسی در مورد خونریزی های باعت نامعلوم مینماید.

۲ - آزارهای دهانه زهدان هر قدر هم ناچیز باشد بایستی از نظر سرطان مورد توجه دقیق قرار گیرد.

۳ - تعداد آندومتریوز در آمار ما برخلاف آمار های ممالک دیگر خیلی کم میباشد.