

## پژوهش افتقادی

نگارش

دکتر امیر پاشا محقق

رئیس درمانگاه بخش پوست بیمارستان پهلوی

نکاتی چند درباره دو بیمار درمان شده توسط A.C.T.H در بیمارستان خورشید اصفهان . مندرج در شماره دهم مجله دانشکده پزشکی :

قبل از آنکه وارد در اصل موضوع بشویم متذکر میشود که اساساً بحث و انتقاد پایه پیشرفت و ترقیات علمی است علیه‌ها اگر ذیلاً مطالبی بیان میشود صرفاً از لحاظ روشن شدن ذهن خوانندگان و هدایت درجهت ثابت تشخیص و درمان است والا هیچ نوع محرک خصوصی مجاز نباشد امر نبوده است :

اینک تشخیص یه-ار اول که بعنوان مسمومیت باداروی نوشالوارسان .

سوال و سوالوارسان و بیسموت به درماتیت اکسفولیاتریس بیان شده است :

اولاً ترکیبات آرسنیکی با مقادیری که در تراپوتیک معمول است هیچ وقت سمی نیست و مقدار سمی ارسنیک خیلی بیشتر از این اندازه‌ها تعیین شده که ما ابدآ تا آن درجه استعمال نمی‌کنیم چون مقدار سمی یک دارو آنقدر است که بتواند واحد کیلو گرام حیوان لا بر اتوار را در یکبار تجویز مسموم کرده و بکشد و با ضرب بزرگتری برای انسان کشند که باشد در صورتی که همه روزه میلیون‌ها نفر در دنیا این مقدار ارسنیک را استعمال می‌کنند و هیچ وقت مسموم نمی‌شوند . علیه‌ها این مقدار ترکیب ارسنیک فقط جنبه درمانی دارد و اگر عارضه‌ای در جریان بیماری پیش آمد صرفاً در تیجه حساسیت در مقابل دارو است مثل هر داروی دیگری که نسبت به بدنها ای مختلف ممکنست حساسیت ایجاد کند، کما اینکه حساسیت در مقابل اسپیرین، ید، بر مورهادر پوست مشاهده می‌گردد و نیز فتل فتالین در مورد بیمار دوم همان مقاله که حساسیت تو لید کرده بود و بخصوص موضوع اوزینوفیلی ۳۶ درصد فرمول خون کاملاً مؤید حالت حساسیت بیمار می‌باشد .

اتفاقاً حوادث ارسنیک در حدود روز نهم تزدیق بنام حوادث روز نهم (۱) وجود دارد یرقان در نتیجه ناسازگاری (۲) و متعاقباً اریترودرمی ارسنیکال که کاملاً کلاسیک و منتظره است دیده میشود چنانکه در مقاله مذکوره در حدود همین روزها بروز عارضه ذکر گردید و اما اثر کیبات بیسموت با مقادیر متداوله هیچ وقت مسمومیت و حتی حساسیت تولید نمیکند ولی مثلاً عارضه تورم لثه‌ها که آنهم بعلت دفع دارو از طریق بزاق است دیده میشود علی الخصوص اریترودرمی بقدرتی در نتیجه بیسموت نادر است که اینجانب تسبیحال آنچه بدنبایش رفتم نمیدم . پس تشخیص بیمه‌واری اولاً اریترودرمی ارسنیکال است در نتیجه حساسیت با ارسنیک نه بوسیله مسمومیت با ارسنیک و بیسموت . ثانیاً این عارضه معمولاً در حدود چند هفته طول کشیده تدریجاً بهبودی می‌آید مگر در موارد شدید که طولانی میشود و درمان کمکی لازم است البته A.C.T.H. چون هر مون مؤثری در ایجاد مقاومت بدنست در سرعت درمان مؤثر شده است .

بیمار دوم : که مبتلا به عارضه اریتماتو دردهان ، صورت ، دستها ، پاهای بوده که تدریجاً در روی لکه‌ها طاول تولید شده در ماتیت بولوز ذکر شده است : این بیمار یقیناً مبتلا به اریتم پلی هرف بوده که در نتیجه حساسیت با فتل فتالئین عارض گردیده تصادفاً تراس آلبو مین ادرار ، اوزینوفیلی خون تعداد لوکوسیت میان این تشخیص است و این شکل بخصوص بیماری رابنام خاص اریتم بولو یا هیدروآدو بازن (۳) مینامند علیهذا درمان بیماری باداروهای ضد حساسیت و آنتی هیستامینیک‌ها با مقادیر کافی مخصوصاً تزدیق داخل وریدی اور و طروپین بخصوص که بیماری دوره‌ای است زود خوب می‌کند ولی عود بیماری ممکن است البته A.C.T.H. باز هم در این مورد فقط درمان راسریع تر کرده اما عود مجدد در بیماریهای سیکلیک (۴) که با A.C.T.H. درمان شده است همیشه دیده میشود علیهذا این دارو رجحانی از این لحاظ بر دواهای دیگر نمیتواند داشته باشد .