

## بررسی اثرات اسید دوکوزاهگزانوییک بر ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری، برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم

### چکیده

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

**زمینه و هدف:** با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکترپیلوری و عوارض ناشی از مزمن شدن آن، هم‌چنین فعالیت ضدبacterیایی علیه هلیکوباکترپیلوری و خواص ضدالتهابی اسیدهای چرب امگا-۳، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری با اسید دوکوزاهگزانوییک (Docosahexaenoic Acid) بر ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری و سطح برخی نشانگرهای التهابی و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم انجام گرفت.

**روش بررسی:** در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی کنترل شده، ۶۶ بیمار آلوده به هلیکوباکترپیلوری (۳۳ مورد و ۳۳ شاهد)، در کنار درمان چهار دارویی عفونت، به طور تصادفی روزانه دو گرم مکمل morDHA یا روغن MCT به عنوان دارونما، به مدت ۱۲ هفته دریافت کردند. دریافت غذایی افراد توسط یادآمد ۲۴ ساعته خوراک جمع‌آوری و با نرم افزار IV Nutritionist آنالیز شد. نمونه‌گیری از خون ناشتا، اندازه‌گیری وزن، قد، نمایه توده بدنی (BMI) و سطح فعالیت بدنی در ابتدا و انتهای مطالعه انجام گرفت.

**یافته‌ها:** میزان ریشه‌کنی عفونت، سطح ایترولوکین-۶ (IL-6)، پروتئین واکنش گر C با حساسیت بالا (hs-CRP) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC) در انتهای مطالعه، بین دو گروه، تفاوت معنی دار نداشت، در حالی که سطح ایترولوکین-۸ (IL-8) بین دو گروه متفاوت بود ( $P=0.008$ ). اختلاف غلظت بین ابتدا و انتهای مطالعه نیز در هیچ یک از فاکتورها بین دو گروه معنی دار نبود.

**نتیجه‌گیری:** دریافت مکمل morDHA در بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری، بر ریشه‌کنی عفونت، سطح سرمی فاکتورهای IL-6، IL-8 و TAC اثر معنی دار نداشت، در حالی که بر سطح hs-CRP مؤثر بود.

**کلمات کلیدی:** هلیکوباکترپیلوری، اسید دوکوزاهگزانوییک، ریشه‌کنی، فاکتورهای التهابی.

شهرام آگاه<sup>۱</sup>

فرزاد شیدفر،<sup>۲</sup> نفیسه خاندوذی<sup>\*</sup>

آغا فاطمه حسینی<sup>۳</sup>

۱- گروه گوارش و کبد، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، واحد بیمارستان رسول اکرم (ص).،

دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۲- گروه تغذیه و بیوشیمی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

۳- گروه آمار، گروه E.D.O، دانشکده آمار و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

\* نویسنده مسئول: تهران، بزرگراه شهید همت، نرسیده

به تقاضه شهد چمران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی، دیارتمان تغذیه و

بیوشیمی، تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۲۷۰۶۰.

E-mail: n-khandouzi@razi.tums.ac.ir

### مقدمه

خاورمیانه ۹۰-٪ است.<sup>۱</sup> شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در ایران در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۹، ۶۹٪ (بالاتر از کشورهای توسعه یافته) گزارش شد.<sup>۲</sup> پیامد عفونت به تداخلات بین باکتری و میزبان، مانند بیماری‌زایی گونه عفونت، توالی ژنتیک و سن میزبان، فاکتورهای محیطی و عادات غذایی بستگی دارد.<sup>۳</sup> چندین مطالعه پیشنهاد کرده‌اند عفونت هلیکوباکترپیلوری می‌تواند در پاتوژن برخی اختلالات خارج گوارشی درگیر باشد. این باکتری با اثراتی مانند آسیب اندوتیال، تکثیر عضله صاف و التهاب

عفونت هلیکوباکترپیلوری مهم‌ترین عامل بیماری‌زایی زخم پیتیک و دلیل مهم دیگر اختلالات گوارشی است.<sup>۱</sup> این عفونت شایع‌ترین عفونت مزمن باکتریایی در جهان بوده،<sup>۴</sup> حدود نیمی از جمعیت جهان حامل این ارگانیسم می‌باشند.<sup>۵</sup> شیوع عفونت در کشورهای دارای امکانات تشخیص، پیشگیری و درمان ۱۰٪ و در کشورهای در حال توسعه ۸۰٪ می‌باشد.<sup>۶</sup> شیوع در میان جمعیت بزرگ‌سال

## روش بررسی

پژوهش حاضر کارآزمایی بالینی کنترل شده با دارونما بوده و به روش تصادفی دوسوکور انجام شد. جامعه آماری پژوهش بیماران بزرگسال ۲۰-۶۰ ساله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم (ص) بودند که عفونت هلیکوباترپیلوری در آنها توسط پزشک و بر اساس نتیجه پاتولوژی نمونه بیوپسی شده از بافت معده تشخیص داده شده و شرایط ورود به مطالعه را داشتند. سایر معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از: نداشتن سابقه درمان دارویی جهت ریشه کنی عفونت هلیکوباترپیلوری، عدم جراحی معده، عدم وجود سابقه زخم پیتیک، نداشتن هرگونه بیماری که باعث ایجاد التهاب و افزایش سطح نشانگرهای التهابی شود مانند دیابت، بیماری های قلبی عروقی، التهابات تنفسی مانند آسم و غیره، عدم مصرف انواع داروها غیر از داروهای تجویز شده طی دوره مطالعه، عدم دریافت آنتی بیوتیک یا بیسموت طی دو ماه گذشته، عدم مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی مانند سلینیم، روی و بتا کاروتون حداقل سه ماه قبل از شروع مطالعه، عدم مصرف مکمل امگا-۳ حداقل سه ماه قبل از شروع مطالعه، عدم مصرف سیگار و داشتن BMI کمتر از ۳۰. معیارهای خروج از پژوهش عبارت بودند از: تغییر در نوع یا دوز داروهای مصرفی طی دوره مطالعه، تغییر در رژیم غذایی یا برنامه فعالیت بدنی روزانه طی دوره مطالعه، مصرف هرگونه مکمل آنتی اکسیدانی طی دوره مطالعه و مصرف کمتر از ۸۰٪ مکمل های تحويل داده شده به بیمار، طی دوره مطالعه. ابتدا از میان بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم (ص)، که با استناد به نتیجه تست کشت بافت، ابتلا به عفونت هلیکوباترپیلوری در آنها تشخیص داده شده بود، تعدادی بیمار که وارد شرایط ورود و همچنین داوطلب شرکت در مطالعه بودند، انتخاب شده و برای شرکت در مطالعه از آنها دعوت به عمل آمد.

این افراد پس از شرکت در جلسه معرفی طرح و تکمیل رضایت نامه کتبی وارد مطالعه شدند. برای تعیین حجم نمونه، داده های اولیه، برای متغیر وابسته کیفی ریشه کنی عفونت، براساس مطالعه Meier<sup>۱۰</sup> و برای متغیرهای وابسته کمی، بر اساس مطالعات Barbosa<sup>۱۱</sup> و Saifullah<sup>۱۲</sup> به دست آمد، به گونه ای که بتوان فرضیه عدم تفاوت در میزان ریشه کنی عفونت و سطح نشانگرهای التهابی

موضعی دیواره عروق خونی<sup>۱۳</sup> و اثر بر متابولیسم لیپید، عو<sup>۱۴</sup> ریسک فاکتور بیماری های قلبی عروقی<sup>۷</sup> محسوب می شود. در ایران مطالعاتی انجام گرفته است که حاکی از رابطه این باکتری با بروز بیماری های آترواسکلروز، سنگ کیسه صفراء، سوء هاضمه، ستدرم متابولیک، دیابت نوع یک و مقاومت به انسولین بود.<sup>۸</sup>

مطالعات بسیاری نشان داده اند عفونت هلیکوباترپیلوری باعث افزایش تولید برخی سایتوکین های پیش التهابی مانند ایترلوکین-۱<sup>۹</sup>، ایترلوکین-۶<sup>۱۰</sup>، ایترلوکین-۸<sup>۱۱</sup>، ایترلوکین-۱۲<sup>۱۲</sup>، فاکتور نکروزه کننده تومور آلفا (TNF-α)<sup>۱۳</sup>، ایترفرون گاما (INF-γ)<sup>۱۴</sup> و پروتئین واکنش گر C با حساسیت بالا<sup>۱۵</sup> در سلول های اپی تلیال معده می شود. همچنین باعث افزایش سطح رادیکال های آزاد (ROS) در مخاط معده شده<sup>۱۶</sup> و ریشه کنی این عفونت باعث کاهش استرس اکسیداتیو ایجاد شده می شود.<sup>۱۷</sup>

اثرات مفید امگا-۳ نتیجه خواص ضدالتهابی، ضدترومبوزی، ضد آریتمی، کاهنده چربی خون و گشادکننده عروق است.<sup>۱۸</sup> ملاحظه شده است که اسیدهای چرب امگا-۳ با ممانعت از تولید ایکوزانوپیدهای مشتق از اسید آراشیدونیک، عملکرد ضدالتهابی دارند.<sup>۱۹</sup> امگا-۳ با کاهش مقدار اسید آراشیدونیک، باعث کاهش تولید لوکوتری این B4، ترومبوکسان A2، پروستاگلاندین E2، ایترلوکین-۱، ایترلوکین-۶ و فاکتور نکروزه کننده تومور، همچنین خنثی کردن رادیکال های آزاد می شود.<sup>۲۰</sup>

مطالعات کشت سلولی نشان می دهند Eicosapentaenoic Acid (EPA) و Docosahexaenoic Acid (DHA) می توانند از تولید سایتوکین های التهابی مانند IL-1β، TNF-α، IL-6، IL-8 توسط مونوцит ها، مکروفاز ها و سلول های اندوتلیال ممانعت کنند.<sup>۱۹</sup> مطالعات مختلف نشان دادند که اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا-۳ (DHA و EPA) در برخی شرایط فعالیت ضدباکتریایی علیه هلیکوباترپیلوری دارند.<sup>۲۱-۲۳</sup>

بنابراین با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباترپیلوری، افزایش سطح نشانگرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به این عفونت و احتمال اثر مفید مکمل یاری با اسید چرب امگا-۳ در بهبود شرایط این بیماران، این مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل یاری با DHA بر ریشه کنی هلیکوباترپیلوری و سطح برخی نشانگرهای التهابی و ظرفیت تمام آنتی اکسیدانی سرم انجام گرفت.

(SFA)، اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA)، اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA)، کلسترول رژیمی، فیبر غذایی، ویتامین‌های A، C، E، بتاکاروتن، آهن، مس، روی، سلنیم و منگنز، در ابتدا، هفته ۲۴ چهارم، هفته هشتم و انتهای مطالعه توسط پرسشنامه Nutritionist IV، Ver. 3.5.2، با نرم‌افزار Axxya Systems LLC، Stafford، TX، USA ساعته خوراک جمع‌آوری و با افزار نرم‌افزار Axxya Systems LLC، Stafford، TX، USA آغاز شد. میزان فعالیت بدنی افراد در ابتدا و انتهای مطالعه توسط پرسشنامه جمع‌آوری افراد به دست آمد. فعالیت بدنی (IPAQ)<sup>۲۴</sup> از طریق مصاحبه با افراد قبل از این مطالعه، این افراد را در سه سطح دارای فعالیت بدنی مرتبط با سلامتی افراد مقایسه برای پایش مقطعی سطح فعالیت بدنی مرتبط با سلامتی افراد در جوامع به کار می‌رود.

در این پرسشنامه سؤالاتی پیرامون نوع فعالیت‌های معمولی که طی هفت روز گذشته توسط افراد انجام گرفته، پرسیده شده و بر اساس امتیاز اخذ شده، افراد را در سه سطح دارای فعالیت بدنی سبک، متوسط و شدید طبقه‌بندی می‌کند. فرم کوتاه این پرسشنامه در سطح وسیع مورد آزمون قرار گرفته و در حال حاضر در بسیاری از مطالعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. از بیماران خواسته شد در طول مطالعه در رژیم غذایی و فعالیت بدنی معمول خود تغییری ایجاد نکنند.

در مدت ۱۲ هفته مداخله، با بیماران تماس تلفنی گرفته می‌شد تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، از مصرف داروهای تجویز شده و مکمل‌ها اطمینان حاصل شود. پس از پایان ۱۲ هفته از بیماران خواسته شد برای انجام تست ریشه‌کنی هلیکوباترپیلوری و آزمایش خون مجدد در حالت ناشتا مراجعه کنند. برای تشخیص ریشه‌کنی هلیکوباترپیلوری از تست تنفسی اوره (UBT) استفاده شد. در این روش غیرتاجمی، میزان CO<sub>2</sub> نشان‌دار از نمونه‌های بازدمی بیمار پس از تجویز خوراکی اوره با کربن نشان‌دار (<sup>13</sup>C) بر پایه اصل <sup>۷۷</sup> فعالیت بالای اوره آری باکتری هلیکوباترپیلوری بررسی می‌شود. حساسیت تست فوق با مصرف داروهای مهارکننده پمپ پروتونی، آنتی‌بیوتیک‌ها و ترکیبات حاوی بیسموت کاهش می‌یابد.

این روش، تست قابل اعتمادی برای بررسی درمان بوده<sup>۲۸</sup> و بر اساس منابع معتبر، به همراه آندوسکوپی، به عنوان روش استاندارد طلایی در تشخیص ابتلا و ریشه‌کنی این میکروگانیسم در ابتدا و انتهای دوره درمان بیماری عنوان شده است.<sup>۲۹</sup> کلیه بررسی‌های اولیه

سرم بین دو گروه را در سطح احتمال خطای نوع اول  $\alpha=0.05$  و با توان آزمون  $\beta=0.80$  رد کرد.

سپس برای اطمینان از این که با حجم نمونه مورد استفاده، بتوان نتیجه مطلوب را از بررسی همه متغیرهای وابسته گرفت، بیشترین تعداد نمونه محاسبه شده در نظر گرفته شد. به این ترتیب حجم نمونه در هر گروه ۳۰ نفر محاسبه شد که با احتساب  $15\%$  ریزش، ۳۵ نفر در هر گروه انتخاب شدند. در ابتدای پژوهش فرم جمع‌آوری اطلاعات عمومی با روش مصاحبه تکمیل شد. برای هر یک از افراد، وزن با استفاده از ترازوی (Digital medical weighing scale، Seca GmbH & Co. KG، Hamburg، Germany) با لباس سبک و با دقت ۰/۵ کیلوگرم و قد با استفاده از متر نواری در حالت ایستاده و مستقیم توسط خطکشی که روی سر فرد قرار داده شده، بدون کفش و با دقت ۰/۵ سانتی‌متر اندازه‌گیری و نمایه توده بدن (BMI) با تقسیم نمودن وزن (کیلوگرم) به مجدور قد (متر مربع) محاسبه شد.

در شروع مطالعه، از افراد پس از ۱۰ تا ۱۲ ساعت ناشتایی ۱۰ سی‌سی نمونه خون گرفته شد. پس از انجام بررسی‌های لازم، مدت پژوهش ۱۲ هفته در نظر گرفته شد و افراد بر اساس گروهی که به طور تصادفی در آن قرار گرفتند، ۱۶۸ کپسول حاوی امگا-۳ یا دارونما دریافت کرده و از آن‌ها خواسته شد دو عدد کپسول در روز میل نمایند. بیماران در هر دو گروه، به مدت ۱۲ هفته، درمان مرسوم چهار دارویی ریشه‌کنی عفونت هلیکوباترپیلوری را دریافت کردند. این پروتکل دارویی شامل مترونیدازول (mg ۵۰۰، دو بار در روز)، آموکسی‌سیلین (gr ۱، دو بار در روز)، بیسموت (mg ۲۴۰، دو بار در روز) و امپرازول (mg ۲۰، دو بار در روز) بود.

مکمل یک گرمی morDHA با ۷۵٪ خلوص حاوی mg ۷۵۰ اسید چرب امگا-۳، Minami Nutrition، Aartselaar، Belgium (EPA ۶۳ mg، DHA ۴۶۵ mg و سایر اسیدهای چرب شامل ۲۲۲ mg MCT بود که در کپسول‌های امگا-۳ بود. دارونمای مصرفی، روغن MCT بود که در کپسول‌های یک گرمی با درجه خلوص ۱۰۰٪، تولید (MCT Oil، Pharma Viva Inc، Thorold، ON، Canada) بود و از نظر شکل ظاهری کاملاً با کپسول امگا-۳ شبیه‌سازی شده بود. قبل از شروع پژوهش، مجموعه قوطی‌های حاوی کپسول‌ها توسط فردی غیر از پژوهشگر کدگذاری شد تا عدم اطلاع بیمار و پژوهشگر مراعات گردد. دریافت کل کالری، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، اسیدهای چرب اشباع

توسط Paired t-test و در متغیرهای با توزیع غیر نرمال توسط Wilcoxon signed-rank test و در ابتدا و انتهای مطالعه بین دو گروه، در متغیرهای با توزیع نرمال توسط Independent t-test Mann-Whitney test انجام شد. متغیرهای با توزیع غیرنرمال توسط FRAP و با استفاده از کیت ELISA با حساسیت ۰/۹۲ pg/ml و سطح hs-CRP با روش (IBL Immuno-Biological Laboratories, Hamburg, Germany) تشخیص ۰/۰۲ µg/ml و سطح TAC با روش رنگ سنجی (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) با استفاده از معرف TPTZ و با حداکثر غلظت قابل اندازه‌گیری ۳۰۰۰ nmol/lit محاسبه شد. ورود اطلاعات و آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از نرمافزار SPSS ویراست ۱۶ انجام شد. در مورد متغیرهای کمی، داده‌ها به کمک میانگین و انحراف میانگین (به صورت Mean±SD) نمایش داده شدند. در مورد متغیرهای کمی، نرمال بودن توزیع ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه تفاوت در ریشه‌کنی عفونت بین دو گروه توسط آزمون  $\chi^2$  صورت گرفت. مقایسه تفاوت در فراسنج‌های بیوشیمیایی خون، قبل و بعد از مداخله در هر گروه، در متغیرهای با توزیع نرمال شماره IRCT201101122709N16 به ثبت رسید.

## یافته‌ها

از ۷۰ نفری که وارد پژوهش شدند، ۶۶ نفر (۳۳ نفر در گروه آزمون و ۳۳ نفر در گروه کنترل) پژوهش را به پایان رسانده و چهار نفر خارج شدند. دلایل خروج افراد شامل مهاجرت، عوارض ناشی از مصرف دارو و مکمل و عدم تمايل به ادامه همکاری بود. گروه آزمون

به جز قد تکرار شد. سطح سرمی IL-6 و IL-8 با روش ELISA و ELISA (Bendermed Med Systems Co., Vienna, Austria) به ترتیب با حساسیت ۰/۹۲ pg/ml و ۰/۰۲ pg/ml، سطح hs-CRP با روش (IBL Immuno-Biological Laboratories, Hamburg, Germany) تشخیص ۰/۰۲ µg/ml و سطح TAC با روش رنگ سنجی (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) با حداکثر غلظت قابل اندازه‌گیری ۳۰۰۰ nmol/lit محاسبه شد. ورود اطلاعات و آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از نرمافزار SPSS ویراست ۱۶ انجام شد. در مورد متغیرهای کمی، داده‌ها به کمک میانگین و انحراف میانگین (به صورت Mean±SD) نمایش داده شدند. در مورد متغیرهای کمی، نرمال بودن توزیع ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف (Kolmogorov-Smirnov) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه تفاوت در ریشه‌کنی عفونت بین دو گروه توسط آزمون  $\chi^2$  صورت گرفت. مقایسه تفاوت در فراسنج‌های بیوشیمیایی خون، قبل و بعد از مداخله در هر گروه، در متغیرهای با توزیع نرمال

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار متغیرهای بیوشیمیایی خون در ابتدا و انتهای مطالعه به تفکیک دو گروه دریافت‌کننده مکمل دوکوزاهگزانویک اسید (DHA) و دارونمای MCT

P*	دارونما (۳۳ نفر)	اسید چرب DHA (۳۳ نفر)	زمان	متغیر
۰/۸۴	۱/۵۵±۲/۳۷	۱/۹۹±۳/۵۸	ابتدای مطالعه	IL-6 (pg/ml)
۰/۶۴	۰/۸۲±۱/۲۰	۱/۴۰±۲/۸۰	انتهای مطالعه	
۰/۴۵	-۰/۷۳±۱/۶۷	-۰/۵۹±۱/۷۲	تفاوت ابتدا و انتها	
-	۰/۰۰۲	۰/۰۰۲		P**
۰/۱۰	۶/۴۵±۷/۰۰	۳/۷۴±۶/۳۰	ابتدای مطالعه	IL-8 (pg/ml)
۰/۰۰۸	۵/۲۸±۵/۰۸	۲/۷۵±۴/۲۱	انتهای مطالعه	
۰/۳۴	-۱/۱۷±۶/۰۲	-۰/۹۹±۲/۸۴	تفاوت ابتدا و انتها	
-	۰/۷۸	۰/۰۱		P**
۰/۸۱	۴/۳۷±۳/۸۱	۴/۷۵±۴/۲۹	ابتدای مطالعه	hs-CRP (µg/ml)
۰/۹۶	۳/۵۲±۲/۷۰	۳/۹۳±۳/۵۴	انتهای مطالعه	
۰/۷۶	-۰/۸۴±۳/۵۶	-۰/۸۱±۲/۹۳	تفاوت ابتدا و انتها	
-	۰/۴۵	۰/۱۷		P**
۰/۰۳	۶۴۶/۶۵۵±۱۶۹/۲۱	۶۲۲/۵۹±۱۴۲/۷۰	ابتدای مطالعه	TAC (nmol/lit)
۰/۶۰	۶۵۴/۴۵۵±۱۳۳/۰۹	۶۷۱/۵۲±۱۳۳/۹۸	انتهای مطالعه	
۰/۱۱	۷/۸۰±۱۲۱/۴۷	۴/۸/۹۳±۱۷۷/۱۳	تفاوت ابتدا و انتها	
-	۰/۷۱	۰/۱۲		P**

\* در مورد متغیرهای IL-6 و IL-8 به علت غیرنرمال بودن توزیع متغیرها، از Independent t-test استفاده شد.

\*\* در مورد متغیرهای IL-6 و IL-8 به علت غیرنرمال بودن توزیع متغیرها، از Wilcoxon test استفاده شد.

جدول ۲: میزان ریشه‌کنی عفونت هلیکوباترپیلوری در بیماران به تفکیک دو گروه دریافت کننده مکمل دوکوزاهگزانوییک اسید (DHA) و دارونمای (MCT)

P*	مجموع (۶۶ نفر)			دارونما (۳۳ نفر)			اسید چرب DHA (۳۳ نفر)			گروه وضعیت ریشه‌کنی
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	
۰/۲	۶۰/۶	۴۰	۵۱/۵	۱۷	۶۹/۷	۲۲	۶۹/۷	۲۲	۶۹/۷	ریشه‌کنی عفونت
	۲۹/۴	۲۶	۴۸/۵	۱۶	۳۰/۳	۱۰	۳۰/۳	۱۰	۳۰/۳	عدم ریشه‌کنی عفونت
	۱۰۰	۶۶	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	۳۳	۱۰۰	مجموع

\* بر اساس آزمون  $\chi^2$  تفاوت معناداری در میزان ریشه‌کنی عفونت بین دو گروه پس از پایان پژوهش وجود ندارد.

از مداخله، نشان داد سطح سرمی IL-6 ( $P=0/002$ ) و IL-8 ( $P=0/01$ ) کاهش معنادار داشت در حالی که تغییرات سطح hs-CRP و TAC ( $P>0/05$ ) معنادار نبود. همچنین سطح IL-6 سرم در گروه شاهد نیز به طور معنادار کاهش یافته بود ( $P=0/002$ ) (جدول ۱).

## بحث

عفونت هلیکوباترپیلوری در بیش از ۸۰٪ بیماران آلوده، با استفاده از درمان‌های استاندارد می‌تواند درمان شود.<sup>۳۰</sup> دلایل اصلی شکست درمان ریشه‌کنی، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و عدم تحمل به علت اثرات ثانویه است. چند راه کاهش شکست در درمان شامل یافتن داروهای جدید و مؤثرتر برای کشتن باکتری‌ها، گسترش روش ایمنی‌زایی (واکسن) برای تحریک دفاع‌های ایمنی میزان یا گسترش شیوه‌های تغذیه‌ای جدید برای کنترل عفونت است.<sup>۵</sup>

با توجه به این‌که در برخی مطالعات دیده شده اسیدهای چرب بلند زنجیره امگا-۳-۳ (DHA) و EPA در برخی شرایط فعالیت ضد باکتریایی علیه هلیکوباترپیلوری دارند،<sup>۲۱-۲۲</sup> پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مکمل یاری با DHA بر ریشه‌کنی هلیکوباترپیلوری و سطح برخی نشان‌گرهای التهابی سرم انجام شد. در این پژوهش، مکمل یاری با مکمل morDHA که اثری بر آن گزارش نشد. از آن‌جا که طبق جستجوهای صورت گرفته، تاکنون مطالعه‌ای بر روی اثر مکمل DHA بر ریشه‌کنی هلیکوباترپیلوری، سطح نشان‌گرهای التهابی و ظرفیت تمام آنتی‌اسیدانی سرم بیماران آلوده به این عفونت انجام نگرفته است، مطالعاتی که شباهت بیشتری با پژوهش ما داشتند، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. Meier در سال ۲۰۰۱ بیان

شامل ۱۴ مرد و ۱۹ زن با میانگین سنی  $۳۷/۰۹\pm ۱۰/۲۸$  و گروه کنترل شامل ۱۲ مرد و ۲۱ زن با میانگین سنی  $۳۸/۶۰\pm ۱۰/۹۲$  سال بود. از نظر توزیع سن، جنس، وزن، نمایه توده بدنی (BMI) و میزان فعالیت بدنی، بین گروه آزمون و کنترل، در ابتدای پژوهش، تفاوت معناداری وجود نداشت ( $P\geq 0/05$ ). همچنین تغییر معنی‌داری در میانگین وزن، نمایه توده بدنی (BMI) و میزان فعالیت بدنی هر دو گروه، طی مدت پژوهش، مشاهده نشد ( $P\geq 0/05$ ). مقایسه رژیم غذایی بیماران در ابتدای پژوهش نشان داد دریافت کل کالری، کربوهیدرات، پروتئین، چربی، اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب تک غیراشباع، اسیدهای چرب چند غیراشباع، کلسترول، فیبر غذایی، ویتامین‌های A، C، بتاکاروتین، آهن، مس، روی، سلینیم و منگنز بین دو گروه در ابتدای مطالعه تفاوت معناداری نداشت ( $P\geq 0/05$ ). به علاوه، در هر دو گروه، تفاوت معناداری در شاخص‌های نامبرده در ابتداء، هفت‌چهارم، هفته هشتم و انتهای مطالعه مشاهده نشد ( $P\geq 0/05$ ). همچنین تفاوتی در سطح متغیرهای بیوشیمیایی مورد بررسی در ابتدای مطالعه بین دو گروه دیده نشد (جدول ۱).

در پایان پژوهش و پس از انجام مداخله، میزان ریشه‌کنی عفونت بین گروه دریافت‌کننده DHA و گروه دارونما تفاوت معنادار نداشت ( $P=0/2$ ) (جدول ۲). همچنین در پایان پژوهش سطح سرمی IL-8 ( $P=0/008$ ) در گروه دریافت‌کننده DHA نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار داشت در حالی که سطح IL-6، hs-CRP، TAC و DHA، پیش و پس از انجام مطالعه در گروه دریافت‌کننده DHA نسبت به گروه کنترل تفاوت معنادار داشت ( $P\geq 0/05$ ) بین دو گروه متفاوت نبود (جدول ۱). البته میانگین اختلاف غلظت بین انتها و ابتدای مطالعه در هیچ یک از فاکتورهای مورد بررسی بین دو گروه تفاوت آماری معنادار نداشت ( $P>0/05$ ). بررسی فاکتورهای سرمی در گروه دریافت‌کننده DHA، پیش و پس

در حالی که سطح سرمی IL-6 را به طور معنادار تغییر داد. البته یافته‌های این پژوهش نشان داد میانگین سطح IL-6 سرم علاوه بر گروه DHA در گروه شاهد نیز به طور معنادار کاهش یافته است. از آنجا که برخی مطالعات نشان داده‌اند سطح IL-6 سرم تا زمانی که عفونت هلیکوباتریپلوری وجود داشته باشد، بالا بوده و غلظت آن پس از درمان دارویی عفونت به تدریج کاهش خواهد یافت<sup>۳۱،۳۲</sup> و با توجه به این که در مطالعه ما بیماران گروه شاهد نیز همانند گروه مداخله، پرتوکل دارویی ریشه‌کنی عفونت را دریافت کرده‌اند، پدیده مشاهده شده می‌تواند به علت اثر درمان دارویی عفونت بر سطح این فاکتور التهابی باشد.

داده‌های مطالعه Yvonne Freund-Levi در سال ۲۰۰۹ در بیماران مبتلا به آلزایمر، همسو با یافته‌های مطالعه ما، اثری از دریافت روزانه چهار گرم مکمل امگا-۳ (حاوی EPA ۱۵۰ mg و DHA ۴۳۰ mg)<sup>۳۳</sup> به مدت شش ماه بر سطح پلاسمایی IL-6 و hs-CRP نشان نداد. در این مطالعه اگرچه دوز مکمل و مدت مداخله بیش از مطالعه ما بود، غلظت پایه فاکتورهای مورد بررسی در بیماران این مطالعه پایین‌تر از مطالعه ما بوده و کاهش مشاهده شده پس از انجام مداخله به لحاظ آماری معنادار گزارش نشد.<sup>۳۴</sup>

نتایج مطالعه Akber Saifullah در سال ۲۰۰۷، بر خلاف نتایج مطالعه ما، حاکی از این بود که دریافت روزانه ۱/۳ g مکمل EPA+DHA به نسبت ۲:۱ در بیماران همودیالیزی به مدت ۱۲ هفتۀ باعث کاهش معنادار در سطح CRP سرم می‌شود. در این مطالعه غلظت پایه فاکتورهای مورد بررسی در بیماران بسیار بیش‌تر از بیماران مطالعه ما بود و شاید به همین دلیل، با وجود استفاده از دوز کمتر از مطالعه ما، کاهش مشاهده شده در فاکتور التهابی مورد بررسی تفاوت معنادار آماری داشته است زیرا این مطالعه بر این اعتقاد است که اثرات ضدالتهابی PUFAس امگا-۳ در افرادی که سطح پایه CRP سرم آن‌ها بالاتر باشد، بهتر نمایان می‌شود.<sup>۳۵</sup>

نتایج مطالعه Barbosa در سال ۲۰۱۰ نیز با نتایج مطالعه ما متناقض بوده و نشان داد دریافت پیراروده‌ای مخلوطی از روغن‌ها، حاوی ۶/۴ گرم اسید چرب امگا-۳ به مدت پنج روز در بیماران سپتیک، باعث کاهش معنادار غلظت IL-6 می‌شود.<sup>۳۶</sup> با این که مدت مداخله در این مطالعه بسیار کوتاه‌تر از مطالعه ما بود، به علت دوز بالای امگا-۳ و غلظت سرمی بسیار بالاتر IL-6 در بیماران سپتیک

کرد به نظر نمی‌رسد دریافت روزانه ۱/۵ گرم مکمل Eicosapen به جای داروی مترونیدازول، در کنار داروهای پت‌پرازول و کلاریترومایسین در رژیم سه دارویی، به مدت هفت روز، در ریشه‌کنی عفونت مفید باشد که با نتایج مطالعه ما هم خوانی داشت. محققین این مطالعه دلیل عدم تأثیر این نوع اسید چرب امگا-۳ را بر ریشه‌کنی عفونت هلیکوباتریپلوری به این صورت توضیح دادند. ممکن است القای آنزیم‌های متابولیک خانواده سیتوکروم P450 توسط مکمل Eicosapen که در گزارش‌های اخیر در موش‌ها توصیف شده است منجر به کاهش غلظت پلاسمایی داروهای مورد استفاده در درمان عفونت شده باشد.

ایزوform‌های سیتوکروم P450 در متابولیسم داروهای مورد استفاده در ریشه‌کنی عفونت در مطالعه Meier درگیر هستند. اهمیت بیان آنزیم سیتوکروم 2C19 P450 برای اثربخشی ریشه‌کنی هلیکوباتریپلوری نشان داده شده است.<sup>۳۷</sup>

برخی مطالعات حداقل میزان ریشه‌کنی عفونت پس از دریافت PUFAs را ناشی از دوز ناکافی آن و یا مدت درمان کوتاه ذکر کرده‌اند.<sup>۳۸</sup> Thompson در مطالعه سال ۱۹۹۴ نشان داد اینکوباسیون هلیکوباتریپلوری در شرایط میکروآئروفیل با محدوده‌ای از اسیدهای چرب چند غیراشبع شامل اسید لینولیک، اسید آراشیدونیک، اسید لینولنیک و EPA اثر مهاری بر رشد این میکروب دارد. در مطالعات با اسید لینولنیک در غلظت‌های ۰/۰۱ M، تقریباً همه PUFAs میکرووارگانیسم‌ها کشته شدند. در غلظت‌های پایین‌تر از اسید لینولنیک در حرکت هلیکوباتریپلوری مشاهده شد. البته مطالعه حاضر، اثر مهاری مصرف PUFAs را بر رشد هلیکوباتریپلوری به صورت In vivo نشان نداد که مشابه یافته‌های پژوهش ما بود. علت احتمالی اثر مثبت PUFAs بر مهار رشد هلیکوباتریپلوری این گونه ذکر شده است. هنگامی که PUFAs در محیط کشت بی‌هوایی با باکتری‌های گرم منفی اینکوبه می‌شوند، به درون غشاهای خارجی تر سلول ارگانیسم گرم منفی وارد شده و سیالیت غشنا را به طور معنی‌دار افزایش می‌دهند. با باز شدن کانال‌های نفوذپذیری، بین ارگانیسم و محیط اطراف، شبیه غلظتی (برای مثال برای یون هیدروژن) ایجاد شده و باعث از هم پاشیدگی سول ارگانیسم و در نتیجه مرگ آن می‌شود.<sup>۳۹</sup> در پژوهش حاضر، مکمل یاری با مکمل morDHA تغییر معناداری در سطح سرمی نشان‌گرهای IL-6 و hs-CRP ایجاد نکرد،

نموده‌اند.<sup>۳۸ و ۴۰</sup>

۱) اسیدهای چرب امگا-۳ ممکن است سطح کاتالاز (آنزیم آنتی‌اکسیدانی) را در پراکسی‌زومها و سیتوپلاسم افزایش داده و بنابراین موجب بهبود دفاع در برابر رادیکال‌های آزاد شوند.

۲) مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا-۳ موجب جایگزینی آن‌ها به جای PUFA می‌شود که مورد حمله رادیکال‌های اکسیژن قرار گرفته‌اند.

۳) از طریق مهار بیان ژنی و تجزیه DNA باعث مهار استرس اکسیداتیو ایجاد‌کننده آپوپتوز می‌شود.

۴) سایر مکانیسم‌ها مانند تغییر در سترز پروستاگلاندین‌ها، تغییر در رونویسی ژن، جلوگیری از انتقال اسیدهای چرب امگا-۶ و تنظیم آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و آپوپتوز

بته اختلاف در نتایج مطالعات ممکن است به دلیل روش‌های متفاوت به کار رفته برای اندازه‌گیری این شاخص باشد، اما به هر حال باید توجه داشت که میزان غلظت PUFAs به ویژه EPA عامل تعیین‌کننده‌ای در ایجاد خطر استرس اکسیداتیو است.<sup>۴۱</sup>

به طور کلی پژوهش حاضر نشان داد مکمل یاری با مکمل امگا-۳ DHA اثری بر ریشه‌کنی عفونت هلیکوباترپیلوری، سطح فاکتورهای سرمی IL-6، IL-8، hs-CRP و TAC نداشت.

محدودیت‌هایی در این پژوهش نیز وجود داشت، تعدادی از بیماران شرکت‌کننده در طول مطالعه، از مطالعه فوق خارج شده و ریزش داشتند. عدم اندازه‌گیری غلظت پلاسمایی اسیدهای چرب امگا-۳ برای کترول بهتر پذیرش مکمل یاری بیماران نیز نقطه ضعف دیگری محاسبه می‌شود. هم‌چنین تعدد معیارهای ورود به مطالعه به مکمل آنتی‌اکسیدانی و مکمل امگا-۳ و عدم سابقه ابتلای قبلی به عفونت موردنظر، به کاهش هرچه بیش‌تر تعداد بیماران وارد شرایط شرکت در مطالعه منجر شده و فرآیند بیماریابی را با مشکلات بسیاری مواجه کرد.

انجام مطالعات مشابه با تعداد افراد بیش‌تر و مدت طولانی‌تر جهت مشاهده بهتر اثر امگا-۳ بر فاکتورهای التهابی، اجرای پژوهشی با استفاده از دوزهای متفاوت اسیدهای چرب امگا-۳ برای بررسی اثرات وابسته به دوز نشانگرهای التهابی و اندازه‌گیری غلظت اسیدهای چرب امگا-۳ در پلاسمای بیماران پس از دریافت مکمل

نسبت به بیماران مطالعه‌ما، نتایج معناداری مشاهده شد.<sup>۳۴</sup> مکانیسم‌هایی که توسط آن اسیدهای چرب امگا-۳ ممکن است از تولید سایتوکین‌های پیش‌التهابی ممانعت کنند، به وسعت بررسی شده است. اثرات امگا-۳ بر بیان ژن سایتوکین‌های التهابی از مسیری اثر می‌گذارند که فعالیت فاکتورهای رونویسی، به احتمال بیش‌تر، رسپتورهای پراکسیزومی تکثیر شونده فعال شده (PPAR) و فاکتور هسته‌ای kappa B (NF-kB) را تعدیل کند. PPAR در یک حالت ضدالتهابی عمل کرده، به طور مستقیم بیان ژن التهابی را تنظیم می‌کند، هم‌چنین با فعال‌سازی NF-kB مداخله می‌کند.<sup>۳۵</sup> NF-kB نیز نقش اصلی را در پاسخ‌های التهابی و اینمنی از طریق تنظیم ژن‌های کد کننده سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مولکول‌های چسبنده، کموکین‌ها، فاکتورهای رشد و آنزیم‌های القا شونده مانند سیکلواکسیژناز و نیتریک ستاباز دارد.<sup>۳۶</sup> اسیدهای چرب امگا-۳ می‌توانند به PPAR آلفا و گاما که بیان ژن‌های هدف را تنظیم می‌کنند، باند شده و آن‌ها را فعال کنند. PPAR ها نیز می‌توانند بیان ژن را از طریق تداخل با مولکول‌های سیگنالینگ مانند NF-kB مهار کرده، بنابراین از تولید سایتوکین‌های پیش‌التهابی جلوگیری کنند.<sup>۳۷</sup> بیش‌تر تحقیقاتی که توانسته‌اند اثر دریافت امگا-۳ را بر نشانگرهای التهابی سرم نشان دهنده، این مکانیسم را ذکر کرده‌اند.<sup>۳۸ و ۳۹</sup>

در پژوهش حاضر، مکمل یاری با مکمل morDHA تغییر معناداری در سطح TAC سرم ایجاد نکرد. مطالعه Toorang در سال ۱۳۸۷ نشان داد دریافت روزانه ۲۷۱۴ mg اسید چرب امگا-۳ و ۱۵۴۸ mg EPA و ۸۲۸ mg DHA به مدت هشت هفته بر ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بی‌تأثیر است.<sup>۴۰</sup> که مشابه نتایج مطالعه ما بود. Sarbolouki در سال ۲۰۱۰ در مداخله‌ای اثر دریافت مکمل سه گرمی EPA به مدت سه ماه را بر افزایش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی و آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو معنادار یافته‌اند،<sup>۴۱</sup> که با نتایج مطالعه ما تناقض داشت. Mahdavi نیز در مداخله‌ای بالینی به اثر دریافت مکمل سه گرمی حاوی ۱/۸ gr EPA+۱/۲ gr DHA به مدت ۱/۵ ماه بر افزایش سطح ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی سرم و ممانعت از تشید استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به سرطان معده تحت شیمی درمانی پس بردنده.<sup>۴۲</sup> مطالعاتی که اثر مثبت امگا-۳ را بر افزایش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی سرم نشان داده‌اند، مکانیسم‌های متعددی را ذکر

امکان پذیر نبود، اعلام می‌نمایند. این مقاله حاصل بخشی از پایان‌نامه تحت عنوان "مقایسه اثرات اسید ایکوزاپتانوئیک و اسید دوکوزاهاگزانوئیک بر ریشه‌کنی عفونت هلیکوباتریلوری، برخی فاکتورهای التهابی و ظرفیت تمام آنتی‌اکسیدانی سرم در مقاطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه در سال ۱۳۹۱ و کد ۱۱۰۱ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.

برای اطمینان از میزان پذیرش مکمل، جذب مؤثّر و شرح مکانیسم عمل ترکیبات پیشنهاد می‌شود.  
سپاسگزاری: بدین وسیله نویسنده‌گان مراتب قدردانی خود را از مسئولین محترم شرکت Minami-nutrition بذریک، به دلیل اهدای مکمل‌های امگا-۳ به این پژوهش، پرسنل محترم اسکوپی و درمانگاه مرکز آموزشی درمانی رسول اکرم (ص) و کلیه شرکت‌کنندگان در این پژوهش که اجرای این طرح جز با همکاری و مساعدت ایشان

## References

1. Khadem Ansari MH, Omrani MD, Sayyah B, Khadem Ansari S. Effect of Helicobacter pylori infection on the lipid, lipoproteins, apolipoprotein-A1, lipoprotein (a) and apolipoprotein-B in patients with gastritis. *Afr J Microbiol Res* 2010;4(1):84-7.
2. Arabi MH, Alvani S, Ehteram H. Lipid profile in subjects with Helicobacter pylori Infection. *Iranian J Pathol* 2010;5(4):199-203.
3. Fuccio L, Laterza L, Zagari RM, Cennamo V, Grilli V, Bazzoli F. Treatment of Helicobacter pylori infection. *BMJ* 2008;337:a1454.
4. Nouraei M, Latifi-Navid S, Rezvan H, Radmard AR, Maghsudlu M, Zaer-Rezaii H, et al. Childhood hygienic practice and family education status determine the prevalence of Helicobacter pylori infection in Iran. *Helicobacter* 2009;14(1):40-6.
5. Bergonzelli GE, Donnicola D, Porta N, Corthésy-Theulaz IE. Essential oils as components of a diet-based approach to management of Helicobacter infection. *Antimicrob Agents Chemother* 2003;47(10):3240-6.
6. Laurila A, Bloigu A, Näyhä S, Hassi J, Leinonen M, Saikku P. Association of Helicobacter pylori infection with elevated serum lipids. *Atherosclerosis* 1999;142(1):207-10.
7. Gillum RF. Infection with Helicobacter pylori, coronary heart disease, cardiovascular risk factors, and systemic inflammation: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. *J Natl Med Assoc* 2004;96(11):1470-6.
8. Bone K. Helicobacter: A hidden factor in cardiovascular, digestive, autoimmune, and skin disorders. *Townsend Letter* 2006;271/272:48.
9. Houghton J, Macera-Bloch LS, Harrison L, Kim KH, Korah RM. Tumor necrosis factor alpha and interleukin 1beta up-regulate gastric mucosal Fas antigen expression in Helicobacter pylori infection. *Infect Immun* 2000;68(3):1189-95.
10. Bassi D, Scirignier M, Toma A, Navaglia F, Di Mario F, Rugge M, et al. Helicobacter pylori infection enhances mucosal interleukin-1 beta, interleukin-6, and the soluble receptor of interleukin-2. *Int J Clin Lab Res* 1996;26(3):207-10.
11. Noach LA, Bosma NB, Jansen J, Hoek FJ, van Deventer SJ, Tytgat GN. Mucosal tumor necrosis factor-alpha, interleukin-1 beta, and interleukin-8 production in patients with Helicobacter pylori infection. *Scand J Gastroenterol* 1994;29(5):425-9.
12. Karttunen RA, Karttunen TJ, Yousfi MM, el-Zimaity HM, Graham DY, el-Zaatari FA. Expression of mRNA for interferon-gamma, interleukin-10, and interleukin-12 (p40) in normal gastric mucosa and in mucosa infected with Helicobacter pylori. *Scand J Gastroenterol* 1997;32(1):22-7.
13. Jung HC, Kim JM, Song IS, Kim CY. Helicobacter pylori induces an array of pro-inflammatory cytokines in human gastric epithelial cells: quantification of mRNA for interleukin-8, -1 alpha/beta, granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, monocyte chemoattractant protein-1 and tumour necrosis factor-alpha. *J Gastroenterol Hepatol* 1997;12(7):473-80.
14. Yun CH, Lundgren A, Azem J, Sjöling A, Holmgren J, Svennerholm AM, et al. Natural killer cells and Helicobacter pylori infection: bacterial antigens and interleukin-12 act synergistically to induce gamma interferon production. *Infect Immun* 2005;73(3):1482-90.
15. Jafarzadeh A, Hassanshahi GH, Nemati M. Serum levels of high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) in Helicobacter pylori-infected peptic ulcer patients and its association with bacterial CagA virulence factor. *Dig Dis Sci* 2009;54(12):2612-6.
16. Zhang QB, Nakashabendi IM, Mokhashi MS, Dawodu JB, Gemmell CG, Russell RI. Association of cytotoxin production and neutrophil activation by strains of Helicobacter pylori isolated from patients with peptic ulceration and chronic gastritis. *Gut* 1996;38(6):841-5.
17. Kebapciar L, Sari I, Renkal AH, Alacacioglu A, Yuksel A, Ilhan E, et al. The influence of Helicobacter pylori eradication on leptin, soluble CD40 ligand, oxidative stress and body composition in patients with peptic ulcer disease. *Intern Med* 2009;48(24):2055-9.
18. Turner D, Shah PS, Steinhart AH, Zlotkin S, Griffiths AM. Maintenance of remission in inflammatory bowel disease using omega-3 fatty acids (fish oil): a systematic review and meta-analyses. *Inflamm Bowel Dis* 2011;17(1):336-45.
19. Calder PC. Polyunsaturated fatty acids and inflammatory processes: New twists in an old tale. *Biochimie* 2009;91(6):791-5.
20. Friedman A, Moe S. Review of the effects of omega-3 supplementation in dialysis patients. *Clin J Am Soc Nephrol* 2006;1(2):182-92.
21. Meier R, Wettstein A, Drewe J, Geiser HR; Swiss Helicobacter-Study Group. Fish oil (Eicosapen) is less effective than metronidazole, in combination with pantoprazole and clarithromycin, for Helicobacter pylori eradication. *Aliment Pharmacol Ther* 2001;15(6):851-5.
22. Giuseppe F, Maria Teresa P, Alessandra P, Dina M, Adriana M, Renzo C, et al. Polyunsaturated fatty acid dietary supplementation: An adjuvant approach to treatment of Helicobacter pylori infection. *Nutr Res* 2000;20(7):907-16.
23. Thompson L, Cockayne A, Spiller RC. Inhibitory effect of polyunsaturated fatty acids on the growth of Helicobacter pylori: a possible explanation of the effect of diet on peptic ulceration. *Gut* 1994;35(11):1557-61.
24. Barbosa VM, Miles EA, Calhau C, Lafuente E, Calder PC. Effects of a fish oil containing lipid emulsion on plasma phospholipid fatty acids, inflammatory markers, and clinical outcomes in septic patients: a randomized, controlled clinical trial. *Crit Care* 2010;14(1):R5.

25. Saifullah A, Watkins BA, Saha C, Li Y, Moe SM, Friedman AN. Oral fish oil supplementation raises blood omega-3 levels and lowers C-reactive protein in haemodialysis patients: a pilot study. *Nephrol Dial Transplant* 2007;22(12):3561-7.
26. Sjostrom M, Anisworth A, Bauman A, Bull F, Craig C, Sallis J. Guidelines For Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Short and Long Forms, Nov 2005.
27. Peng NJ, Lai KH, Liu RS, Lee SC, Tsay DG, Lo CC, et al. Capsule 13C-urea breath test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection. *World J Gastroenterol* 2005;11(9):1361-4.
28. Ables AZ, Simon I, Melton ER. Update on Helicobacter pylori treatment. *Am Fam Physician* 2007;75(3):351-8.
29. Graham DY, Rakel RE, Fendrick AM, Go MF, Marshall BJ, Peura DA, et al. Recognizing peptic ulcer disease. Keys to clinical and laboratory diagnosis. *Postgrad Med* 1999;105(3):113-6, 121-3, 127-8 passim.
30. Ohno T, Kita M, Yamaoka Y, Imamura S, Yamamoto T, Mitsufuji S, et al. Antimicrobial activity of essential oils against Helicobacter pylori. *Helicobacter* 2003;8(3):207-15.
31. Crabtree JE, Shallcross TM, Heatley RV, Wyatt JI. Mucosal tumour necrosis factor alpha and interleukin-6 in patients with Helicobacter pylori associated gastritis. *Gut* 1991;32(12):1473-7.
32. Lu H, Wu JY, Kudo T, Ohno T, Graham DY, Yamaoka Y. Regulation of interleukin-6 promoter activation in gastric epithelial cells infected with Helicobacter pylori. *Mol Biol Cell* 2005;16(10):4954-66.
33. Freund-Levi Y, Hjorth E, Lindberg C, Cederholm T, Faxen-Irving G, Vedin I, et al. Effects of omega-3 fatty acids on inflammatory markers in cerebrospinal fluid and plasma in Alzheimer's disease: the OmegAD study. *Dement Geriatr Cogn Disord* 2009;27(5):481-90.
34. Kiecolt-Glaser JK, Belury MA, Andridge R, Malarkey WB, Glaser R, et al. Omega-3 supplementation lowers inflammation and anxiety in medical students: a randomized controlled trial. *Brain Behav Immun* 2011;25(8):1725-34.
35. Ferrucci L, Cherubini A, Bandinelli S, Bartali B, Corsi A, Lauretani F, et al. Relationship of plasma polyunsaturated fatty acids to circulating inflammatory markers. *J Clin Endocrinol Metab* 2006;91(2):439-46.
36. Lawrence T, Willoughby DA, Gilroy DW. Anti-inflammatory lipid mediators and insights into the resolution of inflammation. *Nat Rev Immunol* 2002;2(10):787-95.
37. De Caterina R, Liao JK, Libby P. Fatty acid modulation of endothelial activation. *Am J Clin Nutr* 2000;71(1 Suppl):213S-23S.
38. Toorang F, Djazayeri A, Jalali M, Eshraghian M.R, Farvid M, Pooya SH, et al. The effect of supplementation with omega-3 fatty acids on HbA1c, total antioxidant capacity and superoxide dismutase and catalase activity in type 2 diabetic patients. *Iran J Food Sci Tech* 2008;3(4):1-8. [Persian]
39. Sarbolouki S, Djalali M, Dorosty AR, Djazayery SA, Eshraghian MR, Ebadi SAR, Hashemi SB. Effects of EPA and vitamin E on serum enzymatic antioxidants and peroxidation indices in patients with type II Diabetes Mellitus. *Iranian J Publ Health* 2010;39(3):82-91.
40. Mahdavi R, Nemati A, Faizi I, Amani M, Alimohammadi Asl H, Mazani M, et al. Effect of ω-3 Fatty Acid Supplementation on Oxidative Stress in Gastric Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. *J Ardabil Univ Med Sci* 2011;11(2):166-175. [Persian]
41. Mori TA, Woodman RJ, Burke V, Pudsey IB, Croft KD, Beilin LJ. Effect of eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid on oxidative stress and inflammatory markers in treated-hypertensive type 2 diabetic subjects. *Free Radic Biol Med* 2003;35(7):772-81.

## The effects of Docosahexaenoic Acid (DHA) on Helicobacter pylori eradication, some serum inflammatory factors and total antioxidant capacity

Shahram Agah M.D.<sup>1</sup>  
Farzad Shidfar Ph.D.<sup>2</sup>  
Nafiseh Khandouzi M.Sc.<sup>2\*</sup>  
Agha Fatemeh Hosseini M.Sc.<sup>3</sup>

1- Department of Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2- Department of Nutrition and Biochemistry, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3- Department of Math and Statistics, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

### Abstract

Received: April 06, 2013 Accepted: May 27, 2013

**Background:** As regard to high prevalence of Helicobacter pylori infection and complications of its persistence, as well as anti-bacterial activity against of Helicobacter pylori and anti-inflammatory properties of omega-3 fatty acids, this study was conducted to evaluate the effects of supplementation with Docosahexaenoic Acid (DHA) on the eradication of Helicobacter pylori infection, some serum inflammatory markers and total antioxidant capacity.

**Methods:** In a double-blind, placebo-controlled clinical trial, 66 H. pylori positive patients (33 in the intervention group and 33 in the control group), along with tetra-drugs H. pylori eradication regimen, randomly received daily two grams morDHA supplement or Medium Chain Triglyceride (MCT) oil as placebo for 12 weeks. Dietary intake data was collected by 24 hour food recall and analyzed by Nutritionist IV software. Sampling from fasting blood and measuring weight, height, body mass index (BMI) and level of physical activity were done at the first and the end of the study. As well as, eradication test of the infection was performed for all patients at the end of the intervention.

**Results:** Eradication rate of the infection, the level of interleukin-6 (IL-6), high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and total antioxidant capacity (TAC) didn't have significant difference between two groups at the end of the study ( $P>0.05$ ), while the level of interleukin-8 (IL-8) was different between two groups ( $P=0.008$ ). Difference of the concentration between the beginning and the end of the study was not significant in any factors between two groups ( $P>0.05$ ).

**Conclusion:** Intake of morDHA supplement didn't have significant effect on the eradication of H. pylori, serum levels of IL-6, hs-CRP and TAC, while it was effective on the level of IL-8.

**Keywords:** docosahexaenoic acid, eradication, helicobacter pylori, inflammatory factors.

\* Corresponding author: Department of Nutrition & Biochemistry, School of Nutritional Sciences & Dietetics, Tehran University of Medical Sciences, Shahid Hemmat Highway, Before Intersection of Shahid Chamran Highway, Tehran.

Tel: +98- 21- 88622706  
E-mail: n-khandouzi@razi.tums.ac.ir