

نتایج درمانی تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی در بیماران مبتلا به نارسایی ولوفارنژیال

چکیده

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۰۳/۲۹

* فرید فریدونی
حمیدرضا فتحی

زمینه و هدف: پلاسمای غنی از پلاکت مشتق اتوولوگ خون است که به تازگی اهمیت استفاده بالینی از آن در جراحی پلاستیک مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه نتایج درمانی تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی در بیماران مبتلا به نارسایی ولوفارنژیال ارزیابی شد.

رووش بررسی: در این مطالعه آینده‌نگر، در ۱۵ بیمار (۹ نفر پسر و شش نفر دختر) در گروه سنی ۱۵-۲۰ سال مبتلا به شکاف کام و نارسایی ولوفارنژیال خفیف/متوسط، تزریق ترکیب یک میلی‌لیتر (PRP) Platelet-Rich Plasma (PRP) و چهار میلی‌لیتر چربی تحت سدیش در دیواره خلفی حلق در محاذات ولوم روی فاشیای پرهورتبرال انجام شد. قبل از تزریق، شش هفته و شش ماه پس از تزریق با اندوسکوپی نازال صدای بیمار ضبط شد و پاتولوژی گفتاری بیمار توسط گفتار درمان تعیین شد.

یافته‌ها: جایه‌جایی ولار شش هفته پس از تزریق افزایش معناداری را نشان داد ($P=0.049$). سایز Gap شش هفته پس از تزریق در ۶۰٪ بیماران ناپدید شد ($P=0.19$). شش ماه پس از تزریق میزان جایه‌جایی دیواره‌های دیواره‌های فارنژیال در ۷۳٪/۳٪ موارد افزایش معناداری را نشان داد ($P=0.04$). در ارزیابی آثrodینامیک، عبور هوا از بینی هنگام تکرار کلمات کاهش معناداری را داشت ($P<0.05$). هم‌چنین ارزیابی گفتار درمانی بهبود معناداری را در کیفیت تکلم بیماران نشان داد ($P<0.05$).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی منجر به بهبود رزونانس صوتی و کاهش عبور هوا از بینی در موارد درمان شده می‌شود که می‌توان آن را جایگزین پروسیجرهای مازور مانند ولوفارنژیوپلاستی در درمان نارسایی ولوفارنژیال خفیف/متوسط نمود.

کلمات کلیدی: نارسایی ولوفارنژیال، تزریق توام پلاسمای غنی از پلاکت و چربی، هیپرنازالیتی، تکلم.

گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، خیابان قربانی
تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۳۸۱۵۳
E-mail: hamifathi@yahoo.com

مقدمه

مشتق می‌شوند. درمان مرسوم این نارسایی جراحی و براساس ولوفارنژیوپلاستی می‌باشد. این نارسایی می‌تواند از عوارض پس از عمل ترمیم شکاف کام باشد.^۱ ترمیم دیواره خلفی فارنژیال می‌تواند با تهاجم کمتر و با گرافت چربی نیز انجام شود.^۲ در جراحی پلاستیک، استفاده از مشتقات خونی اوتولوگ به طور وسیعی به فیرین محدود شده است که به طور عمده برای ایجاد هموستانز و چسبندگی فلاب‌های پوستی از آن استفاده می‌شود.

کام نرم و دیواره فارنژیال از لحاظ آناتومی ساختمانی شبیه دریچه را تشکیل می‌دهند که به عنوان اسفنکتر ولوفارنژیال شناخته می‌شوند. به انسداد ناقص ولوفارنژیال نارسایی ولوفارنژیال گفته می‌شود که موجب ایجاد هیپرنازالیتی و تکلم مبهم و نامفهوم می‌شود. بیشترین موارد نارسایی ولوفارنژیال از ناهنجاری‌های مادرزادی بافت نرم

بیمار ضبط شد. سپس در اتاق عمل تحت سدیشن با میدازولام برای تمام بیماران اندوسکوپی نازال انجام شد و با آنالیز فیلم اندوسکوپی نازال در بیماران میزان جابه‌جایی کام نرم، دیواره جانبی فارنزیال و قسمت خلفی فارنزیال حین تکرار کلمات و جملات ارایه‌شده توسط گفتار درمان اندازه‌گیری و ثبت شد. هم‌زمان با انجام اندوسکوپی نازال صدای بیمار نیز ضبط شد و پاتولوژی گفتاری بیمار توسط گفتار درمان تعیین شد. روش سنجش گفتار درمان استفاده از اصوات مختلف با آوای کوتاه و بلند و کلمات و جملات کامل بود. پس از اندوسکوپی نازال، نوار ویدیو ضبط شده مرور گردید و میزان فاصله ولوفارنزیال، جابه‌جایی کام نرم و دیواره طرفی و خلفی فارنزیال توسط جراح ترمیمی و پلاستیک و رزونанс هیپرنازال و خروج هوا از بینی، عبور هوا از بینی، قابلیت فهم کلمات توسط گفتار درمان ارزیابی شد.

میزان فاصله ولوفارنزیال، جابه‌جایی کام نرم و حرکت دیواره خلفی و طرفی فارنزیال در زمان‌های مختلف قبل از عمل، شش هفته و شش ماه پس از عمل با آنالیز فیلم اندوسکوپی نازال با استفاده از نرم‌افزار Viewbox4, version 4.0.1 (dHLA Software Co., Kifissia, Greece) با بررسی سکانس‌های یک ثانیه‌ای از فیلم‌های ویدیویی ضبط شده اندازه‌گیری شد. میزان فاصله ولوفارنزیال براساس پنج درجه تقسیم‌بندی می‌شود که بیماران با نارسایی ولوفارنزیال درجه یک تا سه دارای قابلیت تزریق توان چربی و PRP می‌باشند.^۶ درجه‌بندی نارسایی ولوفارنزیال به صورت زیر می‌باشد: انسداد کامل ولوفارنزیال، مشاهده فاصله ناپایدار مخاط، درگیری فاصله کمتر از ۰٪ /۲۵٪ /۵۰٪ /لوفارنزیال هنگام استراحت، درگیری فاصله ۰٪ تا ۵٪ /لوفارنزیال، درگیری شدید فاصله بیش از ۵٪ /لوفارنزیال.

ارزیابی فهم گفتار، هیپرنازالیتی و عبور هوا از بینی توسط گفتار درمان تعیین شد. ارزیابی فهم گفتار براساس پنج درجه تقسیم‌بندی می‌شود که صفر بدون اختلال و چهار با اختلال شدید می‌باشد. هیپرنازالیتی و عبور هوا از بینی براساس چهار درجه تقسیم‌بندی می‌شود: صفر (طبیعی)، یک (اختلال خفیف)، دو (اختلال متوسط)، سه (اختلال شدید).

تکنیک تهیه PRP: ۱۰ میلی‌لیتر خون وریدی بیمار را در دستگاه سانتریفیوز با دور ۸۰۰۰ گراد در سه دقیقه با استفاده از کیت PRP (Myocell, USA) سانتریفیوز شد که پلاسمما و خون جدا شده و

به تازگی در مطالعاتی مزایای استفاده از ترکیب Platelet-Rich Plasma (PRP) و بافت چربی را نشان داده‌اند که افزودن PRP به گرافت چربی منجر به طولانی شدن مدت نگهداری گرافت چربی شده و در رژنراسیون بافت موثر است.^۷ بنابراین PRP مانع جذب چربی اوتولوگ شده و بهبودی بهنسبت پایدار و طولانی مدتی را ایجاد می‌کند.

لذا پژوهشگران در این مطالعه بهدلیل افزایش روزافزون ترمیم شکاف کام، اهمیت درمان نارسایی ولوفارنزیال ثانویه به ترمیم شکاف کام، اهمیت بهبودی در آوا و ادای کلمات به‌طوری که واضح‌تر بوده و ابهام کم‌تری داشته باشد، استفاده از روشی غیرتهاجمی، کاهش هزینه‌های بیمار، عدم تحقیق ثبت شده‌ای در این زمینه در ایران و کاهش هزینه‌های درمانی بیماران به ارزیابی نتایج درمانی تزریق توانم پلاسمای غنی از پلاکت و چربی در بیماران مبتلا به نارسایی ولوفارنزیال پرداخته‌اند.

روش بررسی

این مطالعه بهروش کارآزمایی بالینی در بین بیماران مبتلا به نارسایی ولوفارنزیال ثانویه به ترمیم شکاف کام که در بخش جراحی ترمیمی و پلاستیک بیمارستان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۹۱ بستری شده بودند، انجام شد. بدین‌ترتیب که کلیه افراد مراجعه‌کننده تا تکمیل حجم نمونه مورد نظر به شرط دارا بودن معیارهای پذیرش انتخاب شدند.

معیارهای ورود شامل رضایت مبنی بر شرکت در طرح تحقیقاتی، بیماران با شکاف کام ترمیم شده، سن ۱۵-۲۰ سال، بیماران با هر نوع نقص در ناحیه ولوم و دیواره فارنزیال، بیماران کاندید تزریق توانم چربی و PRP، ابتلا به نارسایی ولوفارنزیال خفیف و متوسط با تایید تشخیص اندوسکوپی نازال و معیارهای خروج شامل بیماران با عدم رضایت برای شرکت در طرح، اختلالات نورولوژی، عقب‌افتدگی ذهنی، تومور در ناحیه ولوفارنزیال، کاهش شناوبی، وجود فلپ فارنزیال، فیستول اورونازال، لوزه‌های بزرگ و نارسایی ولوفارنزیال شدید بودند.


قبل از اندوسکوپی نازال، ابتدا گفتار درمان کلمات و عباراتی را بیان می‌کرد و از بیمار خواسته می‌شد که آن‌ها را تکرار کند و صدای

و حرکت دیواره خلفی و طرفی فارنژیال با آنالیز فیلم اندوسکوپی نازال توسط جراح ترمیمی و پلاستیک، رزونانس هیبرنزاال و خروج هوا از بینی، جریان هوا در بینی، قابلیت فهم کلمات توسط گفتار درمان در مدت بی‌گیری ارزیابی شد. سپس اطلاعات دموگرافیک، یافته‌های اندوسکوپی نازال و بررسی‌های گفتار درمانی در فرم‌های اطلاعاتی از پیش آماده شده ثبت گردید.

کلیه اطلاعات کدگذاری شده، توسط برنامه آماری SPSS ویراست ۱۶ وارد حافظه رایانه گردیدند. سپس تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی با استفاده از تست‌های ANOVA Repeated measurement ANOVA و متغیرهای رتبه‌ای با استفاده از Wilcoxon test صورت پذیرفت. $P < 0.05$ از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

میانگین سن افراد مورد بررسی $16/1 \pm 1/2$ سال در محدوده سنی ۱۵-۱۹ سال بود. میزان جابه‌جایی ولار شش ماه پس از تزریق $1/0 \pm 0/3$ میلی‌متر بود که در مقایسه با قبل از تزریق و شش هفته پس از تزریق کاهش معناداری را نشان داد ($P = 0/049$) (نمودار ۱). شش هفته پس از تزریق افزایش جابه‌جایی ولار در 10 نفر ($7/6\%$) مشاهده شد. شش هفته پس از تزریق سایز Gap در دو نفر ($26/7\%$) بدون تغییر، چهار نفر ($40/2\%$) کاهش و در 9 نفر ($60/13\%$) نمودار ۱:




از آن استخراج می‌شود.

چربی از قسمت تحتانی شکم و در بیماران لاغر از ران به دست آمد. نواحی دهنده با لیدوکائین و اپی‌نفرین $1:10000$ واحد اینفیلتره شدن و بافت چربی با لیپوساکشن تحت فشار منفی خفیف با سرنگ (Supa medical devices, Tehran, Iran) Luer-lock کانولای-۲ hole-۲ انجام شد و چربی به دست آمد. تکنیک آسپیراسیون چربی با روش Coleman انجام شد.⁷ برای جداسازی سه لایه داخلی چربی با دور 1200 گراد در سه دقیقه سانتریفیوژ انجام شد. (چربی لایه فوقانی ادیپوسیت پاره شده، لایه میانی قطعات چربی و لایه آب‌دار تحتانی شامل خون و لیدوکائین). لایه چربی با استفاده از سوزن آسپیره شد و لایه مایع تحتانی با خروج سرپوش سرنگ-Luer lock خارج شد. چربی مطلوب باقی‌مانده به سرنگ 5ml انتقال داده شد. لازم به ذکر است که تنها لایه ادیپوز تزریق شد.


پس از سدیشن بیمار با $10\text{ }\mu\text{g/kg}$ فنتانیل و 1 mg/kg میدازولام در حالی که بیمار در پوزیشن Rose قرار داشت، از دهان بازکن برای رویت فارنکس استفاده شد. کام نرم تحت کشش متوسط به سمت بالا کشیده شد، پس از رویت دیواره خلفی فارنکس با نازال اندوسکوپی تزریق توام چربی و PRP از داخل دهان در ساب موکوس فارنکس با کانولای شماره 10 تحت دید نازال اندوسکوپی انجام شد.

ناحیه اصلی تزریق در قسمت میانی محل انسداد ولوفارنژیال حین تلفظ و ادای کلمات می‌باشد. تزریق ترکیب PRP یک میلی‌لیتر (کام نرم) روی فاشیای پرهورتیوال انجام شد. همچنین از تزریق عمیق به لیگامان ورتبرال یا طرفی در تماس با فاشیا اجتناب شد. پس از عمل و ریکاوری از سدیشن، بیمار قادر به صحبت و بلعیدن بود. بیماران به مدت پنج روز به صورت پروفیلاکسی کپسول سفالکسین 500 میلی‌گرم هر شش ساعت و قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی‌گرم دو بار در روز دریافت کردند.

بیماران از طریق تماس تلفنی، مصاحبه و ویزیت مجدد شش هفته و شش ماه پس از تزریق پی‌گیری شدند. ویزیت مجدد بیماران به صورت مراجعه به درمانگاه جهت معاینه و اندوسکوپی نازال توسط جراح ترمیمی و پلاستیک و بررسی بهبود تکلم توسط گفتار درمان بود. لازم به ذکر است که میزان فاصله ولوفارنژیال، جابه‌جایی کام نرم



نمودار ۳: مقایسه میزان جابه‌جایی دیواره‌های طرفی فارنژیال بر حسب میلی‌متر پس از عمل در زمان‌های مختلف در بیماران مورد بررسی ($P=0.04$)



نمودار ۲: تغییرات سایز Gap بر حسب میلی‌متر شش هفته پس از عمل در بیماران مورد بررسی

جدول ۱: مقایسه ارزیابی اندوسکوپی نازال و گفتار درمانی در زمان‌های مختلف قبل و پس از درمان در بیماران مورد بررسی

P	شش ماه بعد	شش هفته بعد	قبل از تزریق	
* <0.49	1.0 ± 0.3	0.9 ± 0.2	0.7 ± 0.3	میزان جابه‌جایی ولار (mm)
** <0.35	0.64 ± 0.37	0.95 ± 0.54	2.95 ± 0.29	Nasoendoscopic rating
*** <0.40	1.10 ± 0.24	1.25 ± 0.62	2.87 ± 0.46	هیپرنازالیتی
*** <0.39	0.25 ± 0.67	0.40 ± 0.59	1.75 ± 0.92	خروج هوا از بینی
* <0.15	9.60 ± 2.95	16.57 ± 4.94	30.25 ± 7.92	جریان هوا در بینی (%)
*** <0.02	0.26 ± 0.41	0.50 ± 0.97	2.35 ± 0.68	قابلیت فهم کلمات

* آزمون آماری ANOVA، مقادیر معنادار $P<0.05$ ** آزمون آماری Wilcoxon test، مقادیر معنادار $P<0.05$

بحث

در بیماران با ترمیم شکاف کام، مشکلات گفتاری به دو صورت نارسایی و لوفارنژیال و خطاهای گفتاری ظاهر می‌کند که نیاز به مداخلات جراحی و گفتار درمانی را در این بیماران برای بهبود عملکرد لوفارنژیال مطرح می‌کند.^{۷۹} چندین فاکتور با عملکرد لوفارنژیال مرتبط هستند که می‌توان به طول و تحرک کام نرم، حرکت میانی دیواره جانبی فارنژیال، حرکت قدامی دیواره فارنژیال خلفی، وجود لبه Passavant و ضخامت بافت آدنوبید اشاره نمود.^{۱۰} در مطالعه حاضر تزریق توام چربی و PRP موجب کاهش معنادار

نایپدید شد که از نظر آماری کاهش معناداری را نشان داد ($P=0.019$). نایپدید شد که از نظر آماری کاهش معناداری را نشان داد ($P=0.019$). افزایش جابه‌جایی ولار و تغییر سایز Gap شش ماه بعد از تزریق مشابه شش هفته پس از تزریق بود. میزان جابه‌جایی دیواره‌های طرفی فارنژیال شش ماه پس از تزریق در ۱۱ نفر (0.73 ± 0.73)٪ و در چهار نفر (0.26 ± 0.26)٪ بود که از نظر آماری افزایش معناداری را نشان داد ($P=0.04$) (نمودار ۳). در هیچ‌یک از بیماران قبل و پس از تزریق در دیواره خلفی فارنژیال جابه‌جایی مشاهده نشد. مقایسه ارزیابی اندوسکوپی نازال و گفتار درمانی در زمان‌های مختلف قبل و پس از درمان انجام شد که در تمام موارد از نظر آماری تفاوت معناداری به دست آمد (جدول ۱).

ناحیه ترمیم در مدت پی‌گیری می‌شود. به نظر می‌رسد که PRP می‌تواند شرایط مناسبی را برای واسکولاریزاسیون نوآنژیوژنیک و فعالیت فیبروبلاست‌ها و بهدنال آن بقای بافت آدیپوز و سازمان‌دهی سه‌بعدی فراهم نماید. از طرفی تزریق سلول‌های چربی در مناطقی که دارای قابلیت حل در چربی نمی‌باشد به دلیل کاهش نکروز چربی که ناشی از بهبود رشد عروقی در منطقه تزریق می‌باشد موجب افزایش بقای چربی در این نواحی می‌شود. در مطالعه حاضر تکنیک مورد استفاده در تهیه چربی به گونه‌ای است که بافت چربی با خلوص بالا به دست آمده و با وجود جداسازی مایع قسمت چربی از سروزای خون دیواره آدیپوسیت بافت چربی به خوبی حفظ شده است.^{۱۹} در مطالعات مختلف بسته به استفاده از گرافت چربی در بیماری‌های مختلف از روش‌های مختلفی برای تهیه آن استفاده شده است.^{۲۰-۲۱} در مطالعه ما از تکنیک کلمن برای آماده‌سازی چربی به منظور تزریق در ناحیه موردنظر استفاده شده است. افزودن PRP به چربی باعث طولانی‌شدن مدت نگهداری بافت چربی گرفت شده و افزایش مدت اثر آن بر رژنراسیون بافت می‌شود.

با توجه به یافته‌های به دست آمده در مطالعات اخیر دریافت بافت آدیپوز طبیعی حاوی اجزای استرومال-واسکولار که غنی از سلول‌های بنیادی هستند، فاکتورهای آنژیوژنیک را ترشح می‌کنند که می‌تواند منجر به تولید عروق کوچک و بهبود گردش خون در آن ناحیه شود.^{۲۲-۲۳} براساس یافته‌های به دست آمده در دیگر مطالعات وقایع زنجیره‌ای که منجر به مزانشیمالیزاسیون بافت می‌شوند می‌تواند بهدنال هدف قرار دادن نواحی آسیب‌دیده، ترشح فاکتورهای آنژیوژنیک، تشکیل عروق جدید و اکسیژن‌اسیون ایجاد شود. این روند می‌تواند شرایط لازم برای ایجاد سلول‌های بنیادی در آدیپوسیت‌های مچور و میکروسیرکولاسیو نهایی که به تازگی تشکیل شده‌اند و جایگزین‌های بافت‌های آسیب‌دیده موجود را فراهم نماید.^{۱۹}

پالایش لیپوآسپیرات و کارگذاری چندلایه‌ای آن از فاکتورهای مهم افزایش بقای پیوند چربی می‌باشد.^۷ چربی می‌تواند باعث بهبود خواص ویسکوالاستیک بافت ولار شود که در موارد نارسایی و لوفارنژیال ثانویه به ترمیم کام با اثرات درمانی مطلوبی همراه است. تزریق چربی با نرم کردن و لوم سخت سیکاتریسی می‌تواند با افزایش برآمدگی و کشش اسفنکتر و لوفارنژیال حین انسداد موجب بهبود نارسایی و لوفارنژیال شود.

هیپرنازالیتی و بهبود کیفیت گفتاری در بیماران مبتلا به نارسایی و لوفارنژیال با درجه خفیف تا متوسط شد. در بعضی از مطالعات انجام‌شده برای ترمیم دیواره خلفی فارنژیال لبه neo-Passavant را ایجاد کردند.^{۲۴} در مطالعه دیگری از تزریق چربی در نواحی ولوم و دیواره‌های طرفی و خلفی لترال برای بهبود نارسایی ولوم فارنژیال و از تزریق بیشتر چربی در نواحی وسیع تر برای افزایش بقای چربی و به حداقل رساندن خطر نکروز بافت استفاده کردند.^{۱۱}

در حالی که ما در مطالعه خود ترکیب چربی و PRP را در دیواره خلفی حلق در محاذاة ولوم (کام نرم) روی فاشیای پره‌ورتبرال تزریق کردیم و از افزودن PRP برای افزایش میزان بقای چربی استفاده کردیم که در دیگر مطالعات تایید شده است. در برخی مطالعات مزایای استفاده از ترکیب چربی و PRP را نشان داده‌اند.^{۲۵} پلاکت مخلوطی از پروتئین اتلولوگ می‌باشد^{۱۲} و استفاده از آن آسان و ایمن می‌باشد. پلاکت فاقد سطح آنتی‌ژن مسئول برای ایجاد واکنش‌های آلرژیک می‌باشد و نمی‌تواند با آلدگی همراه باشد.^{۱۴} پلاکت شامل مواد فعالی است که در مکانیسم ترمیم بافت درگیر می‌شود که می‌توان به کموتاکسی، پرولیفراسیون سلولی و تمایز سلولی، آنزیوژن، رسوب ماتریکس داخل سلولی، فعالیت آنتی‌میکروبیال و بازسازی اشاره نمود.

پس از فعال شدن پلاکت برخی از فاکتورهای رشد توسط پلاکت آزاد می‌شود که امروزه به صورت فاکتور رشد مشتق از پلاکت، فاکتور رشد آلفا و بتا با عملکرد جدید، فاکتور رشد اپیدرمال، فیبروبلاست، کراتینوسیت، فاکتور رشد انسولین، فاکتور رشد اپیدرمال مشتق از پلاکت، ایترلوكین-۸، فاکتور نکروز تومور آلفا، فاکتور رشد بافت همبند و فاکتور محرک کلولی ماکروفائز گرانولوسیت مشخص شده‌اند.^{۱۶} فاکتورهای رشد پلاکت در واکنش‌های بین سلول-ماتریکس و سلول-سلول درگیر می‌شوند که موجب افزایش پرولیفراسیون مزانشیمال و دیگر سلول‌های بنیادی در ناحیه ترمیم می‌شوند.^{۱۸}

با توجه به مکانیسم پلاکت فعال شده احتمالاً افزودن چربی حاوی سلول‌های بنیادی مزانشیمال موجب تشکیل بافت گرانولاسیون در اوایل فاز ترمیم می‌شود. چربی در ناحیه تزریق تصویر سه‌بعدی ایجاد می‌کند و PRP موجب افزایش نگهداری چربی پس از درمان و مشاهده

و چربی را در نظر داشته باشند. همچنین پیشنهاد می‌گردد برای توصیه قطعی بالینی این مطالعه با حجم نمونه بیشتری و با مدت زمان پی‌گیری طولانی‌تری انجام شود.

سپاسکزرا: این مقاله حاصل پایان‌نامه تحت عنوان "بررسی نتایج درمانی تزریق تواام Platelet-rich plasma و چربی در بیماران مبتلا به نارسایی و لوفارنژیال مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی در سال ۱۳۹۱" در مقطع دکترای فوق تخصصی در سال ۱۳۹۲ و کد اخلاق پژوهشی ۱۳۰/۳۹۶/۹۲ D/MI باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.

با توجه به یافته‌های به دست آمده در مطالعه حاضر، تزریق ترکیب PRP یک میلی‌لیتر و چربی چهار میلی‌لیتر در دیواره خلفی حلق در محاذات ولوم (کام نرم) روی فاشیای پره‌ورتبرال در درمان نارسایی لوفارنژیال موثر می‌باشد.

تزریق این ترکیب آسان بوده و با حداقل میزان تهاجم همراه است و می‌تواند جایگزین پروسیجرهای مژاژور مانند لوفارنژیوپلاستی در درمان نارسایی و لوفارنژیال خفیف تا متوسط باشد. لذا به متخصصین جراحی پلاستیک و ترمیمی پیشنهاد می‌گردد که در نارسایی و لوفارنژیال ناشی از ترمیم شکاف کام تزریق تواام PRP

References

1. Lesavoy MA, Borud LJ, Thorson T, Riegelhuth ME, Berkowitz CD. Upper airway obstruction after pharyngeal flap surgery. *Ann Plast Surg* 1996;36(1):26-30.
2. Dejonckere PH, van Wijngaarden HA. Retropharyngeal autologous fat transplantation for congenital short palate: a nasometric assessment of functional results. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 2001;110(2):168-72.
3. Leuchter I, Schweizer V, Hohlfeld J, Pasche P. Treatment of velopharyngeal insufficiency by autologous fat injection. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 2010;267(6):977-83.
4. Rozman P, Bolta Z. Use of platelet growth factors in treating wounds and soft-tissue injuries. *Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat* 2007;16(4):156-65.
5. Krasna M, Domanović D, Tomsic A, Svajger U, Jeras M. Platelet gel stimulates proliferation of human dermal fibroblasts in vitro. *Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat* 2007;16(3):105-10.
6. Cantarella G, Mazzola RF, Mantovani M, Baracca G, Pignataro L. Treatment of velopharyngeal insufficiency by pharyngeal and velar fat injections. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2011;145(3):401-3.
7. Coleman SR. Facial recontouring with lipostructure. *Clin Plast Surg* 1997;24(2):347-67.
8. Riski JE. Articulation skills and oral-nasal resonance in children with pharyngeal flaps. *Cleft Palate J* 1979;16(4):421-8.
9. Van Demark DR. Predictability of velopharyngeal competency. *Cleft Palate J* 1979;16:429-35.
10. Skolnick ML. Velopharyngeal function in cleft palate. *Clin Plast Surg* 1975;2(2):285-97.
11. Cantarella G, Mazzola RF, Mantovani M, Baracca G, Pignataro L. Treatment of velopharyngeal insufficiency by pharyngeal and velar fat injections. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2011;145(3):401-3.
12. Anitua E, Andia I, Ardanza B, Nurden P, Nurden AT. Autologous platelets as a source of proteins for healing and tissue regeneration. *Thromb Haemost* 2004;91(1):4-15.
13. Anitua E, Sánchez M, Nurden AT, Nurden P, Orive G, Andia I. New insights into and novel applications for platelet-rich fibrin therapies. *Trends Biotechnol* 2006;24(5):227-34.
14. Azzena B, Mazzoleni F, Abatangelo G, Zavan B, Vindigni V. Autologous platelet-rich plasma as an adipocyte in vivo delivery system: case report. *Aesthetic Plast Surg* 2008;32(1):155-8.
15. Anitua E, Sánchez M, Orive G, Andia I. The potential impact of the preparation rich in growth factors (PRGF) in different medical fields. *Biomaterials* 2007;28(31):4551-60.
16. Fréchette JP, Martineau I, Gagnon G. Platelet-rich plasmas: growth factor content and roles in wound healing. *J Dent Res* 2005;84(5):434-9.
17. Everts PA, Knape JT, Weibrich G, Schönberger JP, Hoffmann J, Overdevest EP, et al. Platelet-rich plasma and platelet gel: a review. *J Extra Corpor Technol* 2006;38(2):174-87.
18. Brown RL, Breeden MP, Greenhalgh DG. PDGF and TGF-alpha act synergistically to improve wound healing in the genetically diabetic mouse. *J Surg Res* 1994;56(6):562-70.
19. Rigotti G, Marchi A, Galiè M, Baroni G, Benati D, Krampera M, et al. Clinical treatment of radiotherapy tissue damage by lipoaspirate transplant: a healing process mediated by adipose-derived adult stem cells. *Plast Reconstr Surg* 2007;119(5):1409-22.
20. Coleman SR. Long-term survival of fat transplants: controlled demonstrations. *Aesthetic Plast Surg* 1995;19(5):421-5.
21. Coleman SR. Structural fat grafts: the ideal filler? *Clin Plast Surg* 2001;28(1):111-9.
22. Rehman J, Traktaev D, Li J, Merfeld-Clauss S, Temm-Grove CJ, Bovenkerk JE, et al. Secretion of angiogenic and antiapoptotic factors by human adipose stromal cells. *Circulation* 2004;109(10):1292-8.
23. Cao Y, Sun Z, Liao L, Meng Y, Han Q, Zhao RC. Human adipose tissue-derived stem cells differentiate into endothelial cells in vitro and improve postnatal neovascularization in vivo. *Biochem Biophys Res Commun* 2005;332(2):370-9.

Treatment results of combined platelet-rich plasma and fat injection in patients with velopharyngeal insufficiency

Hamid Reza Fathi M.D.*
Farid Fereyduni M.D.

Department of Plastic and
Reconstructive Surgeon, Imam
Khomeini Hospital, Tehran
University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.

Abstract

Received: May 27, 2013 Accepted: June 19, 2013

Background: Velopharyngeal insufficiency causes hypernasal vocal quality and can also result in audible nasal air emission and difficulty in producing pressure consonants. The resulting speech is often socially unacceptable and can be difficult to understand. Platelet-rich plasma is an autologous derivative of whole blood. Today, the importance of clinical use of Platelet-rich plasma in the plastic surgery is considered. This study was designed to evaluate the effectiveness of combined Platelet-rich plasma and fat injection in the treatment of velopharyngeal insufficiency.

Methods: In this prospective clinical trial study, of 15 patients including 9 males and 6 females and aged 15-20 years with mild/ moderate velopharyngeal insufficiency who were injected with 5 mL of combined Platelet-rich plasma (1 mL) and fat (4 mL) in the front volume in the posterior pharyngeal wall in the pre-vertebral fascia under sedation. Speech samples were recorded by nasoendoscopy before the injection, and at 6 weeks and 6 months after the injection. Assessment of pathologic speech was done by speech therapist.

Results: Velar displacement showed significantly increased at 6 weeks after the injection ($P=0.049$). Velopharyngeal gap disappeared in 60% of patients at 6 weeks after the injection ($P=0.019$). Lateral pharyngeal wall movement showed significantly increased in 73.3% of the patients at 6 months after the injection ($P=0.04$). After the treatment, aerodynamic assessment showed significantly decreased in nasal air escape during phonation and repeat the words ($P<0.05$). Assessment speech therapist showed significantly improve quality of phonation in these patients ($P<0.05$).

Conclusion: It seems that, combined Platelet-rich plasma and fat injection lead to improve voice resonance and reduce nasal air escape in all treated cases. It can be a promising alternative to major procedures, such as velopharyngoplasties, for the treatment of mild/ moderate velopharyngeal insufficiency.

Keywords: improvement, phonation, platelet-rich plasma fat, velopharyngeal insufficiency.

* Corresponding author: Gharib St., Keshavarz Blvd., Tehran, Iran.
Tel: +98-21-66438153
E-mail: hamifathi@yahoo.com