

بررسی فراوانی و عوامل خطر کلیه پیوندی با عملکرد کند در پیوند کلیه از دهنده زنده

چکیده

زمینه و هدف: در حالی که کیفیت عالی ارگان و وضعیت ایده‌آل پیوند بسیاری از عواملی که کارکرد زودرس کلیه را چهار اختلال می‌کند، کاهش داده است، اما کلیه پیوندی با عملکرد کند Slow Graft Function (SGF) هنوز بعد از پیوند کلیه از اهدانندگان زنده بوجود می‌آید. هدف از این مطالعه بررسی شیوع SGF و تعیین عوامل خطر آن در پیوند کلیه از دهنده زنده است. **روش بررسی:** این مطالعه آینده‌نگر در ۳۴۰ پیوند کلیه از دهنده زنده به مدت دو سال (۱۳۸۴) و ۱۳۸۳) در بیمارستان بقیه‌اله تهران انجام پذیرفت. گیرندگان پیوند به دو گروه کلیه پیوندی با عملکرد فوری Immediate Graft Function (IGF) با کراتینین کمتر از mg/dl^3 در روز پنجم پس از پیوند و کلیه پیوندی با عملکرد کند (SGF) با کراتینین بیشتر یا مساوی mg/dl^3 در روز پنجم پس از پیوند، بدون نیاز به دیالیز تقسیم شدن. آنالیز متغیرها در هر یک از گروه‌های SGF و IGF انجام شد و توسط تست‌های ضریب-دوکا، من ویتنی و T با هم مقایسه شدند. **یافته‌ها:** انسیدانس SGF 22 kg/m^2 (۲۲ نفر) و IGF 22 kg/m^2 (۳۱۸ نفر) بود. میانگین BMI گیرندگان در 22 kg/m^2 و در GF، 25 kg/m^2 بود. ($p=0.001$ OR=۱/۲۴ CI=۱/۰۹۷-۱/۴۰۱). فراوانی نسبی SGF در دریافت‌کنندگان پیوند از مؤنث بیشتر از دریافت‌کنندگان از مذکور بود ($p=0.044$ OR=۲/۸۶۲ CI=۰/۹۵-۰/۰۲۸-۷/۹۷۱). فراوانی نسبی کلیه پیوندی با عملکرد کند در گیرندگان Panel Reactive Antibody (PRA) مثبت بیشتر از منفی‌ها بود ($p=0.049$ OR=۷/۸۴۹). تنتیجه‌گیری: مطالعه ما نشان داد PRA منفی و BMI پائین‌تر گیرنده اثر حفاظتی در برای تأخیر عملکرد کلیه پیوندی دارند. گیرندگان با دهنده مؤنث شانس بالاتری برای ابتلاء به SGF دارند. ما توصیه می‌کنیم گیرندگان BMI خود را قبل از پیوند کاهش دهند، دهنده مذکور بر دهنده مؤنث ارجح است.

کلمات کلیدی: بقای پیوند، کلیه پیوندی با عملکرد کند، کلیه پیوندی با عملکرد فوری، رد حاد پیوند، پیوند کلیه از دهنده زنده

فرخ لقا احمدی

اشرف علی مددی*

محبوب لسان پزشکی

گروه داخلی، پیوند، کلیه

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده مسئول: تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان

امام خمینی

تلفن: ۸۸۳۹۴۹۵

email: rzziman@yahoo.com

مقدمه

پس از حملات رد پیوند حاد بهبود می‌یابند، کاهشی معادل ۱۰٪ در بقای یک ساله در مقایسه با کلیه‌هایی که هرگز حملات رد را تجربه نکرده‌اند، دارند.^۱ با افزایش خطر رد پیوند حاد، استفاده از پروتکل‌های سرکوبگر یمنی تغییر یافته برای برقراری مجدد عملکرد کلیه ضرورت می‌یابد که آنها نیز به نوبه خود با افزایش ریسک عفونت، عوارض سوء افزایش دوز مهارکننده کلسی نورین روی کلیه پیوندی، بقای طولانی مدت آلوگرافت را به مخاطره می‌افکنند.^۲ با توجه به موارد ذکر شده فراهم‌آوری شرایط مساعد برای هر چه بهتر کردن فونکسیون آلوگرافت پس از پیوند کلیه پیوندی با عملکرد فوری (IGF) Immediate graft function (IGF) نقش اساسی در طول عمر و

پیوند کلیه (Renal transplant)، زندگی مطلوب‌تر و کاهش خطر مرگ و میر را برای بیماران در مرحله انتهایی نارسائی کلیه به ارمغان می‌آورد. نقطه ضعف مهم پیوند کلیه، رد پیوند است و رد پیوند حاد مهمترین پیشگویی کننده رد پیوند مزمن است.^۳ کلیه پیوندی که از ابتدا کارکرد خوبی داشته باشد، پیش‌آگهی طولانی مدت خوبی خواهد داشت.^۴ لکن تأخیر در شروع کار کلیه پیوندی شامل عملکرد کند و یا تأخیری گرافت (SGF) Delay graft and Slow graft function، با افزایش خطر رد پیوند حاد و متعاقب آن کاهش بقای کوتاه‌مدت و دراز مدت گرافت تتوأم خواهد بود.^{۵-۶} کلیه‌هایی که

با روش آنالیز Logistic regression مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند و اثر مستقل آنها در بروز SGF تأیید یا رد شد. در این مطالعه آزمایشات انجام شده بر اساس نیاز بیماران توسط پزشک معالج درخواست شده است و هزینه اضافی جهت انجام مطالعه بر بیمار تحمل نشده است.

یافته‌ها

در این مطالعه ۳۵۴ LDKT بررسی شدند. ۱۴ نفر به علت نداشتن شرایط IGF یا SGF از مطالعه خارج شدند. مطالعه آماری در مورد ۳۴۰ نفر انجام شد. (۸۹/۸٪) ۳۱۸ نفر در گروه IGF و (۶۲/٪) ۲۲ نفر در گروه SGF قرار گرفتند. فراوانی SGF در بیمارانی که دهنده مؤنث داشته‌اند نسبت به کسانی که دهنده مذکور داشته‌اند، بیشتر بود. (OR=۳/۰ ۶۷ CI: ۹۵/۱-۸۱/۷ p=۰/۰۱۶) فراوانی SGF در بیمارانی که PRA مثبت داشته‌اند، نسبت به کسانی که منفی PRA داشته‌اند، بیشتر بود. (OR=۴/۸۶ ۳ CI: ۹۵/۱-۲۳۵/۱۹ p=۰/۰۱۳) اختلافات موجود در فراوانی IGF و SGF از نظر روش دیالیز قبل از پیوند، بیماری زمینه‌ای، دفعات پیوند، مصرف کلسیم بلوکر قبل از SGF پیوند و جنس گیرنده فاقد اهمیت از نظر آماری بود. در گروه IGF سن متوسط گیرنده‌گان (۴۵±۹/۰۷ سال) بیشتر از گروه SGF (۳۷±۱۳/۰۵ سال) بود، که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود. (Mean difference: ۷/۲۷ CI: ۹۵/۲-۱۱/۵ p=۰/۰۰۲) میانگین BMI گیرنده‌گان در گروه IGF (۲۲/۱±۳/۹ kg/m²) کمتر از گروه SGF (۲۵/۳±۳/۸ kg/m²) بود، این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار p<۰/۰۰۱ است. (Mean difference: ۳/۲ CI: ۹۵/۱-۴/۵ p=۰/۰۰۱) میانگین BMI دهنده‌گان در گروه SGF (۲۵/۰۷±۴/۱ kg/m²) بیشتر از گروه IGF (۲۳/۲±۳/۶ kg/m²) و از نظر آماری معنی‌دار بود. (Mean difference: ۱/۷ CI: ۹۵/۰-۱۸/۳ p=۰/۰۲۹) موجود در فراوانی IGF و SGF از نظر متوسط سطح کلسیم، فسفر، PTH، مدت زمان دیالیز و سن دهنده‌گان، از نظر آماری معنی‌دار نبود. کلیه متغیرهایی که اختلاف‌شان در دو گروه SGF و IGF در آنالیز Univariate model معنی‌دار بود، جهت حذف اثر متغیرهای logistic regression مخدوش‌کننده، در آنالیز Multivariate analysis با روش

وارد شدند. نتیجه آنالیز چند متغیره در جدول ۱ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود از عوامل خطر که با روش یک متغیره محاسبه شده بود، پس از حذف اثر متغیره


عملکرد پیوند خواهد داشت اکثر مطالعات موجود در مورد اثر IGF و Graft Function (Poor EGF) روی بقاء کوتاه و طولانی مدت شامل Poor Early SGF و DGF بیان می‌باشد و همچنین اکثر مطالعات در زمینه اهدای پیوند از جسد است.^۵ در مورد عوامل خطر (DGF, SGF) خصوصاً در شرایط Living Donor Kidney Transplantation اهداء پیوند از دهنده زنده (LDKT) کمتر کار شده است. در این مطالعه نظر به اهمیت IGF در بقاء و تداوم کارکرد ارگان ارزشمند کلیه، عوامل خطر SGF براساس مشخصات دهنده و گیرنده، آزمایشات بیوشیمیایی گیرنده قبل از عمل، سابقه و نحوه درمان نارسایی کلیه، سابقه و نوع بیماری کلیه منجر شده به ESRD، وضعیت ایمونولوژیک گیرنده، شرح حال مصرف یا عدم مصرف کلسیم بلوکر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی SGF و عوامل خطر مربوط به آن در بیماران پیوند کلیه از دهنده زنده می‌باشد.

روش بررسی


در این مطالعه آینده‌نگر مقطعی- توصیفی، بیمارانی که جهت دریافت پیوند کلیه در بخش پیوند بیمارستان بقیه‌الله در طی سالهای ۸۳ و ۸۴ بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. بیمارانی که دارای خصوصیات IGF و SGF نبودند از مطالعه خارج شدند. تشخیص IGF براساس کراتین نین روز پنجم کمتر از ۳ mg/dl و SGF براساس کراتین نین روز پنجم بیشتر و یا معادل ۳ mg/dl بدون نیاز به دیالیز در هفته اول پس از پیوند بود. برای تمامی پیوند‌ها اطلاعات شامل سن و جنس دهنده و گیرنده، BMI دهنده و گیرنده، کلسیم، فسفر، PTH قبل از عمل، دفعات پیوند، نوع و زمان دیالیز، مصرف کلسیم بلوکر، PRA، بیماری زمینه‌ای منجر به نارسایی کلیه در فرد گیرنده اخذ شد. پس از تعیین فراوانی مطلق گروههای IGF و SGF فراوانی گروههای SGF و IGF براساس هر یک از متغیرهای کمی و کیفی تعیین شد. برای مقایسه تفاوت‌های مشاهده شده در دو گروه، NPar Mann- Whitney به تناسب و جهت متغیرهای کمی از آزمون Student's- t test استفاده شد. پس از آنالیز آماری با مدل یک متغیره، متغیرهای کمی و کیفی که از نظر آماری اختلاف آنها در دو گروه معنی‌دار شده بود، جهت حذف متغیرهای کیفی از آزمون ضریب دوکا- و



نمودار-۲: مقایسه فراوانی SGF در دو گروه با دهنده مذکور و مؤنث



نمودار-۱: مقایسه فراوانی SGF در دو گروه پاپل مثبت و منفی



نمودار-۳: مقایسه فراوانی SGF و IGF بر اساس BMI

جدول-۱: ریسک فاکتورهای SGF در مقابل IGF در LDKT آنالیز چند متغیره

ریسک فاکتور	OR	CI/95	p
جنس دهنده زن	۲/۸۶۲	۱/۰۲۸ - ۷/۹۷۱	۰/۰۴۳
سن گیرنده	۰/۹۷۸	۰/۰۸۴ - ۱/۰۸۳	۰/۰۶۷
BMI گیرنده kg/m ²	۱/۲۴	۱/۰۹۷ - ۱/۴۰۱	۰/۰۰۱
BMI دهنده kg/m ²	۱/۱۱۶	۰/۰۹۹۴ - ۱/۰۲۵۳	۰/۰۶۴
PRA	۷/۸۴۹	۱/۰۷۵۵ - ۳۵/۰۲۸۰	۰/۰۰۷

مخدوش‌کننده جنس دهنده زن، BMI گیرنده بالاتر و PRA مثبت اثر خود را در پیشبرد SGF حفظ کردند.

بحث

اختلاف BMI گیرنده در دو گروه Poor EGF و Poor IGF از نظر آماری معنی دار است ($p=0.17$). اما پس از آنالیز چند متغیره نتوانستت Poor BMI گیرنده را به عنوان یک عامل مستقل در پیشبرد Poor EGF اثبات کند ($p=0.24$). او ارتباطی بین اثر BMI دهنده و بروز EGF نیافت. همانطور که در جدول ۱ نشان داده شده است BMI بالاتر گیرنده در مطالعه ما حتی پس از حذف متغیرهای مخدوش‌کننده اثر مستقل خود را در پیشبرد SGF حفظ کرده است ($p=0.001$). و همچنین BMI بالاتر دهنده تمایل به افزایش خطر SGF دارد ($p=0.064$). BMI بالا علاوه بر افزایش خطر مرگ و میر، خطر ابتلاء به بیماریهای مزمونی چون فشار خون، بیماریهای قلبی، سرطان کولون، سکته و اختلال عملکرد کلیه را افزایش می‌دهد.^۷ اثر BMI بر روی عملکرد کلیه به علت همراه بودن آن با مواردی چون فشار خون، دیابت و سندرم‌های متابولیک و اثر مستقل از عوامل فوق با خطر

شیوع SGF در مطالعه ما $6/2\%$ و در مطالعه مشابه LDKT برنان $10/7\%$ می‌باشد.^۵ این مقایسه نشان می‌دهد که نتایج پیوند کلیه در ایران قابل مقایسه با مراکز پیشرفته جهان می‌باشد. تاکنون مطالعات محدودی درباره عوامل خطر Poor EGF (اعم از SGF) خصوصاً در مورد LDKT انجام شده است. بیشتر مطالعات در مورد پیوند از جسد، آن هم از دیدگاه اثر Poor EGF روی بقای پیوند و گیرنده انجام پذیرفته است. نتیجه مطالعات اکثراً دلالت بر آن دارد که عملکرد عالی آلوگرافت پس از پیوند، متضمن بقای طولانی مدت آلوگرافت است.^{۲-۵} مطالعاتی که در مورد عوامل خطر Poor EGF انجام شده است، نتایج متفاوت و گاه مغایر با هم دارند. حتی شیوع آن در مراکز مختلف و بسته به نوع پیوند جسد یا زنده متفاوت است. در مطالعه برنان، که مشابه مطالعه ما از نظر LDKT است،^۵ اثر BMI دهنده و گیرنده در بروز Poor EGF بررسی شده است. او مشاهده کرد که

در مطالعه ما و برنان، پس از حذف عوامل مخدوش‌کننده، سن گیرندگان به عنوان عامل خطر SGF محسوب نشد.^۵ لکن در مطالعات دیگری سن گیرنده بیشتر از ۶۰ سال به عنوان عامل خطر شناخته شده است.^۹ علل احتمالی اختلال عملکرد کلیه از دهنگان مسن تر شامل اختلال عملکرد کلیه به علت پیری، آسیب‌پذیرتر بودن کلیه پیرتر در مقابله صدمه ناشی از ایسکمی، رد پیوند و سیکلوسپورین می‌باشد.^{۱۱} از نظر اثر بیماریهای سیستمیک نسبت به بیماریهای محدود در خود کلیه، از بین مطالعاتی که ما مرور کردیم، فقط برنان به اثر بیماری دیابت در بروز Poor EGF پرداخت.^۵ او نشان داد که حتی پس از حذف عوامل مخدوش‌کننده با روش آنالیز چند متغیره، دیابت اثر خود را به عنوان عامل مؤثر در پدید آوردن Poor EGF حفظ می‌کند (p=۰/۰۲۱). بدین معنی که دیابت جدا از اثرات خود روی آترواسکلروز عروق و طولانی کردن زمان آناستوموز و BMI بالاتر افراد دیابتی، به طور مستقل، احتمالاً به علت اثرات فیزیولوژیک، روی بروز Poor EGF مؤثر است. در مطالعه ما هیچ یک اثر معنی‌داری سیستمیک بررسی شده (فشار خون، دیابت، لوپوس) اثراً مستقل از دیابت PTH یک توکسین یورمیک است و کلسیم سیتوزولی را در سلولهای پروکسیمال کلیه افزایش می‌دهد و اینکه هیپرکلسیمی و نفروکلسینوز شیمیابی سبب کاهش GFR از طریق انقباض عروق و کاهش حجم در اثر ناتریورز می‌شود و این که کلسیم با مکانیزم‌های متعدد تمامیت سلول توبول کلیه را به مخاطره می‌افکند، در بعضی مطالعات به ارتباط سطح کلسیم و فسفر و PTH گیرندگان پیوند و بروز Poor EGF پرداخته شده است.^{۸-۹} در مطالعه Henk Boom ارتباط معنی‌داری بین سطح کلسیم سرم و فراوانی EGF Poor EGF (p<۰/۰۰۱) و در مطالعه Torregrosa ارتباط معنی‌داری بین افزایش سطح PTH و بروز Poor EGF (p<۰/۰۰۱) مشاهده شده است. براساس این یافته، آنها پیشنهاد کردند که برای کاهش موارد Poor EGF از بلوک کنندگان کانال کلسیم (CCBs) Calcium Channel Blocker قبل و پس از پیوند استفاده شود. آنها در مطالعه خود توانستند ارتباط معنی‌داری بین مصرف CCB و کاهش بروز Poor EGF نشان دهنند. ما نیز در مطالعه خود به بررسی تأثیر سطح کلسیم، فسفر و PTH و دریافت CCB قبل از پیوند در بروز SGF پرداختیم، اما اختلاف سطح هیچ یک از عوامل

پیشرفت به سوی CRF می‌باشد.^۷ به علاوه گیرنده با BMI بالاتر، نیازهای فیزیولوژیک بیشتری به کلیه پیوندی تحمیل می‌کند و پیوند توده ناکافی نفرون نسبت به نیازهای فیزیولوژیک گیرنده، سبب کاهش طول عمر پیوند می‌شود. ظاهرآً این اثر از همان بدو کاشتن کلیه پیوندی آغاز می‌شود. اکثر مطالعاتی که روی اثر جنس دهنده و گیرنده در بروز Poor EGF صورت گرفته است، نتوانسته است وجود ارتباطی بین آنها را نشان دهد.^۵ در مطالعه Torregrosa اختلاف فراوانی ATN پس از پیوند در گیرنده زن اهمیت آماری داشته است (p<۰/۰۱).^۹ در مطالعه ما جنس گیرنده پیوند نقشی در بروز SGF نداشت، اما جنس دهنده حتی پس از حذف عوامل مخدوش‌کننده توسط آنالیز چند متغیره، اثر خود را به عنوان عامل مستقل در پدید آوردن SGF حفظ کرد. در دهنگان زن نسبت بیشتری از بیماران به SGF مبتلا شدند. (p=۰/۰۴۴ OR=۲/۸۶۲ CI/۹۵ ۱/۰۲۸-۷/۹۷۱)

به نظر می‌سد تحمیل نیازهای فیزیولوژیک بیشتر به کلیه پیوندی، در گیرنده زن به گیرنده مرد، تأثیر منفی در عملکرد اولیه کلیه داشته باشد.^۱ افزایش حساسیت به آنتی‌نهای لنفوسمیت که توسط شرایط Panel Reactive Antibody (PRA) اندازه‌گیری می‌شود، به طور فزاینده‌ای خطر از دست دادن پیوند را افزایش می‌دهد. در مطالعه Humar اثر ۷۵٪ PRA در بروز DGF (p<۰/۰۰۱) و (p=۰/۲۷) نشان داده شده است.^۳ در مطالعه ما نیز حتی پس از حذف عوامل مخدوش‌کننده، PRA مثبت، اثر خود را به عنوان عامل مستقل در بروز SGF حفظ کرد. (p=۰/۰۰۷ OR=۷/۸۴۹ CI/۹۵ ۱/۷۵۵-۳۵/۲۸۰)

ما اثر سن گیرنده و دهنده را در بروز SGF بررسی کردیم. متوسط سن دهنگان در گروه IGF و SGF بسیار مشابه بود. در واقع گروهی از افراد جوان به طور داوطلبانه و یا به دلیل برطرف کردن مشکلات اقتصادی خویش، اقدام به فروش کلیه کرده‌اند و علی‌رغم این که بالا بودن سن دهنده از عواملی است که می‌تواند در اختلال عملکرد کلیه پیوندی مؤثر باشد،^۹ به علت جوان بودن گروه دهنگان در مطالعه ما، این ارتباط در مطالعه ما یافت نشد. برنان نیز پس از آنالیز چند متغیره ارتباطی بین سن دهنده و بروز Poor EGF نیافت. لکن ناموویک و همکاران مشاهده کردند که با افزایش سن دهنگان زنده به بیش از ۶۰ سال شیوع SGF و خطر رد پیوند مزمن، افزایش و بقای آلوگرافت و گیرنده کاهش می‌یابد.^{۱۰} هر چند

دربافت CCB حوالی پیوند، در بروز Poor EGF شود. سپاسگزاری: از جناب آقای دکتر علی پاشا میمی، متخصص پزشکی اجتماعی برای راهنمائی سودمندانه در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌ها، سرکار خانم محمودی، کارشناس آمار آنالیز آماری داده‌ها، جناب آقای علیرضا اشرف، سرپرستار محترم بخش پیوند کلیه بیمارستان بقیه الله‌الاعظم (عج) جهت همکاری صمیمانه و جمع‌آوری اطلاعات بیماران و آقای دکتر کلانتر، ریاست محترم آزمایشگاه قلهک جهت همکاری در جمع‌آوری یافته‌های آزمایشگاهی بیماران تشکر و قدرانی می‌شود.

فوق ارتباط معنی‌داری با فراوانی رخداد SGF نداشت. برنان در مطالعه‌اش که روی LDKT بوده است، اثر کلسیم و فسفر و PTH و مصرف CCB را روی فراوانی Poor EGF بررسی نکرده است.^۵ با توجه به یافته‌های این مطالعه که بالا بودن BMI گیرنده، جنسیت مؤنث دهنده، مثبت بودن PRA در شیوع SGF مؤثر است، می‌توان با تعديل کردن این عوامل شیوع SGF و Poor EGF را کاست و نهایتاً به طول عمر پیوند افزود. پیشنهاد می‌شود در مطالعات مورد-شاهدی آتی علاوه بر جستجوی صحت نتایج این مطالعه، بررسی بیشتری روی اثرات کلسیم و فسفر سرم و سطح PTH قبل از عمل و تأثیر

References

- Vella J. Risk factors for graft failure in kidney transplantation. 2006; 14(2): Available from: [<http://patients.uptodate.com/topic.asp?file=renltran/11450>].
- Humar A, Johnson EM, Payne WD, Wrenshall L, Sutherland DE, Najarian JS, et al. Effect of initial slow graft function on renal allograft rejection and survival. *Clin Transplant* 1997; 11: 623-7.
- Humar A, Ramcharan T, Kandaswamy R, Gillingham K, Payne WD, Matas AJ. Risk factors for slow graft function after kidney transplants: a multivariate analysis. *Clin Transplant* 2002; 16: 425-9.
- Tejani AH, Sullivan EK, Alexander SR, Fine RN, Harmon WE, Kohaut EC. Predictive factors for delayed graft function (DGF) and its impact on renal graft survival in children: a report of the North American Pediatric Renal Transplant Cooperative Study (NAPRTCS). *Pediatr Transplant* 1999; 3: 293-300.
- Brennan TV, Freise CE, Fuller TF, Bostrom A, Tomlanovich SJ, Feng S. Early graft function after living donor kidney transplantation predicts rejection but not outcomes. *Am J Transplant* 2004; 4: 971-9.
- Vella J, Koch MJ, Brennan DC. Acute renal allograft rejection: Diagnosis. 2006; 14(2): Available from: [<http://patients.uptodate.com/topic.asp?file=renltran/6758>].
- Bray GA. Health hazards associated with obesity in adults. 2006; 14(2): Available from: [<http://patients.uptodate.com/topic.asp?file=obesity/2127>].
- Boom H, Mallat MJ, deFijter JW, Paul LC, Bruijn JA, van Es LA. Calcium levels as a risk factor for delayed graft function. *Transplantation* 2004; 77: 868-73.
- Torregrosa JV, Campistol JM, Fenollosa B, Montesinos M, Romar A, Martínez de Osaba MJ. Role of secondary hyperparathyroidism in the development of post-transplant acute tubular necrosis. *Nephron* 1996; 73: 67-72.
- Naumovic R, Djukanovic L, Marinkovic J, Lezaic V. Effect of donor age on the outcome of living-related kidney transplantation. *Transpl Int* 2005; 18: 1266-74.
- Ismail N. Renal replacement therapy in the elderly: an old problem with young solutions. *Nephrol Dial Transplant* 1997; 12: 873-6.

Slow graft function and related risk factors in living donor kidney transplantation

Ahmadi F.
Alimadadi A.*
Lesan Pezeshki M.

Department of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences.

Abstract

Background: While excellent organ quality and ideal transplant conditions eliminate many of the known factors that compromise initial graft function (IGF), slow graft function (SGF), still occurs after living donor kidney transplantation (LDKT). The aim of our current study is determination SGF frequency and its risk factors in LDKT.

Methods: In this prospective study, between April 2004 and March 2006, data were collected on 340 LDKT, in Baghiyattallah Hospital, Tehran. Recipients were analyzed in two groups based on initial graft function (IGF): Creatinine <3 mg/dl 5 day after transplantation, SGF: Creatinine \geq 3 mg/dl 5 day after transplantation with out dialysis in the first week. Donors' and recipients' characteristics and recipient lab. data were compared in two groups by chi-square, Mann-whitney & independent samples T-test.

Results: The incidence of SGF was 22 (6.2%) and IGF 318 (89.8%), Recipients' BMI in IGF were 22.1 ± 3.9 and in SGF were 25.3 ± 3.8 ($P=0.001$ 95% CI 1.097-1.401 OR= 1.24). SGF relative frequency in female donors is more than male donors. A multivariate analysis model confirms this significant difference. ($P=0.044$ 95% CI 1.028-7.971 OR= 2.862). SGF relative frequency in PRA (Panel Reactive Antibody) positive recipients are more than negative ones. A multivariate analysis model confirms this significant difference. ($P=0.007$ 95% CI 1.755-35.280 OR= 7.849). Recipients' age and donors' BMI are significant in univariate analysis ($P=0.002$ & $P=0.029$ respectively) but multivariate analysis model dose not confirm those significance. Serum ca & P & PTH levels don't have significant difference between IGF & SGF. Using calcium channels blockers have not a protective effect.

Conclusions: We conclude that negative PRA and lower recipient BMI have protective effects on SGF. Recipients with female donors have higher chance to develop SGF. We recommend recipients reduce their BMI before transplantation. The male donors are preferred to female ones.

Keywords: SGF, IGF, Graft survival, acute rejection, LDKT

*Corresponding author: Imam Khomeini Hospital, Keshavarz Blvd., Tehran.
Tel: +98-21- 88839495
email: rzziman@yahoo.com