

بررسی عوارض ناشی از کاربرد نیتروگلیسیرین در درمان دیسمنوره اولیه: کارآزمایی بالینی دوسوکور

چکیده

مریم مدرس^۱
پروین رهنما^۲

۱- گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲- گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

زمینه و هدف: نیتروگلیسیرین به صورت خوراکی، پماد و برچسب‌های مخصوص به عنوان یک داروی مناسب در بیماران قلبی عروقی مصرف می‌شود. صرف‌نظر از مصرف شکل زیربازانی یا پماد، اثرات عمومی این دارو از طریق اتساع عروقی در بدن اعمال می‌شود. با توجه به علت ایجادکننده دیسمنوره هر روش درمانی که باعث مهار انقباضات قوی رحمی گردد در بهبود آن موثر است و از آنجایی که نیتروگلیسیرین می‌تواند انقباض عضلات رحم را مهار کند لذا داروی مذکور در درمان دیسمنوره اولیه انتخاب شده است و در این پژوهش هدف تعیین عوارض ناشی از کاربرد نیتروگلیسیرین در درمان دیسمنوره اولیه در دختران می‌باشد. روش بررسی: بر این اساس تحقیقی به صورت کارآزمایی بالینی، دوسوکور با استفاده از ابزار پماد نیتروگلیسیرین یک درصد و پلاسبو همراه با نتایج سونوگرافی، متر و خطکش، چک لیست، دستگاه فشارسنج و فرم مشخصات واحدهای پژوهش انجام شد. روش نمونه‌گیری تصادفی و تعداد نمونه ۱۱۲ نفر که ۵۶ نفر گروه تجربه و ۵۶ نفر نیز گروه شاهد را تشکیل می‌داد. از نمونه‌ها در صورت وجود شرایط بودن برای ورود به پژوهش، رضایت کننده اخذ می‌گردید. با شروع قاعدگی درجه درد مربوط به آن و بروز سایر عوارض مربوطه تعیین می‌گردید. سپس پنج میلی‌گرم از پماد یا دارونما (با کد A و B) در قسمتی از پوست ناحیه تحتانی شکم استعمال می‌گردد. سپس ۱۵ دقیقه، یک، دو، چهار ساعت پس از آن، اثرات دارو در هر نوبت و در هر دو گروه مورد بررسی قرار می‌گرفت. **یافته‌ها:** اختلاف معنی‌داری در کاهش شدت درد در ۱۵ دقیقه بعد از درمان وجود نداشت اما شدت درد در گروهی که دارو مصرف کردن در ۳۰ دقیقه بعد کاهش یافت. این مسئله بیانگر آن است که اثر دارو در دقیقه ۳۰ شروع می‌شود در دو ساعت بعد به اوج خود می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد. اما اثر آن تا چهار ساعت باقی می‌ماند. بیشترین عارضه حاصل از مصرف دارو سردرد بود که در گروه تجربه ۴۸/۳ درصد و در گروه شاهد ۱۹/۵ درصد بود. گرگرفنگی، قرمزی پوست ناحیه شکم و سرگیجه همه تفاوت معنی‌داری را از نظر آماری بین دو گروه نشان دادند ($p < 0.05$). **نتیجه‌گیری:** نیتروگلیسیرین می‌تواند در دیسمنوره مقاوم به سایر درمان‌ها موثر باشد.

کلمات کلیدی: دیسمنوره اولیه، درمان، نیتروگلیسیرین

*نویسنده مسئول: تهران، خیابان توحید، خیابان نصرت،
دانشکده پرستاری و مامایی تلفن: ۶۶۹۲۷۱۷۱ email: ma_modars@yahoo.com

مقدمه

اثرات شلکنندگی خود را اعمال می‌نمایند. اتساع ورید سبب تجمع بیشتر خون در وریدها و کاهش بازگشت خون وریدی به قلب می‌شود، نهایتاً سبب کاهش کار قلب و کاهش عرضه اکسیژن به بافت‌های بدن می‌شود با توجه به علت ایجادکننده دیسمنوره هر روش درمانی که باعث مهار انقباضات قوی رحمی گردد در بهبود آن موثر است. در سال‌های اخیر نیتروگلیسیرین به عنوان یک داروی شلکننده قوی رحم مورد توجه و علاقه صاحب‌نظران رشته زنان و مامایی قرار گرفته است. شایع‌ترین عارضه آن سردرد است. اما

نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin) در کبد متabolized شده و به اکسید نیتریک تبدیل می‌شود. اکسید نیتریک خود یک متسع کننده عروقی قوی محسوب می‌شود. اکسید نیتریک باعث انبساط و شلی عضله صاف عروق می‌شود. این عمل از طریق تحریک سیکلیک گوانوزین منوفسفات (CGMP) و تجمع این ماده در داخل سلول رخ می‌دهد که خود منجر به شلی عضله صاف دیواره عروق می‌شود. نیترات‌ها، روی سیستم وریدی تأثیر بیشتری دارند. اما روی عضله صاف شریانی نیز

تا ۷۵ درصد بیماران بسته به میزان دارو بروز می‌نماید.^۹ هدف از این تحقیق تعیین عوارض نیتروگلیسیرین در بیماران با دیسمنوره می‌باشد.

روش بررسی

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکور بود. ابتدا واحدهای پژوهش با استفاده از یک رضایت‌نامه کتبی، فرم مشخصات و انجام سونوگرافی لگن، تعیین شدن نمونه‌گیری به روش آسان و از میان نمونه‌های دردسترس انجام گرفته است و سپس هر یک از نمونه‌ها به طور تصادفی به یکی از دو گروه کترول و تجربه اختصاص یافته است مشخصات واحدهای پژوهش شامل: سن ۱۸-۳۰ سال، مجرد بودن، وجود سونوگرافی طبیعی لگن، BMI برابر ۱۹ تا ۲۷/۳، عدم وجود سابقه بیماری‌های قلبی عروقی، آنمی شدید، جراحی لگن، بیماری‌های کلیوی، کبدی و هیپوتیروئیدی واضح، عدم مصرف بتابلوکرها، بلوك‌کننده‌های کلسیم، نارکوتیک‌ها، آنالژیک‌ها و آنتی‌هیستامین‌ها در عرض ۴۸ ساعت قبل از آزمون بود. جامعه پژوهش کلیه دختران ساکن در خوابگاه‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و نمونه شامل کلیه دختران دارای دیسمنوره اوایله که در صورت رضایت و داشتن مشخصات مذکور در تحقیق شرکت می‌کردند. تعداد نمونه ۱۱۲ نفر بود که ۵۶ نفر گروه کترول و ۵۶ نفر نیز گروه شاهد را تشکیل می‌داد. در گروه مداخله پنج میلی‌گرم از پماد یک درصد نیتروگلیسیرین که در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به سفارش پژوهشگر تهیه گردید، استفاده می‌شد. دارونما نیز کاملاً شبیه به داروی اصلی ولی واژلین بود. قبل از استعمال پماد درد و علائم مربوطه ارزیابی می‌گردید داروی نیتروگلیسیرین در زمان شروع درد به کار برده شده است در این تحقیق دو سانتی‌متر از پماد نیتروگلیسیرین معادل با پنج میلی‌گرم پماد نیتروگلیسیرین یک درصد روی کاغذ مدرج و مخصوص قرار گرفته و در یک سطح یکنواخت سه در سه سانتی‌متر مربعی پخش می‌شد سپس با چسباندن چسب ضد حساسیت به چهار طرف آن کاغذ حاوی پماد برای چهار ساعت روی پوست شکم در زیرناف ثبیت می‌گردید و پس از چهار ساعت از روی پوست برداشته و پوست کاملاً پاک می‌شد. در مورد پلاسیو نیز شبیه مراحل مذکور انجام می‌پذیرفت در پنج نوبت به فواصل ۱۵، ۳۰ دقیقه، یک، دو و چهار ساعت بعد درد دیسمنوره، سردرد، سرگیجه، قرمزی پوست ناحیه،

مواردی از درماتیت پوستی در اثر مصرف برچسب‌های پوستی نیتروگلیسیرین نیز گزارش گردیده است. مواردی نیز از کاهش فشارخون و سنکوپ، به میزان کمتر گزارش شده است. این دارو با الكل و آسپرین و بلوك‌کننده‌های کاتال کلسیم تداخل دارویی دارد. دوز شروع آن ۰/۴-۰/۲ میلی‌گرم در ساعت است و دوز بین ۰/۸-۰/۴ میلی‌گرم در ساعت در طی ۱۰-۱۲ ساعت روزانه برای حداقل یک ماه در آنژین صدری مؤثر می‌باشد.^۱ نیتروگلیسیرین سبب کاهش انقباض عضلات رحمی می‌شود.^۲ بنابراین در سال‌های اخیر از این خاصیت دارو به عنوان یک داروی شلکننده عضلات رحمی در درمان زایمان زودرس نیز استفاده شده است.^۳ این دارو به عنوان یک توکولیتیک مناسب در پیشگیری از زایمان زودرس مورد بررسی قرار گرفته است، Nicholas و Jerry مصرف آن را برای جنین و مادر مفید دانسته‌اند، زیرا در مطالعه آنها در خانمهایی که زایمان زودرس داشته‌اند و در عرض ۴۸ ساعت تا هفت روز پس از زایمان مورد بی‌گیری قرار گرفته‌اند میزان سنترم دیسترس تنفسی و یرقان نوزادی در مقایسه با گروه شاهد کاهش نشان داده است.^۴ این دارو به صورت زیرزبانی یا پماد می‌تواند اثر عمومی خود را از طریق اتساع عروقی در بدن اعمال نماید و استفاده از آن در بیماران قلبی، در درمان حملات حاد آنژین صدری از طریق دیلاتاسیون عروق ژنیتال سبب بهبود نعوظ نیز گردیده است. اما مصرف آن در ناتوانی‌های جنسی مردان به جای ویاگرا توصیه نشده است و مصرف روزانه دو قرص پنج میلی‌گرمی از این دارو باعث عارضه سردد شده است^۵ و به طور مؤثری واژینیسموس ناشی از تنگی واژن را در حین مقارت تسكین داده است.^۶ فواید نیتروگلیسیرین جلدی در درمان دیسمنوره اوایله شامل موارد زیر است: هیچکدام از موارد منع مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) و قرص‌های ضدبارداری خوراکی (OCP) را ندارد برخلاف OCP لازم نیست در تمام طول مدت دوره مصرف شود. نیمه عمر آن کوتاه بوده و در صورت ایجاد عوارض با قطع مصرف سریع از جریان خون دفع می‌گردد. بیمار بر درمان خود کترول دارد زیرا می‌تواند دارو را در موقع لزوم به کار برده و در صورت عدم لزوم و یا بروز عوارض از روی پوست خود بردارد. در هموروئید و شفاق مقعدی، پماد دو درصد نیتروگلیسیرین دو بار روزانه به مدت هشت هفته نیز به طور مؤثر مفید بوده، اما مهمترین محدودیت مصرف آن، سردد ناشی از دارو بوده که در ۱۹

داشته است که آزمون آماری χ^2 اختلاف آماری معنی‌داری را نشان می‌دهد. ($p=0.001$) در دقیقه 30 درصد موارد سردرد متوسط نیز ایجاد گردید که در گروه شاهد اصلاً مشاهده نشد. اما در یک ساعت پس از مصرف دارو در گروه مداخله به طور جزیی کاهش در سردرد ایجاد گردید که این روند تا ساعت چهارم ادامه یافت. (جدول ۲) سایر اثرات دارو شامل سرگیجه که تا 15 دقیقه پس از مصرف دارو وجود نداشت، پس از 30 دقیقه در $21/4$ درصد وجود داشت که همچنان تا یک ساعت بعد از مصرف دارو این اثر وجود داشت و با $p<0.002$ و $p<0.001$ اختلاف معنی‌داری را با گروه شاهد نشان داد. گرگرفتگی به عنوان اثر دیگر نیتروگلیسیرین پس از 30 دقیقه از مصرف دارو در $35/7$ درصد واحدهای پژوهش از گروه مداخله، در برابر $1/8$ درصد از گروه شاهد با $p=0$ در یک ساعت پس از مصرف دارو با $p<0.0003$ اختلاف معنی‌داری در دو گروه داشت. قرمزی خفیف پوست نیز در $10/8$ درصد از گروه مداخله مشاهده گردید که با گروه شاهد از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نبود. تعداد ضربان نبض به طور متوسط 15 ضربه در دقیقه در گروه مداخله افزایش داشت که با $p<0.05$ نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی‌دار بود. اما تاکیکاردنی در هیچیک از دو گروه وجود نداشت.

بحث

اکسید نیتریک به عنوان شلکنده عضله رحمی، در طول حاملگی نقش محافظتی برای رحم دارد. Wetzka و همکارانش در سال ۲۰۰۱ مطالعه‌ای روی عضلات رحمی در سازارین‌های ترم قبل از شروع درد مطالعه‌ای روی عضلات رحمی در زنان قبل از یائسگی انجام دادند. آنها لبیر و پس از هیسترکتومی در زنان قبل از یائسگی انجام دادند. آنها دریافتند که نیتروگلیسیرین باعث کاهش شدیدی در تکرار انتباختات عضلات رحمی هر دو گروه زنان حامله و غیرحمله می‌شود.^۲ این مطالعه نیز نشان داد که کاربرد نیتروگلیسیرین یک درصد با کاهش دیسمنوره نسبت به دارونما ($89/2\%$ در برابر 25% با $p<0.05$) همراه بوده است. اما سردرد شایع‌ترین عارضه جانبه می‌باشد که متعاقب درمان ایجاد می‌شود که درمان را فقط محدود به کسانی می‌نماید که درمان‌های معمول برای آنها کارساز نبوده است. در تحقیق انجام شده توسط Bipozzy و همکارانش (۱۹۹۷) دارو از طریق برچسب جلدی آزادکننده $1/200$ میلی‌گرم در ساعت تجویز شده و به افراد آموختش داده شده بود در شروع درمان یک برچسب جلدی را به پوست پایین

فشارخون و گرگرفتگی در هر نوبت بررسی می‌شد. سرگیجه در این تحقیق عبارت از احساس عدم ثبات همراه با احساس حرکت دورانی در درون سر، این واژه برای بیان احساس منگی و از حال رفتتن و دوران به کار می‌رود. تعریف عملی نیز مطابق تعریف نظری بوده و به دو صورت دارد و ندارد است. تعیین میزان سردرد هم براساس نمره‌ای است که با استفاده از مقیاس چهار رتبه‌ای کلامی به دست می‌آید این مقیاس شامل چهار رتبه بدون درد (0) درد خفیف^۱ درد متوسط^۲ و درد زیاد^۳ می‌باشد. اطلاعات بوسیله آزمون Z آزمون^۴ آزمون دقیق فیشر و آزمون ویلکوکسون و با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری SPSS ویراست ۹ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها

بین دو گروه مورد و شاهد از نظر مشخصات دموگرافیک شامل: سن، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، فاصله بین شروع آزمون و شروع درد با استفاده از آزمون آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید. در دو گروه مورد و شاهد از نظر فاصله زمانی بین شروع دیسمنوره و شروع درمان اختلاف آماری معنی‌داری وجود نداشت. همچنین از نظر شدت درد دیسمنوره قبل از مصرف پماد در دو گروه کترول و تجربه اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. ($p=0.04$) هیچ اختلافی در شدت درد دیسمنوره در 15 دقیقه پس از تأثیر دارو وجود نداشت. اما در گروه مداخله پس از 30 دقیقه تأثیر دارو شروع می‌شود و آزمون آماری χ^2 بیانگر آن است که اختلاف دو گروه از نظر شدت درد دیسمنوره 30 دقیقه و یک، دو و چهار ساعت بعد از مصرف پماد معنی‌دار می‌باشد. ($p=0$) (جدول ۱) با استناد به این یافته‌ها می‌توان گفت که چهار ساعت پس از مصرف پماد شدت درد دیسمنوره در گروه مداخله به طور واضح کمتر از گروه شاهد می‌باشد. تأثیر دارو پس از دو ساعت به اوج خود می‌رسید. سپس تا چهار ساعت بعد به تدریج کاهش می‌یافتد. شدت سردرد تا دقیقه 15 همچنان در هر گروه به میزان $12/5$ درصد خفیف بود که در مقایسه با قبل از شروع آزمون که در گروه مورد مداخله $10/8$ درصد خفیف بود و در گروه شاهد همچنان $12/5$ درصد خفیف بود، آزمون آماری χ^2 تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که 30 دقیقه بعد از استفاده از پماد در گروه مداخله در 43 درصد و در گروه شاهد در 18 درصد سردرد با شدت خفیف وجود

جدول-۱: تعداد دفعات و شدت درد قبل و بعد از معالجه با نیتروگلیسیرین در مقابل پلاسبو

نتایج تست χ^2	درد خیلی شدید				درد شدید				درد متوسط				درد کم				بدون درد				شدت درد				زمان
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
$\chi^2=0/04$	۹	۵	۰۹	۳۳	۳۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قبل از درمان	
بدون ارتباط معنی دار	۹	۵	۰۷	۳۲	۳۴	۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	TNG	
$\chi^2=2/03$	۱۰/۸	۶	۶۰/۷	۳۴	۲۸/۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دقیقه ۱۵	
بدون ارتباط معنی دار	۱۴/۲	۸	۴۳	۲۴	۳۹/۳	۲۲	۳/۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	TNG	
$\chi^2=37/12$	۲۱/۴	۱۲	۶۲/۵	۲۵	۱۴/۳	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دقیقه بعد از درمان	
$p=0$	۳/۵۸	۲	۲۷	۱۵	۳۲	۱۸	۲۵	۱۴	۱۲/۵	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
$\chi^2=73/9$	۱۷/۸	۱۰	۵۰	۲۸	۳۰/۴	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یک ساعت بعد از درمان	
$p=0$	۰	۰	۰/۳	۳	۱۶	۹	۳۵/۶	۲۰	۴۳	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	TNG	
$\chi^2=70/16$	۳/۵	۲	۴۳	۲۴	۴۲/۷	۲۴	۹	۵	۱/۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دو ساعت بعد از درمان	
$p=0$	۰	۰	۱/۸	۱	۹	۵	۵/۲	۳	۸۴	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	TNG	
$\chi^2=44/44$	۰	۰	۱۸	۱۰	۵۷	۳۲	۲۱/۵	۱۲	۳/۵	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چهار ساعت بعد از درمان	
$p=0$	۰	۰	۱/۸	۱	۱۱	۶	۲۳	۱۳	۶۴/۲	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	TNG	

جدول-۲: تعداد دفعات و شدت سردرد درد قبل و بعد از معالجه با نیتروگلیسیرین در مقابل پلاسبو

نتایج آزمون آماری χ^2	درد خیلی شدید				درد شدید				درد متوسط				درد کم				بدون درد				شدت سردرد				زمان
	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد		
بدون ارتباط معنی دار	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲/۵	۷	۸۷/۵	۴۹	پلاسبو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قبل از درمان	
$\chi^2=0/087$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹/۵	۵۰	TNG	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دقیقه ۱۵	
بدون ارتباط معنی دار	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷/۵	۴۹	پلاسبو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درمان	
$\chi^2=0$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷/۵	۴۹	TNG	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
$\chi^2=11/66$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲	۴۶	پلاسبو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دقیقه بعد از درمان	
$p=0$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۵/۳	۳	۴۳	۲۴	۰	۰	۵۱/۷	۲۹	TNG	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درمان	
$\chi^2=10/19$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹/۶	۱۱	۸۰/۴	۴۵	پلاسبو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	یک ساعت بعد از درمان	
$p=0$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۱۰/۷	۶	۳۷/۵	۲۱	۰	۰	۵۱/۸	۲۹	TNG	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درمان	
$\chi^2=8/575$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۹	۸۴	۴۷	پلاسبو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دو ساعت بعد از درمان	
$p=0$	۱۰۰	۵۶	۱/۸	۱	۳/۶	۲	۳۵/۷	۲۰	۰	۰	۵۹	۳۳	TNG	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درمان	
بدون ارتباط معنی دار	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲/۵	۷	۸۷/۵	۴۹	پلاسبو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چهار ساعت بعد از درمان	
$\chi^2=0/624$	۱۰۰	۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۰	۸۲	۴۶	TNG	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	از درمان	

کنترل شده با دارونما به شکل دوسوکور انجام دادند و مقدار نیتروگلیسیرین بکاربرده شده یک چهارم مقدار به کاربرده شده توسط Bipozzy بود. همه واحدهای پژوهش مبتلا به دیسمنوره شدید و مقاوم و منظمی بودند که به طور جدی بر زندگی اجتماعی و حرفاً آنها تاثیر گذاشته بود. متغیرهای مورد بررسی طی چهار روز اول دو قاعده‌گی شامل درد قاعده‌گی، سردرد، خونریزی، ضعف، عدم تمرکز

شکم بچسبانند و بعد از ۲۴ ساعت آن را بردارند و در صورت مقاومت درد پس از چهار ساعت افراد اجازه داشتند دومین برچسب را نیز بچسبانند. نتایج نشان داد که ۹۰ درصد از واحدهای پژوهش به تسکین عالی و رضایت‌بخش رسیدند و ۲۰ درصد از افراد چهار سردرد شدند.¹¹ Pittrof و همکاران (۱۹۹۶) به منظور بررسی اثر نیتروگلیسیرین جلدی بر دیسمنوره اولیه یک مطالعه نیمه تجربی

از ۵۰ میلی گرم نیتروگلیسیرین به شکل برچسب جلدی استفاده کردند. مدت تأخیر زایمان به طور متوسط ۲/۴۶ روز بود و تنها عارضه جانبی در مادر سردرد گزارش شد و هیچ اثر منفی بر جنین مشاهده نگردید.^{۱۴} از آنجایی که بعضی از افراد به درمان دیسمونره با روش‌های رایج پاسخ نمی‌دهند و بعضی از آنان نیز منع مصرف داشته و یا عدم تحمل نسبت به این داروها دارند هنوز نیاز به روش‌های درمانی جدید در درمان دیسمونره مرتفع نشده است. با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که پنج میلی گرم پماد نیتروگلیسیرین یک درصد می‌تواند درد دیسمونره را به طور موثری کاهش دهد، از طرف دیگر احتمالاً با عوارض گذرايی از قبیل سردرد، سرگیجه، برافروختگی همراه است، در افرادی که مجبور به استفاده از روش‌های درمانی غیر رایج هستند، در صورت عدم وجود موارد منع مصرف می‌توان این دارو را به طور آزمایشی به کار برد. ولی لازم است تحقیقات وسیع تری در ارتباط با آن صورت گیرد.

References

- Loh E, Elkayam U, Cody R, Bristow M, Jaski B. The efficacy, safety and administration of the currently available transdermal nitroglycerin patches in the prevention of angina pectoris due to coronary artery disease. 2001; Available from: [www.hsc.usc.edu].
- Wetzka B, Schafer WR, Stehmans A, Zahradnik HP. Effects of nitric oxide donors on the contractility and prostaglandin synthesis of myometrial strips from pregnant and non-pregnant women. *Gynecological Endocrinology* 2001; 15: 34-42.
- Dufour P, Vinatier D, Puech F. The use of intravenous nitroglycerin for cervico-uterine relaxation: a review of the literature. *Arch Gynecol Obstet* 1997; 261: 1-7.
- Fisk NM, Chan J. The case for tocolysis in threatened preterm labour. *BJOG* 2003; 110: 98-102.
- Smith GN, Walker MC, McGrath MJ. Randomised, double-blind, placebo controlled pilot study assessing nitroglycerin as a tocolytic. *BJOG* 1999; 106: 736-39.
- Longobardi G, Ferrara N, Abete P, Leosco D, Furgi G, Nicolino A, et al. Efficacy of transdermal nitroglycerin patches evaluated by dipyridamole-induced myocardial ischemia in patients with coronary artery disease. Comparison between continuous and intermittent schedule. *Cardiovasc Drugs Ther* 2002; 16: 535-42.
- Kreutz S. Nitroglycerin and erections. Version 1.2. 2002; Available from: [http://www.yohimbe.org/nitroglycerin.htm].
- Nitroglycerine ointment used to treat common cause of painful sexual intercourse, vaginismus. Women's health weekly via news RX.Com and news RX.net. 2001; Available from: [http://www.obgyn.net/newsrx/womens.health-vainismus-2001].
- Eisen GM, Dominitz JA, Faigel DO, Goldstein JL, Kalloo AN, Petersen JL, et al. Endoscopic therapy of anorectal disorders. *Gastrointest Endosc* 2001; 53: 867-70.
- Webster M. Merriam-Webster's Medical Desk Dictionary. USA: henceforth MDD, Springfield Mass: Merriam-Webster Inc: 1996.
- [No authors listed]. Transdermal nitroglycerine in the management of pain associated with primary dysmenorrhoea: a multinational pilot study. The Transdermal Nitroglycerine/Dysmenorrhoea Study Group. *J Int Med Res* 1997; 25: 41-4.
- Pittrof R. Cross-over study of glyceril trinitrate patch for controlling pain in women with severe dysmenorrhea. *Br Med J* 1996; 312: 884.
- Lees C, Campbell S, Jauniaux E, Brown R, Ramsay B, Gibb D, et al. Arrest of preterm labour and prolongation of gestation with glyceryl trinitrate, a nitric oxide donor. *Lancet* 1994; 343: 1325-6.
- Rowlands S, Trudinger B, Visva-Lingam S. Treatment of preterm cervical dilatation with glyceryl trinitrate, a nitric oxide donor. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 1996; 36: 377-81.

حوالاً، تداخل دیسمونره با فعالیت‌های روزانه و نیاز به مصرف دارو برای تسکین درد بود و نمرات کلی از جمع‌بندی نمره‌های روزانه در طی هر دوره به دست می‌آمد. از شش متغیر مورد بررسی درد تنها عاملی بود که به طور قابل توجهی تحت تاثیر درمان قرارگرفته بود و سردرد نیز هیچ تشديدي را نشان نداد.^{۱۱,۱۲} Less و همکاران (۱۹۹۴) یک کارآزمایی بالينی به منظور تعیین اثر نیتروگلیسیرین جلدی بر انقباضات رحم در زایمان زودرس ببروی ۱۳ زن حامله انجام دادند. برای مهار انقباضات رحمی از برچسب جلدی حاوی ۱۰ میلی گرم نیتروگلیسیرین برای ۲۴ ساعت استفاده شد. در این روش مدت حاملگی به طور متوسط ۲۴ روز افزایش یافت و در یک سوم از افراد عارضه سردرد رخ داد که این مورد نیز معمولاً در کسانی اتفاق افتاد که هم‌مان دو برچسب روی بدن آنها قرارگرفت.^{۱۳} Ronalds و همکاران (۱۹۹۶) به منظور توقف انقباضات رحمی و طولانی کردن مدت حاملگی در ۱۰ زن حامله با سن حاملگی ۱۶-۳۲ هفته حاملگی

Side effects of glyceryl trinitrate ointment for primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial

Modares M^{1*}
Rahnama P.²

1- Department of Midwifery,
Tehran University Medical
Sciences
2- Department of Midwifery,
Shahed University

Abstract

Background: Patch forms of glyceryl trinitrate (GTN), also known as nitroglyceril, have proved useful in the management of dysmenorrhea. Increased intrauterine pressure due to exaggerated myometrial contractions is an important factor in the pathogenesis of dysmenorrhea. In a recent study, it was found that GTN caused a significant reduction in the contraction frequency of human myometrial strips. The object of this study is to evaluate the efficacy of GTN ointment in treating primary dysmenorrhea.

Methods: In this double-blind randomized placebo-controlled study, we enrolled 112 unmarried subjects with the complaint of moderate to severe primary dysmenorrhea. They were between 18–30 years of age with normal BMI (19–27) and all had normal results upon examination by pelvic ultrasound. None of these patients had a history anemia, previous pelvic surgery or cardiovascular diseases. Randomly divided in two groups using odd and even numbers, 56 of the subjects received 5 mg 1% GTN ointment and another 56 received a placebo. Before starting the treatment, severity of pain was recorded using a visual scale method. Ointment A (GTN 1%) or ointment B (placebo) was applied to special papers which were in turn applied to the skin of the abdomen below the umbilicus, and left there for the entire treatment period of four hours. The severity of pain and side effects of the treatment were recorded at intervals of 15 min, 30 min, 1 h, 2 h and 4 h after application the treatment. After four hours, the treatment was removed and the skin checked for erythema.

Results: There was no difference in severity of pain 15 min after treatment, but pain was less severe in the GTN group from the 30-min interval through the 4-h interval, with the least pain felt at the 2-h interval. This decrease in pain lasted through the 4-h interval. Side effects, which were more common in the GTN group than the placebo group ($P<0.05$), included headache (48.3% vs. 19.5%, respectively), dizziness and flushing.

Conclusions: GTN performed well in relieving primary dysmenorrheal discomfort; however, the side effect of headache reduced its efficacy and tolerability.

Keywords: Primary dysmenorrhea, treatment, glyceryl trinitrate.

* Corresponding author: Faculty of Nursing and midwifery, Tohid Avenue Nosrat, Tehran Tel: +98-21-66927171 email: ma_modars@yahoo.com