

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه‌های استافیلوکوکوس آرئوس در نمونه‌های بیمارستانی

چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس آرئوس (SA) یکی از عوامل بیماری‌زا مهم در عفونت‌های بیمارستانی و خارج بیمارستانی می‌باشد. ظهور سویه‌های استاف آرئوس مقاوم به آنتی بیوتیک‌های مختلف به ویژه سویه‌های SA مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) مشکلات فراوانی در درمان عفونت‌های حاصل از ارگانیسم‌های SA ایجاد کرده است، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و دانستن الگوی منطقه‌ای مقاومت برای درمان مناسب عفونت‌های MRSA و جلوگیری از گسترش سویه‌های مقاوم بسیار ضروری است.

روش بررسی: در این مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی ۳۳۸ سویه SA جدا شده از نمونه‌های بالینی مختلف با روش DAD، حداقل غلطت ممانعت کنندگی (MIC) و PCR بررسی شده است.

یافته‌ها: در روش DAD، (۱۶۰/۳۳۸) ۴۷٪ از سویه‌های SA نسبت به اگزاسیلین مقاوم بودند و کمترین مقاومت نسبت به ونکومایسین (۲۰/۳۳۸) ۶٪ بود. در روش PCR (۱۶۲/۳۳۸) (۴۸٪) از سویه‌ها حاوی ژن *mecA* بودند. MIC اگزاسیلین در ۹۳٪ از سویه‌ها بیش از ۲۵۶ میکروگرم بر میلی‌لیتر بود. سویه‌های MRSA مقاومت بالایی به آنتی بیوتیک‌های جنتامایسین (۴۰/۵٪)، اریترومایسین (۴۰٪) و سیپروفلوکساسین (۳۸٪) داشتند ولی سویه‌های MSSA مقاومت بیشتری نسبت به آنتی بیوتیک‌های ونکومایسین (۵٪) و اریترومایسین (۳/۵٪) داشتند.

نتیجه‌گیری: انتخاب آنتی بیوتیک مناسب به منظور درمان صحیح عفونت‌های SA و جلوگیری از بروز مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک‌های موثر برعلیه سویه‌های SA حائز اهمیت فراوان است. همچنین تعیین دقیق الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نیازمند مطالعه گسترده‌تر با نمونه‌های بیشتر و مراکز درمانی مختلف می‌باشد.

کلمات کلیدی: PCR، DAD، MRSA

مرضیه علی قلی^۱

* محمد ایمان عینی^۱

فرهاد بنکدار هاشمی^۱

شادی شاهسون^۱

فرشته جبل عاملی^۱

بهرام کاظمی^۲

۱. گروه میکروب شناسی

۲. مرکز بیولوژی مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

*نشانی: گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تلفن: ۸۹۵۵۸۱۰

پست الکترونیک:

emaneini@razi.tums.ac.ir

به پلی میکسین و تولید اوره آز شناسایی شدند. میزان حساسیت سویه های SA به آنتی بیوتیک های مختلف بر اساس راهنمای National Committee for Clinical Lab Standards تعیین شد.^۴ حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های سپروفلوکسازین (دیسک μg ۵)، اریترومایسین (دیسک μg ۱۵)، جتامایسین (دیسک μg ۱)، اگزاسیلین (متی سیلین) (دیسک μg ۱)، ریفامپین (دیسک μg ۵) و ونکومایسین (دیسک μg ۳۰) (BBLTM Sensi Disc, Sparks, Maryland, USA) با روش Disk Agar Diffusion (DAD) بر روی محیط مولر هیتون آگار و حداقل غلظت ممانعت کنندگی یا MIC (Minimum Inhibitory Concentration) آنتی بیوتیک اگزاسیلین به روش Micro Dilution انجام شد. سویه های استاندارد از *Staphylococcus aureus* ATCC 29213 و *Enterococcus faecalis* ATCC29212 واکنش استفاده شدند. در روش DAD نتایج به صورت حساس (S)، حساس نسبی (I) و مقاوم (R) ثبت شدند. برای استخراج DNA سویه های SA از روش جوشاندن استفاده شد، سه تا پنج کلنجی از کشت ۲۴ ساعته سویه های استافیلکوکوس آرئوس در محیط مولر هیتون آگار برداشته و با ۱۰۰ میکرولیتر آب مقطر استریل حل کرده به مدت ۱۵ دقیقه در آب جوش قرار داده و در دمای اتاق با دور ۱۲۰۰۰ به مدت ده دقیقه سانتریفیوژ شده و از مایع رویی جهت انجام واکنش PCR استفاده شد. برای تکثیر ژن *mecA* از پرایمرهای *mecA F* ۵'- CTG GAA CTT GTT GAG CAG AG- 3' و *mecA R* ۵'- TGG CTA TCG TGT CAC AAT CG- 3' استفاده شد که محصول آن قطعه ای به طول ۳۱۰ bp بود. واکنش PCR با حجم ۵۰ میکرولیتر انجام شد که شامل ۰/۵ μM Primers، ۲/۵ mM MgCl₂، ۱ X PCR Buffer، ۰/۵ mM dNTP Mix و Taq DNA Polymerase 2.5U بود. واکنش های PCR در ترموسایکلر (مدل اپنورف ۵۳۳۰) و با شرایط [۵ دقیقه در دمای 94°C ، ۳۰ لوب (۹۰ $^{\circ}\text{C}$ به مدت ۳۰ دقیقه در دمای 4°C)] انجام شد.

مقدمه


در جنس استافیلکوکوس، گونه استافیلکوکوس آرئوس (SA) در همه جا از قبیل دستگاه تنفسی و بر روی پوست بسیاری از بزرگسالان حضور دارد، و به عنوان یکی از عوامل بیمارستانی مهم مطرح می باشد.^۱ ظهور سویه های مقاوم مشکلات بیمارستانی در درمان عفونت های حاصل از ارگانیسم SA ایجاد کرده است. در طی دوده گذشته میزان سویه های SA مقاوم به متی سیلین Methicillin Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) در مناطق مختلف جهان افزایش یافته است.^۲

به علت بالا بودن میزان مرگ و میر ناشی از عفونت های بیمارستانی سویه های MRSA، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و آگاهی از الگوی منطقه ای مقاومت به منظور راهنمایی مناسب جهت درمان عفونت های ایجاد شده به وسیله سویه های MRSA بسیار ضروری است.^۱ در ایران اطلاعات دقیقی در زمینه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های MRSA وجود ندارد.


هدف این مطالعه تعیین الگوی منطقه ای مقاومت سویه های مختلف SA [سویه های حاوی ژن *mecA* و سویه های قادر آن Methicillin Susceptible *Staphylococcus aureus* (MSSA)] به منظور راهنمایی مناسب جهت درمان عفونت های MRSA و کنترل عفونت، می باشد.

روش بررسی

در این مطالعه تعداد ۳۳۸ گونه استافیلکوکوس آرئوس از نمونه های بالینی متفاوت (مثل خون، زخم، ادرار) بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی (ره) جمع آوری شده است. گونه های استافیلکوکوس آرئوس بر اساس رنگ آمیزی گرم، تست کاتالاز، واکنش کواگولاز، حساسیت به دیسک باستیراسین ۰/۰۴ واحد، تست دزوکسی ریبونوکلئاز، مقاومت



نمودار ۱- میزان MIC سویه های استافیلولکوکوس آرئوس حاوی ژن meCA به آنتی بیوتیک اگزاسیلین



شکل ۱- آنالیز الکتروفورزی محصولات PCR ژن meCA در سویه های استافیلولکوکوس آرئوس. M: مارکر، ستون ۱: کنترل منفی واکنش، ستون ۲: کنترل مثبت واکنش، ستون ۳ تا ۶: سویه های استافیلولکوکوس جدا شده از نمونه های بالینی

ثانیه، ۵۸ °C به مدت ۳۰ ثانیه و ۷۲ °C به مدت ۴۵ ثانیه) و پنج دقیقه در دمای ۷۲ °C] انجام شد. محصولات PCR با استفاده از ژل الکتروفورز با آگاروز ۱/۵ % آنالیز شدند.

یافته ها

میزان مقاومت سویه های استافیلولکوکوس آرئوس به آنتی بیوتیک های مختلف در روش DAD در جدول شماره ۱ ارائه شده است. بیشترین مقاومت مربوط به اگزاسیلین بود، تقریباً نیمی از سویه ها به آن مقاوم بودند. همچنین سویه های استافیلولکوکوس آرئوس مقاومت کمی به ریفارمپین و ونکومایسین داشتند، و حساسیت آنها نسبت به جنتامايسین، اریترومايسین و سیپروفلوکساسین نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود.

در روش DAD ۱۶۰ سویه استافیلولکوکوس آرئوس به اگزاسیلین (متی سیلین) مقاوم بودند، اما در روش PCR و MIC ۱۶۲ سویه حاوی ژن meCA (شکل شماره ۱) بودند، که MIC ۹۳٪ (۱۵۱ سویه، بیش از ۲۵۶ میکرو گرم بر میلی لیتر بود (نمودار شماره ۱).

نتایج این مطالعه حاکی از مقاومت بالای سویه های MRSA به آنتی بیوتیک های جنتامايسین، اریترومايسین و سیپروفلوکساسین بود (جدول شماره ۲) اما بیشتر این سویه ها به ونکومایسین و ریفارمپین حساس بودند.

بیشترین مقاومت سویه های MSSA مربوط به آنتی بیوتیک های ونکومایسین و اریترومايسین بود (جدول شماره ۳)، همچنین این سویه ها مقاومت کمی نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامايسین، اریترومايسین و سیپروفلوکساسین داشتند.

سویه های MRSA نسبت به سویه های MSSA مقاومت بسیار بیشتری نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامايسین، اریترومايسین و سیپروفلوکساسین داشتند (جدول شماره ۴). ولی مقاومت سویه های MSSA نسبت به آنتی بیوتیک ونکومایسین بالاتر از سویه های MRSA بود.

جدول ۱- فراوانی مطلق (فراوانی نسبی^{*}) مقاومت به آنتیبیوتیک‌های مختلف در سویه‌های استافیلوکوکوس آرئوس

واکنش	سپروفلوکساسین	اریترومایسین	جنتامایسین	اگزاسیلین	ریفارمپین	ونکومایسین
مقاوم (R)	۱۳۶ (۴۰)	۱۴۹ (۴۴)	۱۴۵ (۴۳)	۱۶۰ (۴۷)	۱۰ (۳)	۲۰ (۶)
حساس نسبی (I)	۴ (۱)	۵ (۱)	۲ (۱)	۴ (۱)	۲ (۱)	۰ (۰)
حساس (S)	۱۹۸ (۵۹)	۱۸۴ (۵۵)	۱۹۱ (۵۷)	۱۷۴ (۵۲)	۳۲۶ (۹۶)	۳۱۸ (۹۴)
جمع	۳۳۸ (۱۰۰)	۳۳۸ (۱۰۰)	۳۳۸ (۱۰۰)	۳۳۸ (۱۰۰)	۳۲۸ (۱۰۰)	۳۳۸ (۱۰۰)

*درصدانه گرد شده‌اند.

جدول ۲- فراوانی مطلق (فراوانی نسبی^{*}) مقاومت سویه‌های MRSA به آنتیبیوتیک‌های مختلف با روش DAD

واکنش	سپروفلوکساسین	اریترومایسین	جنتامایسین	ریفارمپین	ونکومایسین
مقاوم (R)	۱۳۰ (۸۰)	۱۳۶ (۸۴)	۱۳۷ (۸۵)	۸ (۵)	۲ (۱)
حساس نسبی (I)	۴ (۲/۵)	۱ (۱)	۰ (۰)	۲ (۱)	۰ (۰)
حساس (S)	۲۸ (۱۷/۵)	۲۵ (۱۵)	۲۵ (۱۵)	۱۵۲ (۹۴)	۱۶۰ (۹۹)
جمع	۱۶۲ (۱۰۰)	۱۶۲ (۱۰۰)	۱۶۲ (۱۰۰)	۱۶۲ (۱۰۰)	۱۶۲ (۱۰۰)

*درصدانه گرد شده‌اند.

جدول ۳- فراوانی مطلق (فراوانی نسبی^{*}) مقاومت سویه‌های MSSA به آنتیبیوتیک‌های مختلف با روش DAD

واکنش	سپروفلوکساسین	اریترومایسین	جنتامایسین	ریفارمپین	ونکومایسین
مقاوم (R)	۵ (۳)	۱۲ (۷)	۷ (۴)	۱ (۱)	۱۸ (۱۱)
حساس نسبی (I)	۰ (۰)	۴ (۲)	۲ (۱)	۰ (۰)	۰ (۰)
حساس (S)	۱۷۱ (۹۷)	۱۶۰ (۹۱)	۱۶۷ (۹۵)	۱۷۵ (۹۹)	۱۵۷ (۸۹)
جمع	۱۷۶ (۱۰۰)	۱۷۶ (۱۰۰)	۱۷۶ (۱۰۰)	۱۷۶ (۱۰۰)	۱۷۶ (۱۰۰)

*درصدانه گرد شده‌اند.

جدول ۴- فراوانی مطلق (فراوانی نسبی^{*}) مقاومت سویه‌های MRSA و MSSA به آنتیبیوتیک‌های مختلف

سویه	سپروفلوکساسین	اریترومایسین	جنتامایسین	ریفارمپین	ونکومایسین
MSSA	۵ (۱)	۱۲ (۳/۵)	۷ (۲)	۱ (۰/۵)	۱۸ (۵)
MRSA	۱۳۰ (۳۸)	۱۳۶ (۴۰)	۱۳۷ (۴۰/۵)	۸ (۲)	۱ (۰/۵)

*درصدانه گرد شده‌اند. کل نمونه‌ها ۳۳۸ بوده است.

بحث

بروز مقاومت به آنتی بیوتیک های مختلف در سویه های استافیلولکوکوس آرئوس مشکلات فراوانی در درمان بیماری های ناشی از این ارگانیسم ها در نقاط مختلف جهان از جمله ایران ایجاد کرده است. جهت درمان مناسب و کنترل عفونت های بیمارستانی نیاز به دانستن الگوی مقاومت استافیلولکوکوس آرئوس می باشد. متاسفانه اطلاعات مناسبی در مورد میزان مقاومت سویه های استافیلولکوکوس آرئوس به آنتی بیوتیک های مختلف در ایران وجود ندارد. هدف این مطالعه بررسی میزان مقاومت سویه های استافیلولکوکوس آرئوس به آنتی بیوتیک های رایج در بیمارستان امام خمینی به منظور ارائه راهنمایی جهت درمان مناسب بیماری های استافیلولکوکی و جلوگیری از گسترش سویه های مقاوم در جامعه می باشد. نتایج این مطالعه حاکی از وجود زن *mecA* در ۴۸٪ از سویه های استافیلولکوکوس آرئوس بود، که این میزان مقاومت مشابه درصد شیوع این سویه ها در بیمارستان های بزرگ جنوب شرق آسیا^۶ و بیشتر از کشورهای شمال اروپا و خاورمیانه (به جز بیمارستان های بزرگ عربستان سعودی) می باشد.^{۷-۱۳} همچنین این میزان مقاومت کمتر از گزارش ممیشی و همکاران^{۱۴} است. این اختلاف احتمالاً به دلیل محدود بودن مطالعه ممیشی به عفونت های خونی در کودکان و استفاده از روش DAD به تنها یک و تنوع نمونه های مورد بررسی در این مطالعه است. مقاومت پایین به ریفارمپین و ونکومایسین نیز مشاهده شده در این مطالعه مشابه گزارشات موجود از مناطق مختلف جهان می باشد و بیانگر انتخاب این آنتی بیوتیک ها به عنوان گزینه ای برای درمان عفونت های

استافیلولکوکی مطرح می باشد. در این مطالعه نیز مشخص شد که همانند سایر مناطق جهان سویه های استافیلولکوکوس آرئوس مقاومت بسیار بالایی به داروهای آمینوگلیکوزیدی و سیپروفلوکساسین یافته اند. اختلاف مشاهده شده بین نتایج PCR و DAD احتمالاً ناشی از وجود سویه های با حساسیت نسبی نسبت به اگزاسیلین می باشد که در روش DAD به صورت حساس نسبی گزارش می شوند ولی حاوی زن *mecA* هستند. روش استاندارد برای شناسایی سویه های استافیلولکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلین روش PCR می باشد. در این مطالعه MIC در ۹۳٪ از سویه های MRSA بیش از ۲۵۶ میکروگرم بر میلی لیتر بود که بسیار بالاتر از گزارش های موجود در منطقه خاورمیانه می باشد.^{۱۱-۱۳} و احتمالاً به دلیل مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های بتالاکتام در ایران است. نکته قابل توجه مقاومت بالای سویه های MRSA در مقایسه با سویه های MSSA نسبت به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی و سیپروفلوکساسین می باشد، که با ظهور مقاومت به اگزاسیلین در سویه های استافیلولکوکوس آرئوس، میزان مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها نیز به شدت بالا رفته است، این امر احتمالاً می تواند بیانگر ارتباطی بین ظهور مقاومت به اگزاسیلین (متی سیلین) و مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها باشد. نتایج این مطالعه می تواند مورد توجه پزشکان جهت انتخاب آنتی بیوتیک مناسب به منظور جلوگیری از بروز مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های موثر برعلیه استافیلولکوکوس آرئوس قرار گیرد. همچنین تعیین دقیق الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی نیازمند مطالعه گستردہ تر با نمونه های بیشتر و مراکز درمانی مختلف می باشد.

References

- Chambers H. Methicillin resistance in Staphylococci: molecular and biochemical basis and clinical implications. *Clin Microbiol Reviews* 1997; 10: 781-91.
- Kluytmans J, van Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of *Staphylococcus aureus*: epidemiology, underlying mechanisms, and associated risks. *Clin Microbiol Rev* 1997; 10: 505-20.
- Cunha BA. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: clinical manifestations and antimicrobial therapy. *Clin Microbiol Infect* 2005; 11: 33-42.
- National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically: Approved Standard M7-A5. 5th ed. Villanova PA. USA. National Committee for Clinical Laboratory Standards: 2004.
- Westh H, Zinn CS, Rosdahl VT. An International multicenter study of antimicrobial consumption and resistance in *staphylococcus aureus* isolates from 15 hospitals in 14 countries. *Microb Drug Resistance* 2004; 10: 169-76.
- Zinn CS, Westh H, Rosdahl VT. An international multicenter study of antimicrobial resistance and typing of hospital *staphylococcus aureus* isolates from 21 laboratories in 19 countries or states. *Microbial Drug Resistance* 2004; 10:160-8.
- Petinaki E, Miriagou V, Tzouvelekis LS, Pournaras S, Hatzi F, Kontos F, et al. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in the hospitals of Central Greece. *International Journal of Antimicrobial Agents* 2001; 18: 61-5.
- Oztop AY, Pinarbasi H, Kocagoz S, Bakici MZ, Bakir M. Molecular genotyping of methicillin-resistant *staphylococcus aureus* strains in a teaching hospital in turkey. *Microb Drug Resist* 2004; 10:154-59.
- Araj GF, Uwaydah MM, Alami SY. Antimicrobial susceptibility patterns of bacterial isolates at the American University Medical Center in Lebanon. *Diagn Microbiol Infect Dis* 1994; 20:151-8.
- Jumaa PA, Neringer R. A survey of antimicrobial resistance in a tertiary referral hospital in the United Arab Emirates. *J Chemother* 2005; 17: 376-9.
- Kanj SS, Ghaleb PA, Araj GF. Glycopeptide and oxacillin activity against *Staphylococcus aureus* isolates at a tertiary care center in Lebanon. *J Med Liban* 2004 52: 8-12.
- Austin TW, Austin MA, McAlear DE, Coleman BT, Osoba AO, Thaqafi AO, et al. MRSA prevalence in a teaching hospital in Western Saudi Arabia. *Saudi Med J* 2003; 24: 1313-6.
- Durmaz B, Durmaz R, Sahin K. Methicillin-resistance among Turkish isolates of *Staphylococcus aureus* strains from nosocomial and community infections and their resistance patterns using various antimicrobial agents. *J Hosp Infect* 1997: 325-9.
- Mamishi S, Pourakbari B, Ashtiani C, Hashemi FB. Frequency of isolation and antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from bloodstream infections at Children's Medical Center, Tehran, Iran 1996–2000. *Int J Antimicrob* 2005; 26: 373-79.

Determination of antimicrobial resistance pattern of *Staphylococcus aureus* isolated from clinical specimens

Abstract

M. Aligholi¹

M. Emaneini^{1*}

F. B. hashemi¹

Sh. Shasavan¹

F. Jebelameli¹

B. kazemi²

1. Department of Microbiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

2. Center for Molecular Biology Research, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Background: *Staphylococcus aureus* (SA) is an important cause of nosocomial and community-acquired infections. The emergence of antibiotic resistance, especially in methicillin-resistant SA (MRSA) strains, has caused difficulties in treatment of such infections. The determination of antibiotic resistance patterns, particularly domestic patterns of Iran, is essential for appropriate treatment of MRSA infections and proper infection control measures in our country.

Methods: The antibiotic resistance of 338 SA isolates from various clinical specimens was determined by disk agar diffusion (DAD), minimum inhibitory concentration (MIC) and polymerase chain reaction (PCR) methods.

Results: Using the DAD method, 47% (160/338) of the SA isolates were resistant to oxacillin, and only 6% (20/338) were resistant to vancomycin. By PCR, 48% (162/338) of the isolates had the *mecA* gene. The MIC of oxacillin in 93% of isolates was higher than 256 μ g/mL. The MRSA isolates, showed a high resistant to gentamicin (40.5%), erythromycin (40%), and ciprofloxacin (38%). However, only a few of the SA isolates showed a high resistance to vancomycin (5%) or erythromycin (3.5%).

Conclusion: The results of this study can provide guidance for physicians toward a more appropriate treatment of SA infections in Iran, thereby preventing the emergence of further antibiotic resistance among SA. Our results also revealed the need for further investigations using a higher number of specimens representing a wider variety of locations to determine the antibiotic resistance patterns in our state more precisely.

Keywords: MRSA, DAD, PCR.

* Department of Microbiology,
School of Medicine, Tehran
University of Medical Sciences,
Tel: +98-21-88955810
Email: emanenini@yahoo.com